

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

PD: 27/6/23

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2125 Société : R.A.M

Actif Pensionné(e)

Autre : Retraité

Nom & Prénom : TOUIL Abderrahim

Date de naissance : 25.5.1953

Adresse : Hag El Rasjid (B) N 331 Casa

Tél. : 0675248174 Total des frais engagés : 2169,20 + 400,- Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

*Professeur Meriem ELALI
Spécialiste en Psychiatrie
et en Addictologie*

Date de consultation : 21/04/2020

Nom et prénom du malade : EL AOUAD YAHYA Age : 64

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : affets neur psychiatrique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa

Le : 21/04/2020

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie Nº P19-033397

Remplissez ce volet, découpez-le et conservez-le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 2125

Nom de l'adhérent(e) : TOUIL Abderrahim

Total des frais engagés : 2169,20 + 400,- Dhs

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/04/2020	CS	400 P17	400 P17	Praticien Meriem ELYAZI Spécialiste en Psychiatrie et en Addictologie

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ZARHOUNI	27/04/20	216120

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

REF 880

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
	O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX	MONTANTS DES SOINS												
		<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>H</td><td>25533412</td><td>21433552</td></tr> <tr><td>D</td><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td>B</td><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr><td>G</td><td>35533411</td><td>11433553</td></tr> </table>	H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553	DATE DU DEVIS	DATE DE L'EXECUTION
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	00000000														
G	35533411	11433553														
		(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession														
<img alt="Diagram of upper and lower dental arches showing numbered teeth from 1 to 8 on each side. A coordinate																



مَرْسَدَةِ دَارُ السَّلَامِ
CLINIQUE DAR SALAM

Casablanca, le 21/04/2020

EL AOUAD

YANNA

4 X 240,00

0001547

4 X 240,00

0001577

Complex

2 CP

le matin

EL AOUAD NASSER
Dictionnaire LLOUOLE
NASSER KARIM RUE 48 N° 11
El Fida Casablanca
Tél: 05.22.23.02.26 V.H.

566883

0001578

Al myz

Professeur Meriem EL YAZAJI
Spécialiste en Psychiatrie
Spécialiste en Addictologie
Spécialiste en épilepsie

2 CP

Nihwa CP

0001711

2 CP

216820

URGENCES 24/24

779 Dr. Modibbo Keita - Casablanca 20100 - Tel : +212 5 22 851 414 - Fax : +212 5 22 830 880 - E-mail : contact@cliniquedarsalam.ma

www.cliniquedarsalam.ma - C.N.S.S. : 6387246 - Patente : 36372350 - N° 1087352

ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

LOT : 192019 1
EXP : 09 2022
PPV : 35.70

35,70



sécable dans les cas suivants :

- allergie connue à cette classe de produits ou à l'un des composants du médicament,
- insuffisance respiratoire grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil),
- insuffisance hépatique grave,
- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer
anxiété, insomnie, etc.

de sevrage
sera d'autant plus
traitement aura été pris.
Malgré la décroissance
doses, un phénomène
gravité peut se produire
TRANSITOIRE des symptômes
qui avaient justifié la
traitemen

Des troubles de mémoire,
altérations des fonctions
sont susceptibles d'apparaître
heures qui suivent la prise.


Chez certains sujets, ce
peut provoquer des réactions
cherché : insomnie,
agitation, nervosité, euphorie,
tension, modifications
voire des comportements
dangereux (agressivité
ou son entourage, ainsi
du comportement automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions
surviennent, contactez
le possible votre médecin.
Les benzodiazépines et les barbituriques
doivent être utilisés avec
le sujet âgé, en raison de
somnolence et/ou de délaissements
qui peuvent favoriser les
conséquences souvent graves
population.

En raison de la présence de ce médicament, il ne doit pas être pris par les personnes
de galactosémie, de malabsorption du glucose ou de déficit en enzymes
métaboliques rares).

Précautions d'emploi
La prise de ce médicament
suivi d'un traitement renforcé
d'insuffisance rénale, de
du foie, d'alcoolisme,
respiratoire.

Seroplex® 10 mg



من فضلك اقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباٰه قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام 10,00 ملء
بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام 12,77 ملء

لكل قرص مختلف قابل للقطع

• المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

سلولوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروس

المغنزيوم.

التقليف:

أوباديри أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني

صاحب الرخصة / المصنع:

S, Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع، وما

يصرّف هذا الدواء بشكل قرص مختلف قابل للقطع في علبة من

العلبة / كميات / لاملاعنة / لاملاعنة

Maphar

Km 10, Route Côtière 111,
QI Zénata Ain sebaa Casablanca

Seroplex 10mg cp séc b28

P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg
Sous forme d'oxalate d'escitalopram 12,77 mg
Pour un comprimé pelliculé sécable

• Les autres composants sont :
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.
Pelliculage :

OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

QU'EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés.
ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :


- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Seroplex® 10 mg



من فضلك اقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباها قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

سيروبليكس 10 ملجم، قرص مغلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام 10,00 ملجم

بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام 12,77 ملجم

لكل قرص مغلف قابل للقطع

• المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

سلولوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروس

المغنزيوم.

التقليف:

أوباديри أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني

صاحب الرخصة / المصنع:

S, Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبليكس 10 ملجم، قرص مغلف قابل للقطع، وما

يصرخ هذا الدواء بشكل قرص مختلف قابل للقطع في عملية من

Maphar

Km 10, Route Côtière 111,
QI Zénata Ain sebaa Casablanca

Seroplex 10mg cp séc b28

P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg
Sous forme d'oxalate d'escitalopram 12,77 mg
Pour un comprimé pelliculé sécable

• Les autres composants sont :
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Pelliculage :

OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

QUELLE EST LA FORME DE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés. ANTIIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :


- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Seroplex® 10 mg



من فضلك اقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباٰه قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام 10,00 ملء
بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام 12,77 ملء

لكل قرص مختلف قابل للقطع

• المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

سلولوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروس

المغنزيوم.

التقليف:

أوباديри أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني

صاحب الرخصة / المصنع:

S, Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع، وما

يصرّف هذا الدواء بشكل قرص مختلف قابل للقطع في علبة من

العلبة / كميات / لاملاعنة / لاملاعنة

Maphar

Km 10, Route Côtière 111,
QI Zénata Ain sebaa Casablanca

Seroplex 10mg cp séc b28

P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg
Sous forme d'oxalate d'escitalopram 12,77 mg
Pour un comprimé pelliculé sécable

• Les autres composants sont :
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.
Pelliculage :

OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

QU'EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés.
ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :


- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Seroplex® 10 mg



من فضلك اقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباها قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.

سيروبليكس 10 ملجم، قرص مغلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام 10,00 ملجم

بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام 12,77 ملجم

لكل قرص مغلف قابل للقطع

• المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

سلولوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروس

المغنزيوم.

التقليف:

أوباديри أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني

صاحب الرخصة / المصنع:

S, Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبليكس 10 ملجم، قرص مغلف قابل للقطع، وما

يصرخ هذا الدواء بشكل قرص مختلف قابل للقطع في عملية من

Maphar

Km 10, Route Côtière 111,
QI Zénata Ain sebaa Casablanca

Seroplex 10mg cp séc b28

P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg
Sous forme d'oxalate d'escitalopram 12,77 mg
Pour un comprimé pelliculé sécable

• Les autres composants sont :
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Pelliculage :

OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

QUELLE EST LA FORME DE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés. ANTIIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :


- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Seroplex® 10 mg



من فضلك اقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباٰه قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- اذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام 10,00 ملء
بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام 12,77 ملء

لكل قرص مختلف قابل للقطع

• المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

سلولوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروس

المغنزيوم.

التقليف:

أوباديри أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني

صاحب الرخصة / المصنع:

S, Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع، وما يصرف هذا الدواء بشكل قرص مختلف قابل للقطع في عملية من

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zénata Ain sebaa Casablanca
Seroplex 10mg cp séc b28
P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg
Sous forme d'oxalate d'escitalopram 12,77 mg
Pour un comprimé pelliculé sécable
- Les autres composants sont :
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.
Pelliculage :
OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

QU'EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés.
ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :


- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Seroplex® 10 mg



من فضلك اقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
سيروپلکس 10 ملغ، قرص مغلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام 10,00 ملغ
بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام 12,77 ملغ

لكل قرص مغلف قابل للقطع

• المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

سلولوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروس

المغنزيوم.

التقليف:

أوباديри أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني

صاحب الرخصة / المصنع:

S, Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبلکس 10 ملغ، قرص مغلف قابل للقطع، وما

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف قابل للقطع في عملية من

Maphar

Km 10, Route Côtière 111,
QI Zénata Ain sebaa Casablanca

Seroplex 10mg cp séc b28

P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg
Sous forme d'oxalate d'escitalopram 12,77 mg
Pour un comprimé pelliculé sécable

• Les autres composants sont :
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.
Pelliculage :

OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

QU'EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés. ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :


- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Seroplex® 10 mg



من فضلك اقرأ هذه النشرة بكمالها بانتباٰه قبل تناول هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
- اذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه لأحد سواك، حتى ولو التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع
• المادة الفعالة هي:

إيسينتالوبرام 10,00 ملء
بشكل أوكسالات الإيسينتالوبرام 12,77 ملء

لكل قرص مختلف قابل للقطع

• المكونات الأخرى هي:

النواة العارية:

سلولوز ميكروبولي، صوان غرواني عديم الماء، تالك، كروس

المغنزيوم.

التقليف:

أوباديри أبيض OY-S-28849: هيبروميلوز، ماكروغول 400 وثاني

صاحب الرخصة / المصنع:

S, Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

1 - ما هو سيروبليكس 10 ملء، قرص مختلف قابل للقطع، وما يصرف هذا الدواء بشكل قرص مختلف قابل للقطع في عملية من

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zénata Ain sebaa Casablanca
Seroplex 10mg cp séc b28
P.P.V : 240,00 DH



6 118001 184989

SEROPLEX® 10 mg comprimé pelliculé sécable

- La substance active est : Escitalopram.....10,00 mg
Sous forme d'oxalate d'escitalopram 12,77 mg
Pour un comprimé pelliculé sécable
- Les autres composants sont :
Noyau nu : cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, talc, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.
Pelliculage :
OPADRY blanc OY-S-28849 : hypromellose, macrogol 400 et dioxyde de titane (E171).

Titulaire/Fabricant :

H. LUNDBECK A/S Ottilievej, 9 - DK-2500 Copenhagen-Valby - DANEMARK

QU'EST-CE QUE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé sécable en boîtes de 28 ou 14 comprimés.
ANTIDÉPRESSEUR/INHIBITEUR SÉLECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SÉROTONINE

Ce médicament est un antidépresseur. Il est indiqué dans :

- le traitement des épisodes dépressifs majeurs,
- le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie,
- le traitement de la phobie sociale.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE SEROPLEX 10 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE ?

Ne prenez jamais SEROPLEX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- allergie à l'escitalopram ou à l'un des excipients,
- associations avec certains autres médicaments antidépresseurs de type IMAO non sélectifs (nialamide, iproniazide).

Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. **Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.**

1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ? Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

Avertissement
médecin ou ph
mg, comprimé
perte d'efficac
médicament, l

LOT : 9MA033
PER.:01/2023
STILNOX 10MG
CP PEL SEC B20
P.P.V : 56DH60



cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. **Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.**

1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ? Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

Avertissement
médecin ou ph
mg, comprimé
perte d'efficac
médicament, l

LOT : 9MA033
PER.:01/2023
STILNOX 10MG
CP PEL SEC B20
P.P.V : 56DH60



cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. **Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.**

1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ? Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

Avertissement
médecin ou ph
mg, comprimé
perte d'efficac
médicament, l

LOT : 9MA033
PER.:01/2023
STILNOX 10MG
CP PEL SEC B20
P.P.V : 56DH60



6 118000 061465

cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour



CLINIQUE DAR SALAM

DEMANDE D'EXAMENS № 033325

Nom : *el Aouad Ch*

Prénom : *YAMNA*

Docteur : *e YAZAFI*

Examen Demandé : *YOO*

Medecin Correspondant : *Le 14/12/2002*

Signature

CLINIQUE DAR SALAM

NOM DU PATIENT : Mme EL AOUAD Yamna
DATE DE NAISSANCE : 04/08/1977

N° DE DOSSIER : 20D20115102
Sejour : Du 20/04/2020 au 20/04/2020
Médecin traitant : Dr. ELYAZAJI MARIAME

Reçu

Paiement du 20/04/2020 11h52

Montant	400,00 Dh
Type de paiement	ESPECES

