

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 069135

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1278 Société :
 27821

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : MKHANTAR FATMA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06169781 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19-069135

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel



Declaration de Maladie

N° W19-475110

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ A

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1678 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : MKHANTAR FATMA
 Date de naissance : 01-01-1944
 Adresse : HAY EL HANA - Rue 30 - N°11 Casablanca
 Tél : 0661609721 Total des frais engagés : Casablanca

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 16/4/2020
 Nom et prénom du malade : TRHAKAL Fatma Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : E. Goutteuse - Ostéoporose

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je
 avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Medecin attestant le Paiement des Actes
16/9/20	G2		289,00	INP : 0910366517H Dr IEN ABDEL Rhinologie Mmeur de la Casablanca Adpt 3 Angle Route d'Avenmour Bvd Sidr Abdelrahman Casablanca Tel: 0522 38 88/95

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL JAOUI Boulevard Bouchara Rue 27 N° 30 El Hana Casablanca Tel: 0522 39 91 24	06-04-20	3018,45

ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Therapeutique, necessaire a la profession

CCEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

CCEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

Dr. Houda IBN ABDELJALIL

Rhumatologue - Spécialiste
des Maladies des Os et Articulations



الدكتورة هدى ابن عبد الجليل

إختصاصية في

أمراض العظام و المفاصل

PHARMACIE EL JAOUÏ
Boulevard de l'Indépendance
Rue 22 May El Hanà
Casablanca
Tél.: 0522 39 91 24

Casablanca, le

16/4/20

168,20

222,00



1) Augmentin 1g sachet

(3 boîtes)

1 sachet x 2/j

36,40

2) Tylenol 325mg



1 app - 2/j

108,65 x 3

3) Osteonase



201,00 x 2

4) Dafalgan 1000

1 ap/j

Consultation sur rendez-vous

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 5mg cp pell b30
P.P.V : 196,20 DH



1mas

Maphar
Km 10, Route Côtière 111,
QI Zenata Ain sebaa Casablanca
Crestor 5mg cp pell b30
P.P.V : 196,20 DH



3mas

3mas

Cabinet : Angle Route d'Azemmour & Bd Sidi Abderahmane- Immeuble de la commune
Appt N° 3 - 3ème Etage - Tél. : 05 22 89 38 88 / 95 - e-mail : ibnabdeljalilhouda@yahoo.fr

PYROSIX®

Suspension buvable

Alginate de sodium - bicarbonate de sodium

FORME ET PRESENTATION :

Suspension buvable / Flacon de 250 ml.

COMPOSITION :

Alginate de sodium anhydre.....5,000 g

Bicarbonate de sodium.....2,670 g

Excipients q.s.p :100 ml

Excipients à effet notoire : sodium - parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle.

PROPRIETES :

PYROSIX® exerce une action antiacide et anti-reflux.

- Sa composition alcaline permet de remonter le pH dans la partie supérieure de l'estomac procurant ainsi un effet de soulagement.
- En se plaçant au dessus du contenu gastrique et grâce à sa transformation en gel visqueux et épais, il constitue une barrière mécanique aux reflux et remontées gastriques acides.

INDICATIONS :

PYROSIX® est indiqué dans le traitement du reflux gastro-œsophagien qui se traduit par des brûlures d'estomac (pyrosis), des remontées ou renvois acides et des aigreurs d'estomac.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

PYROSIX® peut être administré à la femme enceinte ou allaitante, si besoin.

Demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant utilisation.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Posologie :

2 cuillères à café (soit 10 ml) 3 fois par jour après les 3 principaux repas et éventuellement le soir au coucher.

Cette posologie peut être doublée en cas de reflux ou d'inflammation œsophagienne sévères.

Mode d'administration :

PYROSIX® doit être pris par voie orale.

Bien Agiter le flacon avant l'emploi.

Fréquence d'administration :

PYROSIX® doit être pris après les repas.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

PYROSIX® contient du sodium. A prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict.

PYROSIX® contient du parahydroxybenzoate de propyle et du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Ne pas utiliser PYROSIX® si la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur est dépassée.

En cas de doute demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PYROSIX® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, PYROSIX®, suspension buvable en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Constipation éventuelle, qui est exceptionnelle grâce à la présence d'alginate ;
- En cas d'utilisation prolongée risque d'augmentation du taux de calcium dans le sang avec risque de néphrolithiase et d'insuffisance rénale ;
- Réactions allergiques (urticaire, difficultés respiratoires).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

PYROSIX® interagit avec de nombreux médicaments et peut modifier leur absorption.

Les antacides interagissent avec certains autres médicaments absorbés par voie orale.

Nécessitant des précautions d'emploi :

On constate une diminution de l'absorption digestive des médicaments administrés simultanément. Par mesure de précaution, il convient de prendre les antacides à distance des autres médicaments.

Espacer la prise de PYROSIX® de plus de 2 heures, si possible, avec :

- Antibactériens-antituberculeux (éthambutol, isoniazide), voie orale ;
- Antibactériens-cyclines (voie orale) ;
- Antibactériens-lincosamides (voie orale) ;
- Antihistaminiques H2 (voie orale) ;
- Aténolol, métoprolol, propranolol (voie orale) ;
- Chloroquine (voie orale) ;
- Digoxine (voie orale) ;
- Diphosphonates (voie orale) ;
- Fluorure de sodium ;
- Hormones thyroïdiennes ;
- Glucocorticoïdes (voie orale ; décrit pour la prednisolone et la dexaméthasone) ;
- Indométacine (voie orale) ;
- Kayexalate (voie orale) ;
- Kétoconazole (voie orale) ;
- Lansoprazole ;
- Neuroleptiques phénothiaziniques (voie orale) ;
- Pénicillamine (voie orale) ;
- Sels de fer (voie orale) ;
- Espacer la prise de PYROSIX® de plus de 4 heures, si possible, avec :

A prendre en compte :

• Salicylés (voie orale) : augmentation de l'excrétion rénale des salicylés par alcalinisation des urines.

SURDOSAGE :

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté. Cependant, une utilisation excessive pourra entraîner des effets indésirables.

CONDITION DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas conserver au réfrigérateur.

Après la première ouverture, ne pas conserver au-delà de 3 mois.

Delivrance :

PYROSIX® Suspension buvable / Flacon de 250 ml

- AMM N° : 097/14 DMP/21/NNP

Date de révision de la notice : Mars 2015

Dr. Maria MATTOU
Pharmacien Responsable

PYROSIX®

Alginate de sodium - Bicarbonate de sodium

Suspension buvable - Flacon de 250 ml

PPV : 32,50 DH



LABORATOIRE

Z.I. Ouled Salem - Casablanca

5) Fosavance 5600
193,60 x 2

1 cp / semaine

SV

SV

SP

x 3 mgs

x 3 mgs

PHARMACIE EL JAOU
Dr. JAOU Bouchra
Rue 22 N° Hay El Hana
Casablanca
Tél.: 0522 39 91 24

6) Duoflex

1 gel / j

SV

1 cp / j

220,00

350,00

196,20 x 2

7) Crestor

1 cp / j

2

1 gel / j

PHARMACIE EL JAOU
Dr. JAOU Bouchra
Rue 22 N° Hay El Hana
Casablanca
Tél.: 0522 39 91 24

DUOFLEX 60 GELULES
LOT : 190002
PER : 06/2022
PRIX : 350 DH

DUOFLEX

160,60 x 38)

Esac

20

2

1 gel / j

32,50

2

sirop

1 ca s

PHARMACIE EL JAOU
Dr. JAOU Bouchra
Rue 22 N° Hay El Hana
Casablanca
Tél.: 0522 39 91 24
Dr. IEN ABDELJALIL H.
Rhumatologie
Immeuble de la Communauté Apt 3
Angle Route d'Azemour
Boulevard Mohammed VI Casablanca
Tél.: 0522 89 38 88/85

DUOFLEX 30 GELULES
LOT : 190002
PER : 06/2022
PRIX : 220 DH

Notice : information de l'utilisateur

FOSAVANCE® 70 mg/5 600 UI, comprimés

Acide alendronique/colécalciférol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
3. Comment prendre FOSAVANCE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FOSAVANCE
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que FOSAVANCE ?

FOSAVANCE est un comprimé contenant deux principes actifs : l'acide alendronique (communément appelé alendron

70038192/00-1
ANM 294/17 DAN/21/NRQ



6 1 1 8 0 0 1 1 6 0 4 7 - 1

Fosavance 5600 UI

4 comprimés

DISTRIBUE PAR MSD MAROC S.P.A. 136 - BOUSKOURA
P.P.V: 193,60 DH

Notice : information de l'utilisateur

FOSAVANCE® 70 mg/5 600 UI, comprimés

Acide alendronique/colécalciférol

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Il est particulièrement important de comprendre les informations de la rubrique 3 avant de prendre ce médicament.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FOSAVANCE
3. Comment prendre FOSAVANCE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver FOSAVANCE
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que FOSAVANCE et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que FOSAVANCE ?

FOSAVANCE est un comprimé contenant deux substances actives : l'acide alendronique (communément appelé alendron

70038192/00-1
ANM 294/17 DAN/21/NRQ



6 1 1 8 0 0 1 1 6 0 4 7 - 1

Fosavance 5600 UI

4 comprimés

DISTRIBUE PAR MSD MAROC S.P.A. 136 - BOUSKOURA
P.P.V: 193,60 DH

دافلون® 1000 ملغ

أقراص مليسة
جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة

اقرأ مجمل هذه النشرة قبل أخذ الدواء، لأنها تحتوي على معلومات هامة لوضعك:

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئذائها فيما بعد.
- فإن تسائلت أو شككت بأمر ما، أطلب المزيد من المعلومات لدى الطبيب أو الصيدلاني.
- أعلم الطبيب إذا لاحظت أن الأعراض تزداد تفاقمًا.
- فإن سالت الآثار الجانبية، أو إن لاحظت آثارا لم يُشر إليها في هذه النشرة، عليك بإعلام الطبيب أو الصيدلاني.

التركيب

جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة: 1000 ملغ للقرص الواحد

كمية تعادل:

• دابوسمين: 900 ملغ

• فلافونويد بصيغة الهيسبردين: 100 ملغ.

السواغ: كاربوكسيد ميثيل السواغ الصودي، سليلوز دقيق البلور، هلام، خضرم المغنيزيوم، طلك، لكة البرتقال، غليسيرول، هيرموسلون، ماكروغول 6000، لوري سولفات الصوديوم، أكسيد الحديد الأصفر (E172)، أو أكسيد الحديد الأحمر (E172)، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، الكمية الكافية للقرص للملئ للواحد من 1366 ملغ.

الشكل الصيدلاني

أقراص مليسة ضمن مغلفات مشكلة حراريا من الكلوريد البوليفينيل والنايولوم.

علبة تحتوي على 15 أو 30 قرص ملئ.

الصف الصيدلاني الدوائي

دواء يعمل على مستوى الشعيرات الدموية.

C نظام القلب والأوعية الدموية.

إن هذا الدواء ملو وريدي (يزيد توتر الأوردة) كما أنه واق للأوعية الدموية (أي أنه يحسن يزيد مقاومة الأوعية

الدوية الشعرية الدقيقة).

يستعمل في علاج اضطرابات الدوران الوريدي (لقل الساقين، الألم، وعدم القدرة على تثبيت الساقين)، وفي علاج

الأعراض الوظيفية المتعلقة بنوبات البواسير.

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

مضادات الإضطرابات

يصف معدل تواتر التأثيرات الجانبية الممكنة ولذا كورة أدناه استنادا إلى النظام التالي:

• الشائعة جدا (تصيب أكثر من 1 من أصل 10 مستعملين)

• الشائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 100 مستعمل)

• الغير شائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 1000 مستعمل)

• النادرة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 10000 مستعمل)

• الباردة جدا (تصيب أقل من 1 من أصل 10000 مستعمل)

• نسبة غير معروفة (عدم توفر أية معطيات تشير إلى نسبة تلك الاحتمالات)

قد تشمل التأثيرات الجانبية:

• الشائعة: إسهال، عسر الهضم، غثيان، نفث.

• الغير شائعة: التهاب القولون.

• النادرة: شعور بالدوخة، صداع، تورخ، طفح، حكة، شرى.

• الغير معروفة: ألم بطني، وذمة معزولة في الوجه، في الحلق، في الشفتين. وبشكل استثنائي، وذمة وعائية

(كوبنك).

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا أصبت بأي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. هذا يشمل أي آثار جانبية محتملة حتى وإن لم يرد ذكرها

في هذه النشرة. يمكنك أيضا الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية مباشرة عن طريق نظام الإبلاغ الوطني. عند الإبلاغ عن

الآثار الجانبية فالت تساعد بتقديم مزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء.

شروط الحفظ وتاريخ انتهاء الصلاحية

لا تدع الدواء في متناول أيدي الأطفال أو تحت نظرهم.

لا تستعمل دافلون 1000 ملغ، أقراص مليسة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة. يستند تاريخ انتهاء

الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر للذكور.

ليست هناك احتياطات خاصة لحفظ هذا الدواء.

لا ترم الدواء في المحارير أو مع النفايات المنزلية أمال الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية الغير مستعملة. فإن

هذه الاحتياطات تساهم في حماية البيئة.

نصائح بسيطة لتخفيف عن سابقك:

اضطرابات الدوران الوريدي:

• تجنب الجلوس أو الوقوف لمدة طويلة، قم برقع سيرك قليلا من جهة القدمين.

• تجنب التعرض لأشعة الشمس ومصادر الحرارة.

• تجنب اتباع نظام غذائي متوازن وصحي والقيام بتمارين رياضية منتظمة (المشي، ركوب الدراجة، ...). تجنب

الزيادة في الوزن.

• تجنب الملابس الضيقة، ارتداء حواجز القنيت وأيضاً غسل الرجلين بلكاء الباردة يقوم بتحسين وتخفيف الفورة

الدوية.

نوبات البواسير:

• قم بشرب 1,5 لتر إلى 2 لتر من الماء في اليوم، وتناول أكلة غنية بالألياف لتجنب الإمساك (فواكه، خضراء،

حبوب من القمح الكامل)، تجنب المواد الدسمة، القهوة، الكحول والأطعمة الغنية بالتوابل.

• قم بالتمارين الرياضية لتخفيف تدفق الدم، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة.

آخر تاريخ تمت فيه المصادقة على هذه النشرة الداخلية هو: غشت 2017

سرفيه المغرب

SERVIER MAROC
Imm. ZEVAO, Lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUTALEB
20180 Casablanca

ممكن يتناول هذا الدواء، عليك استشارة الطبيب.

في بعدم إرضاع الطفل أثناء تناول هذا الدواء.

الدواء، مدة العلاج

الأولى، ثم 2 أقراص يوميا في الأيام الثلاثة

تلا وجبة الطعام.

من اللازم:

ة، إتصل فوراً بالطبيب أو الصيدلاني.

أص مليسة بعض التأثيرات الجانبية، علما بأن كل



دافلون® 1000 ملغ

أقراص مليسة
جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة

اقرأ مجمل هذه النشرة قبل أخذ الدواء، لأنها تحتوي على معلومات هامة لوضعك:

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لاستئذائها فيما بعد.
- فإن تسائلت أو شككت بأمر ما، أطلب المزيد من المعلومات لدى الطبيب أو الصيدلاني.
- أعلم الطبيب إذا لاحظت أن الأعراض تزداد تفاقمًا.
- فإن سالت الآثار الجانبية، أو إن لاحظت آثارا لم يُشر إليها في هذه النشرة، عليك بإعلام الطبيب أو الصيدلاني.

التركيب

جزيئات الفلافونويد الدقيقة المنقاة: 1000 ملغ للقرص الواحد

كمية تعادل:

• دابوسمين: 900 ملغ

• فلافونويد بصيغة الهيسبردين: 100 ملغ.

السواغ: كاربوكسيد ميثيل السواغ الصودي، سليلوز دقيق البلور، هلام، خضرم المغنيزيوم، طلك، لكة البرتقال، غليسيرول، هيرموسلون، ماكروغول 6000، لوري سولفات الصوديوم، أكسيد الحديد الأصفر (E172)، أو أكسيد الحديد الأحمر (E172)، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، الكمية الكافية للقرص للملئ للواحد من 1366 ملغ.

الشكل الصيدلاني

أقراص مليسة ضمن صفيحات مشكلة حرايا من الكلوريد البوليفينيل والنايولوم.

علبة تحتوي على 15 أو 30 قرص ملئ.

الصف الصيدلاني الدوائي

دواء يعمل على مستوى الشعيرات الدموية.

C نظام القلب والأوعية الدموية.

إن هذا الدواء ملو وريدي (يزيد توتر الأوردة) كما أنه واق للأوعية الدموية (أي أنه يحسن يزيد مقاومة الأوعية

الدوية الشعرية الدقيقة).

يستعمل في علاج اضطرابات الدوران الوريدي (لقل الساقين، الألم، وعدم القدرة على تثبيت الساقين)، وفي علاج

الأعراض الوظيفية المتعلقة بنوبات البواسير.

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

مضادات الإضطباب

يصف معدل تواتر التأثيرات الجانبية الممكنة ولذا كورة أدناه استنادا إلى النظام التالي:

• الشائعة جدا (تصيب أكثر من 1 من أصل 10 مستعملين)

• الشائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 100 مستعمل)

• الغير شائعة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 1000 مستعمل)

• النادرة (تصيب 1 إلى 10 من أصل 10000 مستعمل)

• النادرة جدا (تصيب أقل من 1 من أصل 10000 مستعمل)

• نسبة غير معروفة (عدم توفر أية معطيات تشير إلى نسبة تلك الاحتمالات)

قد تشمل التأثيرات الجانبية:

• الشائعة: إسهال، عسر الهضم، غثيان، نفث.

• الغير شائعة: التهاب القولون.

• النادرة: شعور بالدوخة، صداع، تورخ، طفح، حكة، شرى.

• الغير معروفة: ألم بطني، وذمة معزولة في الوجه، في الحلق، في الشفتين. وبشكل استثنائي، وذمة وعائية

(كوبنك).

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا أصبت بأي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. هذا يشمل أي آثار جانبية محتملة حتى وإن لم يرد ذكرها

في هذه النشرة. يمكنك أيضا الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية مباشرة عن طريق نظام الإبلاغ الوطني. عند الإبلاغ عن

الآثار الجانبية فالت تساعد بتقديم مزيد من المعلومات عن سلامة هذا الدواء.

شروط الحفظ وتاريخ انتهاء الصلاحية

لا تدع الدواء في متناول أيدي الأطفال أو تحت نظرهم.

لا تستعمل دافلون 1000 ملغ، أقراص مليسة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العلبة. يستند تاريخ انتهاء

الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر للذكور.

ليست هناك احتياطات خاصة لحفظ هذا الدواء.

لا ترم الدواء في المحارير أو مع النفايات المنزلية أمال الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية الغير مستعملة. فإن

هذه الاحتياطات تساهم في حماية البيئة.

نصائح بسيطة لتخفيف عن سابقك:

اضطرابات الدوران الوريدي:

• تجنب الجلوس أو الوقوف لمدة طويلة، قم برقع سيرك قليلا من جهة القدمين.

• تجنب التعرض لأشعة الشمس ومصادر الحرارة.

• تجنب اتباع نظام غذائي متوازن وصحي والقيام بتمارين رياضية منتظمة (المشي، ركوب الدراجة، ...). تجنب

الزيادة في الوزن.

• تجنب الملابس الضيقة، ارتداء حواشي الضيقة وأيضا غسل الرجلين بلكاء الباردة يقوم بتحسين وتخفيف الفورة

الدوية.

نوبات البواسير:

• قم بشرب 1,5 لتر إلى 2 لتر من الماء في اليوم، وتناول أكلة غنية بالألياف لتجنب الإمساك (فواكه، خضراء،

حبوب من القمح الكامل)، تجنب المواد المدسمة، القهوة، الكحول والأطعمة الغنية بالتوابل.

• قم بالتمارين الرياضية لتخفيف تدفق الدم، وتجنب حمل الأشياء الثقيلة.

آخر تاريخ تمت فيه المصادقة على هذه النشرة الداخلية هو: 2017

سرفيه المغرب

SERVIER MAROC
Imm. ZEVAO, Lot FATH 4
Bd Abdelhadi BOUTALEB
20180 Casablanca

ممكن يتناول هذا الدواء، عليك استشارة الطبيب.

في بعدم إرضاع الطفل أثناء تناول هذا الدواء.

الدواء، مدة العلاج

الأولى، ثم 2 أقراص يوميا في الأيام الثلاثة

للال وجبة الطعام.

من اللازم:

ة، إتصل فوراً بالطبيب أو الصيدلاني.

أص مليسة بعض التأثيرات الجانبية، علما بأن كل



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

MYCODERME® 1 % Crème

Tube de 40 g

D.C.I : nitrate d'éconazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **MYCODERME® 1 % Crème** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **MYCODERME® 1 % Crème** ?
3. Comment prendre **MYCODERME® 1 % Crème** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **MYCODERME® 1 % Crème** ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE MYCODERME® 1 % Crème ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

MYCODERME® 1 % Crème contient un antifongique (actif contre les champignons) de la famille des imidazolés.

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines mycoses (affections cutanées dues à des champignons).

• Candidoses :

• Traitement de mycose des plis non macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, interdigital.

• Traitement d'appoint des mycoses des ongles : onychomycose.

Un traitement systémique antifongique. Dans certains cas, il est recommandé digestif.

• Dermatophyties :

Traitement :

• Dermatophyties de la peau glabre

• Intertrigos génitaux et cruraux

• Traitement d'appoint des antifongique associé est nécessaire

• Erythrasma.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MYCODERME® 1 % Crème ?

• Ne prenez jamais **MYCODERME® 1 % Crème** si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants contenus dans la liste à la rubrique 6.

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des composants contenus dans la liste à la rubrique 6.

En cas de doute, il est indispensable de consulter votre médecin ou de votre pharmacien.

• Mise en garde et précaution d'emploi

Faites attention avec **MYCODERME® 1 % Crème** chez l'enfant,

MYCODERME

LOT: 08019057

PER: 07-2024

PPV: 36,70 OH

Topique

MYCODERME® 1% CREME

Tube de 40 g



6 118000 230151

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils


santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.


- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

Osteocare®

La science au profit de la meilleure ossature

Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers idéaux en Calcium, en Magnésium et en vitamine D, l'association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium que dans un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescents, comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.



wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

Vitabiotics® wellwoman®

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



Ingédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Pelliculage d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholecalcérol), [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose]

MANTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

Osteocare®

La science au profit de la meilleure ossature

Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers idéaux en Calcium, en Magnésium et en vitamine D, l'association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium que dans un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescents, comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.



5 021265 244683

MANTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS

wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

Vitabiotics® wellwoman®

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



Ingédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Pelliculage d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholecalcérol), [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose]

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils


santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.


- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

Osteocare®

La science au profit de la meilleure ossature

Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers idéaux en Calcium, en Magnésium et en vitamine D, l'association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium que dans un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescents, comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.



wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

Vitabiotics® wellwoman®

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



Ingédients: Carbonate de calcium, Hydroxyde de magnésium, Liants: amidon de pommes & Polyvinylpyrrolidone, Diluants: Cellulose microcristalline et Phosphate de calcium dibasique, Pelliculage (Hydroxypropylméthylcellulose, propylène glycol, dioxyde de titane et talc), Désintégrant: Pelliculage d'amidon sodique, Lubrifiants: Talc purifié, Stéarate de magnésium, Sulfate de zinc, Vitamine D3 (cholecalcérol), [Les transporteurs: triglycérides à chaîne moyenne, Silice colloïdale anhydre, Talc purifié, Maltodextrine, BHA, Éthylcellulose]

MANTENIR DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
À L'ABRI DE LA VUE OU DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, joudre pour suspension
buvable en sachet-dose

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé
Amoxicilline/Acide clavulanique

Dénomination du médicament

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous présentez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?
3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER AUGMENTIN ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

Indications thérapeutiques

AUGMENTIN est utilisé pour traiter les infections dues aux germes sensibles et/ou après un traitement par ce même médicament administré par voie injectable, notamment dans certaines résistances aux antibiotiques actuellement disponibles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :

Si votre médecin vous a informés d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé : sachet objet.

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans AUGMENTIN (dont la liste est fournie à la rubrique 6).
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (si hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.
- Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictère (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

→ **Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.**

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Faites attention avec AUGMENTIN :

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent de AUGMENTIN ou un autre médicament.

Reactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Reactions nécessitant une attention particulière » à la rubrique 4.

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin (le/la) qui vous prescrit AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influencer sur les résultats de ces types de tests.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin ou à

votre pharmacien. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si vous prenez de l'alcool (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'ajuster votre dose de AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises. AUGMENTIN peut influencer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influencer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou s'il est possible que vous le soyez, ou si vous allaitez, vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un quelconque médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

Informations importantes concernant certains composants de AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose :

• AUGMENTIN contient du saccharose (D-glucose), mais est une source de chélateur, celle-ci peut être nocive.

• AUGMENTIN

intolérance

AUGMENTIN

1. COMMENT

Instructions

Respectez la

médicament ou

Posologie, à

Posologie, à

Posologie

Adultes et

• Dose habit

• Dose infér

Enfants pes

Les enfants

suspension b

Demandez c

AUGMENTIN

Patients sou

• En cas de p

pourra presc

• En cas de p

de vérifier le b

Comment prendr

• AUGMENTIN 1 g/125 mg

Le mélange son contenu dans un d

Avalez le mélange au début d'un r

AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg adult

au début d'un repas ou un peu av

• Répartissez les prises de manière

de au moins 4 heures. Ne prenez,

• Ne conduisez pas et n'utilisez pas

• Ne prenez pas AUGMENTIN pend

consultez de nouveau un médic

Si vous avez pris plus de AUGME

La prise d'une quantité excessive

vomissements ou diarrhée) ou des

Montrez la boîte de médicament

Si vous oubliez de prendre AUGME

Si vous avez oublié une dose, prin

avant de prendre la dose suivante.

Si vous arrêtez de prendre AUGME

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à ce que vous vous

sentiez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries

devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

AUGMENTIN 1 g/125 mg
24 sachets



6 118000 161042



PPV : 222,00 DH
LOT : 623747
PER : 06/21



ment est une marque déposée
ciétés du Groupe GlaxoSmithKline

ESAC® 20 mg

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

Composition

Esoméprazole 20,00 mg

Sous forme d'ésoméprazole magnésium trihydrate.

Excipients dont le saccharose : q.s.p.1 gélule gastro-résistante

Qu'est-ce qu'ESAC 20 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament se présente sous forme de gélules contenant des microgranules gastro-résistants. ESAC est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- le traitement de l'oesophagite érosive par reflux (inflammation de l'oesophage),
- la prévention des rechutes de certaines oesophagites,
- le traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides),
- le traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*,
- le traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- la prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 20 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

Ne pas utiliser ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,
- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).

Prendre des précautions particulières avec ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétoconazole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique),
- si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.

- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de *Helicobacter pylori* avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

En cas de traitement à la demande, vous devez informer votre médecin de toutes modifications des symptômes.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin avant de prendre ESAC.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament notamment l'itraconazole ou le kétoconazole, le diazépam, la phénytoïne, la warfarine, l'atazanavir, la clarithromycine ou le cisapride, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Comment prendre ESAC 20 mg ?

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et quand vous devez les prendre.

Le dosage des gélules que vous prenez et la durée du traitement dépendront de l'importance des symptômes dont vous souffrez.

Vous pouvez prendre vos gélules au cours d'un repas ou à jeun. Les gélules ne doivent pas être mâchées ni croquées.

Elles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler, le contenu des gélules peut être mis dans un demi-verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

Vous pouvez alors boire la solution contenant des petits granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours avant de boire.

Rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire. Tous les granules doivent être avalés sans être mâchés ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler, le contenu des gélules peut être dispersés dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique.

La posologie habituelle est :

Adultes et enfants à partir de 12 ans :

- Traitement de l'oesophagite :

40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez certains patients, un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

- Prévention des rechutes des oesophagites :

20 mg une fois par jour.

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

20 mg une fois par jour.

Si vos symptômes persistent après 4 semaines, consultez votre médecin.

Par la suite, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule de 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins.

Le traitement à la demande, en fonction des besoins, n'est pas recommandé chez les patients traités par un AINS, susceptibles de développer un ulcère gastro-duodénal.

Adultes :

- Traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori* :

La dose initiale est de 20 mg associé à deux antibiotiques (amoxicilline 1 G et clarithromycine 500 MG) deux fois par jour pendant 7 jours.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 à 8 semaines.

- Prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

20 mg une fois par jour.

Si vous êtes prêt à utiliser ESAC chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.

Suivez strictement les instructions de votre médecin et si vous avez un doute, n'hésitez pas à lui demander conseil.

Si vous avez pris plus d'ESAC 20 mg que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez oublié de prendre ESAC 20 mg :

Prenez-le dès que possible.

Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement normalement.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ESAC 20 mg est susceptible d'entraîner occasionnellement des effets indésirables chez certaines personnes.

Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légère et disparaissent à l'arrêt du traitement.

Effets indésirables fréquents

(chez 1 à 10 % des patients traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, flatulence.

Effets indésirables peu fréquents

(chez moins de 1 % des patients traités) :

Sensation vertigineuse, œdème périphérique, parosmésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, inesthésie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaire), malaise.

Effets indésirables rares

(chez moins de 0,1 % des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution du nombre des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes), encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère pré-existante, hépatite avec ou sans ictère (jaunisse), insuffisance hépatique, douleurs articulaires ou musculaires, fatigue musculaire, photosensibilisation, réactions cutanées (phases de cheveux), réactions au contact (gonflement du visage, des lèvres, du nez et/ou de la gorge), néphrite intersti-

tielle, perturbation

Si vous re-

veillez en

Instruction

Il est très im-

personnel et

choisi (sonde

Seule de l'ei

Aucun autre

Rincer la so

1. Placer le

avec environ

Pour certain

microgranul

2. Remuer it

les microgra

3. Maintenir

par la dispers

4. Raccorder l

5. Agiter la ser

5-10 ml dans la

Puis, reposition

maintenue positio

6. Retourner la seringue

5-10 ml dans la sonde. Répéter cette opératio

7. Remplir de nouveau la seringue avec 25 ml

Si, si nécessaire, afin de ne laisser aucun res

sondes, un volume de 50 ml d'eau est néces

Formes et présentations

Boîte de 7 gélules, boîte de 14 et boîte de 28

Liste II (Tableau C)

Comment conserver ESAC 20 mg ?

A conserver à une température ne dépassant

A conserver dans l'emballage extérieur d'ori

Tenir hors de la portée et de la vue des enf

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la notice.

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel - Had Soualem

ESAC® 20 mg

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

Composition

Esomeprazole 20,00 mg

Sous forme d'ésoméprazole magnésium trihydrate.

Excipients dont le saccharose : q.s.p.1 gélule gastro-résistante

Qu'est-ce qu'ESAC 20 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament se présente sous forme de gélules contenant des microgranules gastro-résistants. ESAC est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- le traitement de l'oesophagite érosive par reflux (inflammation de l'oesophage),
- la prévention des rechutes de certaines oesophagites,
- le traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides),
- le traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*,
- le traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- la prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 20 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

Ne pas utiliser ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,
- si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).

Prendre des précautions particulières avec ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétoconazole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique),
- si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
- si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.

- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de *Helicobacter pylori* avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

En cas de traitement à la demande, vous devez informer votre médecin de toutes modifications des symptômes.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin avant de prendre ESAC.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament notamment l'itraconazole ou le kétoconazole, le diazépam, la phénytoïne, la warfarine, l'atazanavir, la clarithromycine ou le cisapride, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Comment prendre ESAC 20 mg ?

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et quand vous devez les prendre.

Le dosage des gélules que vous prenez et la durée du traitement dépendront de l'importance des symptômes dont vous souffrez.

Vous pouvez prendre vos gélules au cours d'un repas ou à jeun. Les gélules ne doivent pas être mâchées ni croquées.

Elles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler, le contenu des gélules peut être mis dans un demi-verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

Vous pouvez alors boire la solution contenant des petits granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours avant de boire.

Rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire. Tous les granules doivent être avalés sans être mâchés ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler, le contenu des gélules peut être dispersés dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique.

La posologie habituelle est :

Adultes et enfants à partir de 12 ans :

- Traitement de l'oesophagite :

40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez certains patients, un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

- Prévention des rechutes des oesophagites :

20 mg une fois par jour.

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

20 mg une fois par jour.

Si vos symptômes persistent après 4 semaines, consultez votre médecin.

Par la suite, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule de 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins.

Le traitement à la demande, en fonction des besoins, n'est pas recommandé chez les patients traités par un AINS, susceptibles de développer un ulcère gastro-duodénal.

Adultes :

- Traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori* :

La dose initiale est de 20 mg associé à deux antibiotiques (amoxicilline 1 G et clarithromycine 500 MG) deux fois par jour pendant 7 jours.

- Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour. La durée de traitement est de 4 à 8 semaines.

- Prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens :

20 mg une fois par jour.

Si vous êtes prêt à utiliser ESAC chez les enfants de moins de 12 ans en l'absence de données disponibles.

Suivez strictement les instructions de votre médecin et si vous avez un doute, n'hésitez pas à lui demander conseil.

Si vous avez pris plus d'ESAC 20 mg que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez oublié de prendre ESAC 20 mg :

Prenez-le dès que possible.

Cependant, si vous êtes prêt à prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée mais poursuivez votre traitement normalement.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ESAC 20 mg est susceptible d'entraîner occasionnellement des effets indésirables chez certaines personnes.

Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légère et disparaissent à l'arrêt du traitement.

Effets indésirables fréquents

(chez 1 à 10 % des patients traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, flatulence.

Effets indésirables peu fréquents

(chez moins de 1 % des patients traités) :

Sensation vertigineuse, œdème périphérique, parosmésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, inattention, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (dermatite, rash, prurit, urticaire), malaise.

Effets indésirables rares

(chez moins de 0,1 % des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution du nombre des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes), encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère pré-existante, hépatite avec ou sans ictère (jaunisse), insuffisance hépatique, douleurs articulaires ou musculaires, fatigue musculaire, photosensibilisation, réactions cutanées (phases de cheveux), réactions au contact du visage, des lèvres, du nez et de la bouche.

néphrite intersti-

tielle

perturbatio-

n

Si vous re-

veillez en-

Instruction

Il est très im-

portant de

personnel et

choisi (sonde

Seule de l'ei

Aucun autre

Rincer la so

1. Placer le

avec environ

Pour certain

microgranul

2. Remuer il

les microgra

3. Maintenir

par la dispers

4. Raccorder l

5. Agiter la se

5-10 ml dans

Puis, repositio

maintenue positio

6. Retourner la seringue

5-10 ml dans la sonde. Répéter cette opératio

7. Remplir de nouveau la seringue avec 25 ml

Si, si nécessaire, afin de ne laisser aucun res

sondes, un volume de 50 ml d'eau est néces

Formes et présentations

Boîte de 7 gélules, boîte de 14 et boîte de 28

Liste II (Tableau C)

Comment conserver ESAC 20 mg ?

A conserver à une température ne dépassant

A conserver dans l'emballage extérieur d'ori

Tenir hors de la portée et de la vue des enf

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la notice.

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel - Had Soualem

