



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19-

045121

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2950 Société :

54192

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

retraite

Nom & Prénom : Wadef Mhand

Date de naissance : 1946

Adresse : Bine Larchanmou 37.10.26

Cocon

Tél. : 0691651267 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 31/10/2020

Nom et prénom du malade : MAAS Zineb

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Affecte chronique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :


Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :


RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
31/10/2020	as		300.017	 Dr M. EL MORCHID Radio - Oncologue INP : 091058651 Centre Al Kindy - Casablanca
31/10/2020	Glycosyl			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture	Signature du Pharmacien ou du Fournisseur
PHARMACIE HAYAL MANZAH SARLAU Lot Al Manzah Imm 2 Mag 1 INP: 062088778 Tel: 05 22 51 51 84	31/10/2020	524,25	 Dr M. BENNANI Réanimateur INP: 091025007

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 LABORATOIRE RADIOLOGIQUE 122, Bd. d'Analyses Médicales Casablanca - Tel: 05 22 51 51 84	31/10/2020	3	605,1
	21/11/2020	5	1000,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre			Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	

CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
 Oncologie & Hématologie du Maroc
 Al Kindy
 Tel: 05 22 51 51 84

RADIOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
RADIOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOTHERAPIE - CHIMIOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفياض - الإشعاعي النووي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE 31/10/2022



090001405

Ne AAS Zineb

Fanni S. J. P

مركز العلاج الكندي
CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
Oncologie & Diagnostic du Maroc
2-4, Rue Al Kindy
Tél. : 05 20 48 72 00 - Casablanca

100 Horaire
sans injection

Dr. M. EL MORCHID
Radio - Oncologue
INP : 091058651
Centre Al Kindy - Casablanca

CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOETHERAPIE - CHIMIOETHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

Laboratoire LABIOMED d'Analyses Médicales

LABIOMED -S.N.C. - RC 92541 - IF 01022247 - CNSS 6007670 - Patente 30200179 - ICE 000231012000067
Compte Banque Populaire - 190 / 780 / 21211 5575621 000 3 / 30 / Taha Houcine - Casablanca
122, Bd d'Anfa - Quartier Racine - Casablanca - Tél. : 05 22 48.13.51 / 48.13.86 - Fax : 05 22 48.13.96

Dr Jalil ELMANJRA

Pharmacien Biologiste
Ancien Assistant des Hôpitaux de Dijon
Ancien Interne des Hôpitaux de Strasbourg

Dr Abdelaziz LEMSEFFER

Pharmacien Biologiste
Ancien Interne des Hôpitaux de Besançon
D.I.U. de Biologie de la Reproduction

Bactériologie - Biochimie - Hématologie - Immunologie - Mycologie - Parasitologie - Virologie

Casablanca le samedi 31 octobre 2020 Mme MAAS ZINEB

AL KINDY ICE 000205043000017

FACTURE N°	13382
------------	-------

Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	70	
Urée -----	B	30	
Créatinine sanguine -----	B	30	
Iono (Na-K-Cl-RA-Ca-PT) -----	B	160	
Protéine C réactive -----	B	100	
Déplacement -----	B	21	Total : B 411

Prélèvements :

Sang-----	Pc	15	
-----------	----	----	--

TOTAL DOSSIER	605,00 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Six Cent Cinq Dirhams

Laboratoire LABIOMED d'Analyses Médicales
122, Bd d'Anfa - Quartier Racine - Casablanca
Tél. : 05 22 48.13.51 / 48.13.86 - Fax : 05 22 48.13.96

**Payé en
Espèces**

Juvamine

AMPOULE

COMPOSITION POUR UNE AMPOULE :

PANAX GINSENG C.A MEYER.....	56 mg
Extrait de Maté.....	67 mg
Extrait de Guarana.....	130mg

La Guarana et le Maté contiennent naturellement de la caféine, réputée pour raviver l'éveil et reconnue pour son effet tonique rapide.

PROPRIÉTÉS :

- Pouvoir anti-fatigue: physique, psychique et intellectuelle puissant (vieillesse, post-accouchement, convalescence)
- Accroît les résistances musculaires
- Augmente les performances physiques chez les sportifs en cours d'entraînement et en période de récupération.
- Augmente le tonus physique
- Excellent stimulant du tonus général
- Stimule les défenses de l'organisme
- Favorise l'activité intellectuelle et les réponses au stress

CONSEILS D'UTILISATION :

Diluer le contenu de l'ampoule dans un verre d'eau ou de jus de fruits. Prendre une ampoule par jour de préférence le matin.

PRÉSENTATION :

Boîte de 10 ampoules de 10 ml

L'efficacité du PANAX GINSENG C.A MEYER est prouvée par plusieurs études et travaux réalisés chez l'homme

19505 1022
LOT PER
Prix 99,00

Laboratoire
Chris

FAB/MFD: / N° de lot / batch n°
à consommer de préférence avant fin/expiry date:
الرجح التاريخ/الموعد المفضل للاستهلاك قبل التاريخ نهاية الصلاحية: آخر الصلاحية
FAB: 10/2019
LOT: 19505
A UT AU FIN:
10/2022

Paris



Comprimé pelliculé sécable
boîtes de 5, 7 et 10

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE :

Levofloxacin (DCI).....500 mg

Sous forme de levofloxacin hemihydraté

Excipients.....qsp un comprimé pelliculé sécable

Excipients à effets notoires : sans objet

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

La levofloxacin appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La levofloxacin est un antibiotique de type « quinolone ». Elle détruit des bactéries responsables d'infections dans l'organisme.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, peut être utilisé pour le traitement des infections suivantes:

Chez l'adulte

- Sinusites aiguës bactériennes
- Exacerbations aiguës de bronchite chronique
- Pneumonies communautaires
- Infections compliquées de la peau et des tissus mous

Pour les infections mentionnées ci-dessus **EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable**, ne doit être utilisé que lorsque les antibiotiques recommandés dans les traitements initiaux de ces infections, sont jugés inappropriés.

- Pyélonéphrites et infections urinaires compliquées
- Prostatites chroniques bactériennes
- Cystites non compliquées

- Maladie du charbon : prophylaxie post exposition et traitement curatif.

EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, peut également être utilisé en relais d'un traitement intraveineux initial de levofloxacin chez les patients ayant montré une amélioration de leur état.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Par voie orale, à avaler avec de l'eau
- Les comprimés peuvent être pris au cours ou en dehors des repas.

Protégez votre peau de la lumière solaire

Évitez l'exposition directe au soleil pendant que vous recevez ce médicament et pendant les 2 jours qui suivent l'arrêt du médicament.

Votre peau devient bien plus sensible au soleil et peut vous donner des sensations de brûlure, de picotements ou former des cloques sévères, si vous ne prenez pas les précautions suivantes :

- Vérifiez que vous utilisez une crème solaire à protection élevée.
- Portez toujours un vêtement qui couvre vos bras et vos jambes.

Si vous recevez des suppléments à base de zinc, des antiacides, de la didanosine ou du

Si vous recevez des comprimés que **EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable**. Prenez ces comprimés que **EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable**.

Si vous recevez le **EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable**, que vous devez prendre.

Si vous recevez dont vous souffrez.

Si vous recevez de votre infection.

Si vous recevez tement est trop faible ou trop fort, ne modifiez pas la dose de vous-même,

Si vous recevez s personnes ayant des problèmes respiratoires à long terme et infections

Si vous recevez muscles

Si vous recevez ar jour.

LOT: 031119 PER: 03/2022
PPV: 100,10 DH

EVOX® 500 mg
DCI: Levofloxacin
7 Comprimés pelliculés sécables



6 118000 340485



Solupred® 20 mg

Prednisolone
Comprimé effervescent

sanofi aventis

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Métasulfobenzate de prednisolone et de sodium quantité correspondant en prednisolone à ... 20 mg.
Excipients : Acide tartrique, acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, benzoate de lithium, citron arôme naturel, saccharinate de sodium, silicone émulsion anti-mousse.
Chaque comprimé contient 50,80 mg de sodium.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé effervescent. (Flacon (verre) de 20).

Classe pharmaco-thérapeutique

GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE
(H : Hormones systémiques non sexuelles)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un corticoïde.
Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mise en garde : Ce médicament doit être évité en association avec le sultopride (un médicament agissant sur le système nerveux central) ou avec un vaccin vivant atténué (cf. "Précautions d'emploi").

AVANT D'UTILISER CE MEDICAMENT, IL FAUT CONSULTER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. Pendant la grossesse, si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

de tuberculose), d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale, d'ostéoporose et de myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).

Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicale, subtropicale ou le sud de l'Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.

La prise de ce médicament en association avec le sultopride (un médicament agissant sur le système nerveux central) ou avec un vaccin vivant atténué est à éviter (voir rubrique "interactions médicamenteuses et autres interactions").

PENDANT ET APRES LE TRAITEMENT :

Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.

En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

Sous traitement et au cours de l'année suivant l'arrêt du traitement, prévenir le médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention chirurgicale ou de situation de stress (fièvre, maladie).

Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle).

Prévenir votre médecin en cas d'apparition de douleur tendineuse.

Précautions d'emploi

Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en particulier pauvre en sel. Tenir compte de l'apport en sodium (environ 51 mg par comprimé).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec le sultopride (un médicament agissant sur le système nerveux central) ou avec un vaccin vivant atténué (cf. "Précautions d'emploi").

LES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES IL FAUT CONSULTER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Solupred® 20 mg

20 Comprimés effervescents



6 118000 060536

Solupred® 20mg

pendant la grossesse

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, England.
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.
www.vitabiotics.com



VITABIOTICS
SCIENCE OF HEALTHY LIVING



Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

Jointace®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. la gamme comprend:

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

Cardioace®

la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poissons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.


- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

Osteocare®

La science la meilleure

Osteocare® en calcium le Royaume Uni journaliers en association

- Seulement demi-litre
- Contient
- d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescent, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.



D3 avec une anté dose. Magnésium qu'un

wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétiques plus importante.
- Idéal en association avec Wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modéré.

Vitabiotics® wellwoman®

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



Wellwoman® est une gamme complète de compléments alimentaires destinés à maintenir la santé et à répondre aux besoins spécifiques des femmes en fonction de leur style de vie.

- Wellwoman® Original capsules Formule contenant 24 éléments minéraux, de l'huile d'Onagre et de l'huile de Bourrache qui apportent énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Wellwoman® Détoxifiant nettoyant en profondeur destiné à aider le processus naturel de détoxification de l'organisme.
- Wellwoman® 50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de lutéine et de l'extrait de thé vert qui vont permettre de soutenir les principales fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.
- Wellwoman® Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline permettant la libération d'énergie et l'amélioration de la santé intestinale.
- Wellwoman® Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin d'énergie.
- Idéal en association avec Wellwoman Original.
- Wellwoman® Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.

Laroxyl® 40 mg/ml

Solution buvable en gouttes
Amitriptyline

Composition

Solution buvable dosée à 4% d'amitriptyline (présente sous forme de chlorhydrate d'amitriptyline).
Excipients : alcool éthylique, glycérine, eau purifiée.
Excipients à effet notoire : alcool éthylique, glycérine.
Flacon compte - gouttes de 20 ml. 1 goutte = 1 mg.

Dans quels cas utiliser ce médicament (indications)

Ce médicament est un antidépresseur.

Il est indiqué :

- dans des épisodes dépressifs d'intensité légère, modérée ou sévère,
- dans certaines douleurs ne répondant pas aux antalgiques habituels,
- dans l'énurésie nocturne de l'enfant (émission involontaire d'urine la nuit).

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (contre-indications)

Faites attention avec LAROXYL® 40 mg/ml, solution buvable :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie connue à l'amitriptyline
- risque de glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeil),
- difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- infarctus du myocarde récent,
- traitement par un autre antidépresseur (iproniazide, nialamide) ou par le sulprofide.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :

- traitement par un autre antidépresseur (moclobémide, toloxatone) ou par des médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (clonidine ou apparentés, et adrénaline, noradrénaline, dopamine par voie injectable).

Mises en garde spéciales

Ne pas interrompre brutalement le traitement.

De rares cas de syndrome de sevrage (céphalées, malaises, nausées, anxiété, troubles du sommeil) ayant été observés à l'arrêt du traitement, il est recommandé de réduire progressivement les doses et de surveiller tout particulièrement le patient durant cette période.

La prise concomitante d'amitriptyline avec de l'alcool, de la clonidine, de la guanfacine, un IMAO-A sélectif (moclobémide, toloxatone), du lindolol, ou un sympathomimétique alpha et bêta (voies parentérale) est déconseillée (voir Interactions).

Comme pour tous les autres antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement, même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin.

Idees suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux :

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles

anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agression envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement. Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants :

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé.
- si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était accru chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychiatrique et traités par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, contactez immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Précautions d'emploi

Insomnie ou nervosité au début de traitement peuvent justifier une diminution de la posologie ou un traitement transitoire symptomatique.

En cas de virage maniaque franc, le traitement par l'amitriptyline sera interrompu et, le plus souvent, un neuroleptique sédatif sera prescrit.

Chez les patients épileptiques ou ayant des antécédents d'épilepsie, il est prudent de renforcer la surveillance clinique et électrique, en raison de la possibilité d'abaissement du seuil épileptogène. La survenue de crises convulsives impose l'arrêt du traitement.

L'amitriptyline doit être utilisée avec prudence :

- chez le sujet âgé présentant :
- une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique due à la sédation;
- une constipation chronique (risque d'iléus paralytique);
- une éventuelle hypertrophie prostatique;
- chez les sujets porteurs de certaines affections cardiovasculaires, en raison des effets quinidiques, tachycardiaires et hypotenseurs de cette classe de produits;
- chez les patients présentant des neuropathies avec troubles neurovégétatifs sévères, en raison de l'augmentation du risque d'interaction orthostatique;
- dans les insuffisances hépatiques et rénales, en raison du risque de surdosage (voir Pharmacocinétique).

Ce médicament contient 2,5 mg d'alcool par goutte. Il est déconseillé chez les patients souffrant de maladie du foie, d'alcoolisme, d'épilepsie, de même que chez les femmes enceintes.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Vous ne devez pas prendre ce médicament en même temps que certains autres médicaments de la dépression (iproniazide, nialamide) ou le sulprofide. Vous ne devez généralement pas prendre ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin, en même temps que :

- certains médicaments de la dépression (moclobémide, toloxatone)
- certains médicaments agissant sur le système cardiovasculaire (clonidine et apparentés, et

adrénaline, noradrénaline, dopamine par voie injectable).

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse, allaitement

En cas de besoin, ce médicament peut vous être prescrit ou maintenu durant votre grossesse. Dans le cas où ce traitement doit être pris jusqu'à l'accouchement, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire dans la mesure où certains effets du traitement peuvent se manifester aussi chez l'enfant.

Ce médicament passe en faibles quantités dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter d'allaiter pendant la durée du traitement.

De manière générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'attention est attirée sur la somnolence et la baisse de vigilance attachées à l'emploi de ce médicament.

Posologie / Mode et voie d'administration / Durée du traitement

Voie orale. Avaler le médicament avec un peu d'eau.

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous sentez une amélioration.

Dans tous les cas se conformer strictement à la prescription médicale.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Prévenir immédiatement un médecin qui prendra les dispositions nécessaires.

Risque de syndrome de sevrage

De rares cas de syndrome de sevrage (maux de tête, malaises, nausées, anxiété, troubles du sommeil) ayant été observés à l'arrêt du traitement, ne pas interrompre celui-ci sans l'avis de votre médecin.

Effets non souhaités et gênants (effets indésirables)

Ils découlent pour la plupart des propriétés pharmacologiques des antidépresseurs imipraminiques.

• **Lésions aux effets périphériques de la molécule :** ils sont habituellement bénins et cèdent le plus souvent à la poursuite du traitement ou à une réduction de la posologie.

- effet anticholinergique (par ordre de fréquence décroissante) : sécheresse de la bouche, constipation, troubles de l'accommodation, tachycardie, sueurs, troubles de la miction et éventuellement rétention urinaire;
- effet adrénergique : hypotension orthostatique, impuissance.

- **Liés aux effets centraux :**
- fréquemment observée : somnolence ou sédation (effet antihistaminique), plus marquée en début

- de traitement;
- beaucoup plus rares : tremblements, crises convulsives sur terrain prédisposé, états confusionnels transitoires, syndrome sérotoninergique (en association).
- **Liés à la nature même de la maladie dépressive :**
- levée de l'inhibition psychomotrice, avec risque suicidaire;
- inversion de l'humeur avec apparition d'épisodes maniaques;
- réactivation d'un délire chez les sujets psychotiques;
- manifestations paroxystiques d'anxiété.

Des cas d'idées et de comportements suicidaires ont été rapportés durant le traitement par LAROXYL® ou peu après son arrêt (voir mises en garde et précautions d'emploi).

- Les antidépresseurs imipraminiques peuvent également entraîner :
- prise de poids,
- troubles de la conduction ou du rythme (avec des doses élevées),
- troubles endocriniens : hypertrophie mammaire, galactorrhée,
- bouffées de chaleur,
- réactions cutanées allergiques,
- dysarthrie,
- hépatites cytolytiques ou cholestatiques exceptionnelles,
- troubles hématologiques : hyperéosinophilie, leucopénie, agranulocytose, thrombopénie,
- syncope.

- **Effet de classe :**
- Des études épidémiologiques, réalisées principalement chez des patients âgés de 50 ans et plus, montrent un risque accru de fractures osseuses chez les patients recevant des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (SSRI) ou des antidépresseurs tricycliques. Le mécanisme conduisant à ce risque est inconnu.

Dar

son

digi

mar

Cert

prév

adju

la po

en

buvab

Consé

Ne pas

sur le c

Ne lais

Tableau

PPV: 39DH80
PER: 06/23
LOT: J1841

Laroxyl® 40 mg/ml
Amitriptyline

Gouttes buvables 20 ml



RADIOTHERAPIE PERSONNALISEE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
 RADIOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
 CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOETHERAPIE - CHIMIOETHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للمسكانر - الجراحة الإشعاعية
 العلاج الإشعاعي الباطني و الفياض - الإشعاعي النووي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستشفاء

CASABLANCA, LE

Mme/Mr. : **MAAS Bineb**

- ☒ NFS + PLAQUETTES
- ☒ UREE + CREATINEMIE **4 J 01 58**
- ☒ GLYCEMIE
- ☐ TRANSAMINASES (TGO + TGP)
- ☐ ~~SGT~~ + PHOSPHATASES ALCALINES
- ☐
- ☒ **CRP**
- ☐
- ☐
- ☐

Dr Benaboud
 Laboratoire d'Analyses Médicales
 112, Bd d'Anfa, Quartier Reja
 112, Bd d'Anfa, Quartier Reja
 Tél: 05 22 48 13 51 / 86 - Casablanca

RDV, le : à

AVEC LES RESULTATS DES ANALYSES

RADIOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
 RADIOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
 CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOETHERAPIE - CHIMIOETHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصورة - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
 العلاج الإشعاعي الباطني و الفياض - الإشعاعي النووي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE.....
FACTURE



N° de l'admission : 20010652 N° Facture : 20010725 Date facturation : 02/11/2020

Nom et prénom du patient : **ZINEB MAAS**

Convention : **PAYANT**

Traitement : **Examen radiologie** Entrée: 31/10/2020 Sortie: 31/10/2020

PRESTATIONS	nombre	prix unitaire	montant
TDM THORACIQUE	1.00	1 000.00	1 000.00
		sous-total	1 000.00

arrêtée la présente facture à la somme de :	
Mille dirhams	total : 1 000.00
Immatriculation :	
N° prise en charge :	

Notre compte bancaire : 011 780 0000192100009974 65


مركز العلاج الكندي
CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
 Oncologie & Diagnostic du Maroc
 2-4, Rue Al Kindy
 Tél. : 05 20 48 72 00 - Casablanca

RADIOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
RADIOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOOTHERAPIE - CHIMIOOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفياض - الإشعاعي النووي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE.....



090001405

اخصائيين في العلاج بالأشعة

RADIO-ONCOLOGUES

الدكتور محمد المرشد

Docteur M. EL MORCHID

الدكتور عبد اللطيف بويه

Dr A. BOUIH

الدكتورة نوال بويه

Docteur N. BOUIH

الدكتورة مالحة آيت محمد بورحيم

Docteur M. AIT MOHAMED BOURHIM

الدكتور عبد العزيز بيلا

Docteur A. BAYLA

اخصائي في العلاج بالمواد الكيميائية

ONCOLOGUE MEDICAL

الدكتور سعيد تاشفين

Docteur S. TACHFINE

طبيب المستعجلات

MEDECIN URGENTISTE

الدكتور عبد الحليم بن عبد الله

Docteur A. BENABDALLAH

الفحص بالأشعة

MEDECIN RADIOLOGUE

الدكتورة زبيدة العمراني

Docteur Z. LAMRANI

Nom du patient(e)

: Mme MAAS ZINEB

Date de réception

: 31/10/2020

Médecin prescripteur

: Dr. BENNANI

TDM THORACIQUE

TECHNIQUE :

Examen réalisé en séquences spirales reconstruites en coupes fines de 2,5mm d'épaisseur sans injection de PDC.

RESULTATS :

- Pleurésie droite de très grande abondance avec collapsus passif de tout le poumon.
- Adénopathie de la loge de Barety de 7,3mm ; pré carinaire de 9,5mm ; inter carinaire de 26,3mm ; fenêtre aorto pulmonaire de 14,1mm et hilare gauche de 26,9mm.
- Absence d'anomalie pleuro parenchymateuse controlatérale.

Confraternellement
DR. Z. LAMRANI

Dr. Z. LAMRANI
Radiologue

Insémination • Fécondation in vitro • Micro-injection (ICSI)

Mme MAAS ZINEB
Dossier N° : KIN205913136

Dossier ouvert le : 31/10/20 Prélèvement reçu à 16:05 - Edité le : 31/10/20

Page N° 1/2

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

Antériorités

*	Hématies	:	3,99	M/mm3		4 - 5,4
*	Hémoglobine	:	11,3	g/dl		11,5 - 16
	Hématocrite	:	34	%		
	V.G.M.	:	84,5	μ3		80 - 100
	C.C.M.H.	:	33,5	%		30 à 36
	T.C.M.H.	:	28,3	pg		27 à 32
	Leucocytes	:	4 630	/mm3		4000 - 10000

FORMULE LEUCOCYTAIRE

P. neutrophiles	:	84,4	%	soit	3 908	/mm3	2000 à 7500
P. éosinophiles	:	0,0	%	soit	0	/mm3	20 à 800
P. basophiles	:	0,2	%	soit	9	/mm3	0 à 200
Lymphocytes	:	11,9	%	soit	551	/mm3	1000 à 4000
Monocytes	:	3,5	%	soit	162	/mm3	200 à 1000
Plaquettes	:	154 000	/mm3				150000 - 500000

BIOCHIMIE

UREE	:	0,30	g/l		0,15 à 0,50
(Cobas C6000)	:	5	mmol/l		2,49 à 8,32

* CREATININE	:	4,7	mg/l		6 à 13
(Cobas C6000)	:	42	μmol/l		54 à 117

Dr Jalil ELMANJRA

Dr Abdelaziz LEMSEFFER

Insémination • Fécondation in vitro • Micro-injection (ICSI)

Mme MAAS ZINEB

Dossier N° : KIN205913136

Dossier ouvert le : 31/10/20 Prélèvement reçu à 16:05 - Edité le : 31/10/20

Page N° 2/2

IONOGRAMME SANGUIN

				Antériorités
SODIUM (Na ⁺)	:	136	m.eq / l	135 à 150
(Potentiométrie Cobas C6000)				
POTASSIUM (K ⁺)	:	3,7	m.eq / l	3,6 à 5,4
(Potentiométrie Cobas C6000)				
* CHLORE (Cl ⁻)	:	85	mmol/l	95 à 108
(Potentiométrie Cobas C6000)				
* RESERVE ALCALINE	:	30	m.eq / l	21 à 29
(Cobas C6000)				
PROTEINES TOTALES	:	63	g/l	60 à 80
(Cobas C6000)				
CALCIUM PLASMATIQUE	:	91	mg/l	86 à 107
(Cobas C6000)	:	2,28	mmol/l	2,15 à 2,67
* CRP (Protéine C Réactive)	:	13	mg/l	< 6
(Cobas C6000 - Technique turbidimétrique)				

Dr Jalil ELMANJRA

Dr Abdelaziz LEMSEFFER