

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Nº W19-597294

55333

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5952 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : D. YOUSSEF BOUCHARA

Date de naissance : 11/08/64

Adresse : 25 CHARAA 2 DAKKAK 9 ALA 12

Tél. : 06 71 21 24 16 Total des frais engagés : 1000 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : ELAYOUNI LAMIA Age :


Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : maladie de l'oreille

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/12/2012			200,00	INP : 0911010101 Dr BENFDI Gynécologue - Obstétricien BD Massira Maâni, Casablanca tel: 0522 942266 / 942143 fax: 0522 942128

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AIN SEBA CASABLANCA N°120 Chabab Groupement Ain Seba Casablanca NPE : 092067131473	24/12/2012	1317,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : []
[Diagramme d'ODF (Omnidirectionnel) avec numérotation des dents]	[]	[]	[]	COEFFICIENT DES TRAVAUX []
				MONTANTS DES SOINS []
				DEBUT D'EXECUTION []
				FIN D'EXECUTION []
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []
				MONTANTS DES SOINS []
				DATE DU DEVIS []
				DATE DE L'EXECUTION []

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

• Dr.BENFDIL M.Azeddine

Gynécologue - Obstétricien
Stérilité - Sénologie - Echographie
Chirurgie Gynécologique

Clinique Racine - Bd.Massira, CASABLANCA

Tél. : 05 22 94 22 66 / 94 21 43 / 36 24 53 / 36 22 42
Fax : 05 22 94 21 28 / 36 25 31 - E-mail : mbenfdil@yahoo.fr



الدكتور بنفديل م. عز الدين

إخلاصي في أمراض النساء والتوليد
أمراض الثدي - التصوير الصوتي - العقم

مصحة راسين شارع المسيرة - الدار البيضاء

تليفون : 05 22 94 22 66 / 94 21 43 / 36 24 53 / 36 22 42

Fax : 05 22 94 21 28 / 36 25 31 - E-mail : mbenfdil@yahoo.fr

Casablanca, le

24/12/20

الدار البيضاء في

20201224011 ELAYOUKI LAMIA

84.00 x 12

duphaston

65.- 2comp/j le soir 5j>>>25j(6cycles)

Vgel

TOILETTE INTIME

biopartial

2COMP/J

exacyl500

3COMP/J xregles

dicynone500


3COMP/J xregles

ponstyl


3COMP/J xregles

= 1317.00

Dr BENFDIL M. Azeddine
Gynécologue - Obstétricien
Bd Massira Maârif, Casablanca
Tél: 0522 94 22 66 / 94 21 43
Fax: 0522 94 21 28



PHARMACIE ATLAS
N°7 Lot Chabab Groupe C2
Ain Sebaa CASABLANCA
INPE : 092067115
Tél : 05 22 73 74 73



Numéro de lot /
À utiliser de préférence
avant fin : voir sous le flacon.
PPC : 65.00 Dhs

Biomartial

LIPOFER
microcapsules

FORME ET PRESENTATION :

Célule, Boîte de 30.

COMPOSITION (par gélule) :

Substance active: Fer micronisé et microencapsulé (Lipofer); agent de charge: amidon de maïs ; anti-agglomérant : stéarate de magnésium ; Lubrifiant : talc ; capsule végétale en HPMC (hypromellose)

PROPRIETES :

Biomartial LIPOFER est un complément alimentaire à base de fer.

Le fer est un oligo-élément nécessaire à notre organisme.

Il contribue notamment :

A la synthèse de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène,

Au fonctionnement normal du **système immunitaire**,

A réduire la **fatigue**,

Au développement normal des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION :

Selon la prescription médicale..

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas dépasser

Ne pas laisser

A conserver à

Fabriqué par

Promotion mé

Complément c

ONSSA N°: CAI

Enregistré au min.

N° DA2020200231

LOT: 2003011
FAB: 09/2020
EXP: 09/2023
PUC: 123,00DH

OC

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH



lique à vous (ou en cas de doute), il est de votre médecin ou de votre pharmacien comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables peuvent également concerner les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la hydrogestérone. Chaque comprimé contient 10 mg de hydrogestérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



1117611

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la hydrogestérone. Chaque comprimé contient 10 mg de hydrogestérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH



lique à vous (ou en cas de doute), il est de votre médecin ou de votre pharmacien comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables peuvent également concerner les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la hydrogestérone. Chaque comprimé contient 10 mg de hydrogestérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays bas 08/2017



1117611

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017



Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Votre médecin sera particulièrement attentif aux bénéfices et aux risques du THS.

Intervention chirurgicale Si vous devez subir une intervention chirurgicale, informez votre chirurgien que vous prenez un THS bien avant l'opération. Il sera peut-être nécessaire d'arrêter le traitement THS quelques semaines avant l'opération. Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre THS.

THS et troubles coronariens Deux grandes études portant sur un type spécifique de THS (estrogènes conjugués combinés avec de l'acétate de ménoprostéron) ont montré que le risque de maladies cardiovasculaires pouvait être plus élevé au cours de la première année de THS. Il n'est pas encore clair si cela s'applique également à d'autres types de THS. Si vous avez une douleur dans la poitrine qui s'étend à votre bras ou à votre cou : - consultez votre médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cette douleur peut être le signe d'une crise cardiaque.

THS et crise cardiaque Le risque d'accident vasculaire cérébral est d'environ 1,5 fois plus élevé chez les femmes prenant un THS que chez les femmes qui n'en prennent pas. Le nombre de cas supplémentaires d'accident vasculaire cérébral à la suite d'un traitement par THS augmente avec l'âge.

Comparaison

Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui n'utilisent pas de THS, en moyenne 8 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral. Sur une période de 5 ans, parmi les femmes âgées de 50 ans qui utilisent le THS, 11 femmes sur 1000 ont un accident vasculaire cérébral (c'est-à-dire 3 cas supplémentaires pour 1000 femmes).

Si vous avez des maux de tête sévères inexplicables ou une migraine (qui peut s'accompagner de troubles de la vision) : - consultez un médecin dès que possible - ne prenez plus de THS jusqu'à ce que votre médecin vous dise que vous pouvez reprendre le traitement. Cela peut être un signe d'alerte précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Enfants et adolescents

Duphaston 10 mg comprimé pelliculé n'est pas destiné aux enfants qui n'ont pas encore eu leurs premières règles.

Autres médicaments et Duphaston 10 mg comprimé pelliculé

Si vous prenez ou avez pris récemment ou pourraient prendre un autre médicament. Cela comprend les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous devez informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants. Ces médicaments peuvent réduire l'effet de Duphaston et conduire à un saignement irrégulier. - préparations à base de plantes contenant du millepertuis (Hypericum perforatum), - médicaments anticonvulsivants (tels que phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine, primidon), - médicaments anti-infectieux (tels que la rifampicine), - médicaments pour traiter les infections par VIH (SIDA) (tels que zidovudine, névirapine, éfavirenz), - médicaments contre le

S in Maçhar
in Km 10, Route Côtière 111, O
av Ql Zemata Aïn seba Casablanca
DI DUPHASTON 10 MG CP
PEL B20 MV
PPV : 84,90 DH

olique à vous (ou en cas de doute), il est
de votre médecin ou de votre pharmacien
comprimé pelliculé.

pelliculé avec des aliments et des boissons
il peut être pris avec ou sans nourriture.

Les effets indésirables signalés sont les effets indésirables directement via le Centre national de pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver ce médicament ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et la plaquette après la mention EXP utilisé pour la date de péremption (mois et année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Que contient ce médicament

- La substance active dans ce médicament est : la dydrogéstérone. Chaque comprimé contient 10 mg de dydrogéstérone.
- Noyau du comprimé, les autres composants sont : lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.
- Pelliculage du comprimé, les autres composants sont : hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que Duphaston 10 et contenu de l'emballage extérieur

- Comprimé pelliculé sécable blanc, rond et biconvexe, avec une ligne de sécabilité et un diamètre de 7 mm.
Portant l'inscription '155' sur les deux côtés de la ligne de sécabilité. La ligne de sécabilité du comprimé n'est là que pour faciliter la prise du comprimé en facilitant la division, (voir aussi la section 3 de cette notice).
- Les comprimés sont conditionnés en plaquettes thermoformées d'aluminium / PVC.
- Duphaston 10 mg est disponible dans des boîtes de 1 ou 2 plaquettes contenant chacune 10 comprimés de 10 mg.
- Duphaston est sous forme de boîte de 10 et 20 comprimés pelliculés.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc et Fabricant

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché au Maroc

Laboratoires Maphar

Km 10, route côtière 111

Quartier industriel

Zenata-Aïn Sébâa

Maroc

Rachid LAMRINI - Pharmacien Responsable

Fabricant

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst

Pays-Bas

Dernière révision : selon le RCP Pays Bas 08/2017

