

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° W19-592478

56073

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 05442 Société : RA7

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : NYAZI BRAHIM

Date de naissance : 10/01/1960

Adresse : 81, HAY NATAT AIN SEBAI
CASA

Tél. : 0663653028 Total des frais engagés : 622,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. DIA TADIC
Omnipraticien
Allée des Amadiers Résidence Amadiers
N° 85 Rez de Chaussées N° 14 Ain Seba
Casablanca - Tél: 06.64.44.66.66

Date de consultation : 11/01/21

Nom et prénom du malade : NYAZI BRAHIM Age : 61

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Maladie typique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 13/01/21

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
BA 02/02	cl	cl	2090 78	INP : [Signature] Dr. DLIA TANG Omnipraticien des Amandiers Résidence Amandiers Chaussées N° 14 Ain-Sek 06.54.44.65.6

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p>PHARMACIE EL-DORANI</p> <p>11, Allée des Orangers - Aïcha</p> <p>Casablanca</p> <p>TEL: 05 22 34 38 88</p> <p>ZAKOU Aïcha</p>	13/01/21	4373

[illegible]



AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>H</p> <p>25533412 21433552</p> <p>00000000 00000000</p> <p>D ————— G</p> <p>00000000 00000000</p> <p>35533411 11433553</p> <p>B</p> </div> </div>			Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	<p>[Création, remont, adjonction]</p> <p>Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Tarik DLIA



الدكتور طارق اضليعة

• Omnipraticien

Diplômé de la Faculté
de Médecine et de Pharmacie
de Casablanca

طبيب عام

خريج كلية الطب و الصيدلية
جامعة الحسن الثاني
الدار البيضاء

13 Janv 2021

13 1

M. Youssef BERRAM.

Be

17.10

AMARIL Arg.



1 — 2 — D. Boté

1520

Gluphage Arg.

1 — 1 — 1 Boté

1320

Leroact Arg.

1 — 2 — 2 Boté

cardinal 300 Arg.

0 — 1 — 2 Boté



164,00

un - Zouita. Po - le



lepp 2/6 - 60 v

u373

Dr. ELIA Tariq
Omnipraticien

Allée des Amandiers Residence Amalide
N° 85 Rez de Chaussée N° 14 Al Sebaa
Casablanca - Tél: 06.64.44.66.66

PHARMACIE FLEURS D'ORANGERS
SARL

11, Allée des Orangers - Al Sebaa
Casablanca - Tél: 05 22 34 38 88
ZAQUI Aicha

جليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف **جليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف** **جليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف**

كلوريدات المتفورمين

● قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.

احفظ بديده النشرة، إذ تحتاج لقراءتها من جديد.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى لا كنت لديك شاك، اسأل الطبيب عن المعلومات عن الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه أبداً لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأنك قد تسبب له الضرر.

إذا تأقلم أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيراً غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج ؟
- 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج ؟ قرص مغلف ؟
- 3- ما هي طريقة تناول جليكوفاج ؟ قرص مغلف ؟
- 4- ما هي الآثار الجانبية غير المرغوبة المحتملة ؟
- 5- ما هي طريقة حفظ جليكوفاج ؟ قرص مغلف ؟
- 6- متيوية العلية و معلومات إضافية.
- 7- ما هي جليكوفاج ؟ قرص مغلف وما هي حالات استعماله ؟

الصفحة الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال :

يستخدم جليكوفاج في متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية

أسماء بيفوغلنيد.

الإنسولين هرمون يتحكم في السكراس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر)

المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدام لاحقاً.

عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتج بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم.

يساعد جليكوفاج على تخفيض معدل الجلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتتناول من وزن زائد، يساعد ذلك تناول جليكوفاج على المدى الطويل المساعدة على فقدان من أخطار المضاعفات المسببة للسكري. يتركز جليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بقليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها جليكوفاج ؟

يستخدم جليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 (السمي ذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح الغذاء والدوائي والتدبير البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى يعانون من زيادة الوزن.

يستخدم جليكوفاج بالاقتران تناول جليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدم أو الإنسولين).

يستخدم الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمرافقون تناول جليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول جليكوفاج ؟ قرص مغلف ؟

موانع الاستعمال :

لا تتناول أبداً جليكوفاج في الحالات التالية:

● إذا كنت تعاني من الأرجية (الحساسية المفرطة) تجاه المتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

● إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.

● إذا كنت تعاني من سوء دوار في وظائف الكلى.

● إذا كنت تعاني من سكرى غير متحكم به، يصبح مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لعدل السكر).

● إذا كنت تعاني من سكرى غير متحكم به، يصبح مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لعدل السكر).

● إذا كنت تعاني من سكرى غير متحكم به، يصبح مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لعدل السكر).

● إذا كنت تعاني من سكرى غير متحكم به، يصبح مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لعدل السكر).

● إذا كنت تعاني من سكرى غير متحكم به، يصبح مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لعدل السكر).

● إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

● إذا اضطررت إلى أخذ هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

يجب استشارة الطبيب في حالة :

● إذا كنت تتناول الحبوب للحصن للتصوير الشعاعي أو السكانز والذي قد يقتضي حقن مادة مبيئة تحتوي على اليود في دورتك الدورية.

● إذا كنت متقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

● يجب التوقف عن تناول جليكوفاج بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. يسفر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع عدد تعليمات الطبيب.

يجب الانتباه من تفاعلات جليكوفاج

خطر الحماض اللبني

قد تسبب جليكوفاج مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض اللبني، خاصة إذا كانت هناك مشاكل في الكلى. تتجلى بصورة واضحة، كما أن خطر الحماض اللبني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية (والجفاف) لفترة الطويل بالإضافة أدناه (ومشاكل في الكلى وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول جليكوفاج لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بالجفاف (فقدان مهم لسوائل الجسم) مثل القيء، الشدي، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو شرب سوائل أقل من المعتاد. من المهم مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول جليكوفاج وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بـقارب مستشفي إذا كنت تعاني من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى عيوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:

● القيء.

● اضطراب في المعدة (الآم في البطن)

● تقلصات العضلات

● الشعور بالغث بعد الراحة مرتبطة بتعب كبير

● صعوبة في التنفس

● انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى.

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول جليكوفاج في وقت وبعد العملية.

سوف يقرر طبيبك متى تتوقف وتتأكد من أنك قد استخدمت جليكوفاج.

جليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت جليكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل الأسفاديوات المنخفضة معدل السكر في الدم، الإنسولين، الخليةبتيدات). هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم، إذا أصبحت بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الجوع، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، ضعف في الرؤية، الدوخة، غث في فمك أو أكل شيء ما، يحتوي على سكر قد يساعد على تصفية وإزالة الإسماع بالأسبق.

أثناء فترة العلاج بجليكوفاج، سوف يتم فحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و / أو قد تطور وظائف الكلى.

الاطفال لا ينبغي.

معلومات عن سوافات لها تأثير ملحوظ لا ينبغي.

تتأثر أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت متقبلاً على حقن وعائي عن مادة مبيئة تحتوي على اليود، مثلاً لفحص بالأشعة أو بالسكانز، عليك إعلام الطبيب قبل وبعد الحقن، سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول جليكوفاج.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط كمية الجرعة.

من المهم معرفة خاصة الأعلام عن الأدوية التالية

التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

للمستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو كبريت، إيبوبروفين وسيليكوكسيب).

أدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو كبريت، إيبوبروفين وسيليكوكسيب).

سيتقلبت بيتا-2-أدرينالية مثل سالبوتامول أو تيروبوتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، تريويد (المستعملة لعلاج مختلف الاغلات خاصة التهابات الحادة للبلد أو الربو)، التي قد تؤثر على كمية الجلوكوفاج في الدم، وخاصة إذا كنت وظائف الكلى مثل فيرأيميل، ريفاميسين، سميتينين، دوفلوتيفير، رانولازين، تريمتوبريم، إيزافونازول، كريفونتين و / أو ألابري.

ي مستعملة لعلاج السكري.

مع الكحول:

طبي استهلاك الكحول مع الأخذ جليكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض اللبني.

الخصائص وتسمم الحماض اللبني.

وضع

45,20

Amarel® 1 mg, 2mg, 3mg, 4mg

Glimépide
Comprimé

SANOFI

1. QU'EST-CE QUE AMAREL COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AMAREL, comprimé est un antidiabétique oral, appartenant à la famille des sulfonylurées, qui diminue le taux de sucre dans le sang.

AMAREL, comprimé agit en augmentant la qualité d'insuline libérée par votre pancréas. L'insuline fait ensuite baisser votre taux de sucre dans le sang.

Dans quel cas AMAREL, comprimé est-il utilisé ?

AMAREL, comprimé est utilisé dans le traitement du diabète sucré de type 2, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids ne sont pas suffisants pour contrôler à eux seuls les taux de sucre dans le sang.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMAREL, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais AMAREL, comprimé et informez votre médecin :

- si vous êtes allergique (hypersensible) : au glimépide, aux autres sulfonylurées (médicaments utilisés pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, tels que le glibenclamide), aux sulfamides antibactériens (médicament pour les infections bactériennes, tels que le sulfaméthoxazole), ou à l'un des autres composants contenus dans AMAREL, comprimé (voir « Que contient AMAREL, comprimé ») ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (diabète de type 1) ;
- en cas de décompensation acido-cétosique (complication du diabète lorsque votre taux d'acide dans le sang est augmenté et vous pouvez présenter certains des signes suivants : fatigue, sensation de malaise (nausées), urines fréquentes et raideur musculaire) ;
- en cas de coma diabétique ;
- si vous avez une maladie grave des reins ;
- si vous avez une maladie grave du foie.

Si vous présentez l'une des situations évoquées ci-dessus, ne prenez pas ce médicament.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Faites attention

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin ou votre pharmacien si :

- Vous vous rétablissez d'une blessure, d'une intervention chirurgicale, d'une infection avec fièvre, ou de tout autre forme de stress, informez votre médecin car un changement temporaire de votre traitement peut être nécessaire.
- Vous avez un problème grave au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Si vous n'êtes pas sûr que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMAREL, comprimé.

Une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir chez les patients porteurs d'un déficit enzymatique en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) (maladie héréditaire des globules rouges).

Les informations disponibles sur l'utilisation d'AMAREL, comprimé chez les patients de moins de 18 ans sont limitées. Par conséquent, son utilisation chez ces patients n'est pas recommandée.

Informations importantes sur l'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang)

Lorsque vous prenez AMAREL, comprimé, une hypoglycémie peut survenir (faible taux de sucre dans le sang). Veuillez lire les informations supplémentaires ci-dessous sur l'hypoglycémie, ses signes et symptômes.

Les facteurs suivants peuvent favoriser la survenue d'une hypoglycémie :

- malnutrition, horaires de repas irréguliers, saut de repas, retard dans la prise d'un repas, période de jeûne ;

- modification du régime alimentaire ;
 - prise de plus d'AMAREL, comprimé que ce dont vous avez besoin ;
 - fonction rénale diminuée ;
 - maladie grave du foie ;
 - si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles de la glande thyroïde, de la glande hypophysaire ou des glandes surrénales) ;
 - consommation d'alcool (en particulier en l'absence de repas) ;
 - prise de certains autres médicaments (voir « Prise d'autres médicaments ») ;
 - si votre activité physique est augmentée, si vous ne mangez pas suffisamment que vous mangez des aliments contenant moins de glucides qu'habituellement.
- Les signes de l'hypoglycémie incluent :

- faim intense, maux de tête, nausées, vomissement, apathie, somnolence, troubles du sommeil, agitation, agressivité, difficultés de concentration, diminution de la vigilance et des réactions, dépression, confusion, troubles visuels et de la parole, difficulté à articuler, tremblement, paralysie partielle, troubles sensitifs, vertiges, sensation de faiblesse.

- les signes suivants peuvent également survenir : sueurs abondantes, peau moite, anxiété, accélération du pouls, hypertension artérielle, palpitation, douleurs intenses, et soudaine dans la poitrine pouvant irradier dans les régions voisines (angine de poitrine et troubles de rythme cardiaque).

Si votre taux de sucre dans le sang continue de baisser, vous pouvez présenter : une altération confusional important (délire), des convulsions, une perte de la maîtrise de soi, une respiration courte et rapide, un ralentissement de votre rythme cardiaque, une perte de connaissance. Une hypoglycémie sévère peut également ressembler à une attaque cérébrale.

Traitement de l'hypoglycémie :

Dans la plupart des cas, les signes d'hypoglycémie disparaissent très rapidement après l'ingestion de sucre : par exemple morceaux de sucre, boisson sucrée ou thé sucré. Vous devez donc toujours avoir du sucre (morceaux de sucre) avec vous. Par contre, les édulcorants de synthèse ne sont pas efficaces.

Contactez votre médecin ou allez à l'hôpital si l'ingestion de sucre n'est pas efficace ou en cas de réapparition des symptômes.

Tests de laboratoire

Votre taux de sucre dans le sang ou dans les urines doit être contrôlé régulièrement. Votre médecin peut vous demander de faire des analyses de sang pour vérifier le nombre de cellules sanguines ainsi que votre fonction hépatique.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose d'AMAREL, comprimé si vous prenez d'autres médicaments. En effet, ceux-ci peuvent diminuer ou augmenter l'effet d'AMAREL, comprimé sur votre taux de sucre dans le sang.

L'effet d'AMAREL, comprimé (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entraîner un risque d'hypoglycémie :

- autres médicaments pour traiter le diabète (tels que l'insuline ou la metformine) ;
- médicaments pour traiter la douleur ou l'inflammation (phénylbutazone, azopropazone) ;

- médicaments

- médicaments

- médicaments

- médicaments

- médicaments

- médicaments

- médicaments

- médicaments

- médicaments

- médicaments

AMAREL 1MG
CP B30

P.P.V : 51D10



6 118000 060024

s sulfamides

(tétracycline
mycine) ;
es K de type

nts) ;
nes sexuelles