

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Optique

Autres

56521

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

9585

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : LAFLAÏKH ABBE S

Date de naissance : 1963/01/01

Adresse : HAY MABROUKA N°51 Rue 3

Tél. : 0641866263

Total des frais engagés :  Dhs

Cadre réservé au Médecin

Docteur Raja EDDAIIAR  
Médecine Générale - D.U. Diabétologie  
D.U. Echographie Générale  
91, Rue 17 Hay Mokhtar Soussi-Mabrouka  
Casablanca - Tél: 05 22 38 01 50



Date de consultation : 13/01/2022

Nom et prénom du malade : SAADAK MIND Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Diabète + Séniorité

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/11/21	c	-	150,00	Docteur Raja EDDAHLI Médecine Générale - D.U. Diabète et Maladie D.U. Echographie Générale Rue 17 Hay Mokhtar Souss Mibrouka Casablanca - Tel: 05 22 38 01 50

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
دكتور راجا إدلاهي العنوان: 17 حي مختار سوس مبروكا ال☎: 05 22 38 01 50	13/11/21	1.085,50

## ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES	DENTÉRATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553		
	D 00000000 00000000	B 00000000 00000000		
CŒFFICIENT DES TRAVAUX	MONTANTS DES SOINS			
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
DATE DU DEVIS	DATE DE L'EXECUTION			
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS      VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				

# Docteur Raja EDDAHAR

MEDECINE GENERALE  
Diabétologie  
D.U Echographie Générale

91, Rue 17 hay Mokhtar Soussi  
Mabrouka - Casablanca  
Tél. : 05 22 38 01 50

الدكتورة رجاء الظاهر

الطب العام  
أمراض السكر  
الإيكوغرافيا العامة

زنقة 17 حي المختار السوسي  
مربوكة - الدار البيضاء  
الهاتف : 05 22 38 01 50

Casablanca, le .....

13/01/2021

SA DOK MINI èt LSTRATH

12360  
XIV  
صيادلة حي السلام  
دكتور راجا ماجدة ماجدة  
العنوان: زنقة 17 حي المختار السوسي  
المدينة: مربوكة  
البلد: المغرب  
التلفون: 05 22 38 01 50

3620  
x9

17.00 - ~~SA DOK~~  
Docteur Raja EDDAHAR  
MEDECINE GENERALE - D.O. Diabetologie  
91, Rue 17 Hay Mokhtar Soussi Mabrouka  
Casablanca - Tél: 05 22 38 01 50

21.00 -

~~Conspicua 10 (1)~~

1st (1)

Banquette C

صيادلة حي السلام  
دكتور راجا ماجدة ماجدة  
العنوان: زنقة 17 حي المختار السوسي  
المدينة: مربوكة  
البلد: المغرب  
التلفون: 05 22 38 01 50

Docteur Raja EDDAHAR  
MEDECINE GENERALE - D.O. Diabetologie  
91, Rue 17 Hay Mokhtar Soussi Mabrouka  
Casablanca - Tél: 05 22 38 01 50

7.5

2nd. Vape  
Pen

S.V.

Docteur Raja EDDAHAR  
MEDECINE GENERALE - D.O. Diabetologie  
91, Rue 17 Hay Mokhtar Soussi Mabrouka  
Casablanca - Tél: 05 22 38 01 50

2nd. app for

3rd + 1st + 1st  
plus long + 1st  
plus long + 1st  
plus long + 1st

1st (1)  
2nd

ID:646508 GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV :17,40 DH  
6 118000 161295

ID:646508 GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV :17,40 DH  
6 118000 161295

ID:646508 GlaxoSmithKline Maroc  
Ain El Aouda  
Région de Rabat  
PPV :17,40 DH  
6 118000 161295

LOT : 1015  
UT.AV: 04-23  
PP.V: 22 DH 40

125,60

125,60

125,60

22,70

125,60

LOT 200965 2  
EXP 04 2023  
PPV 40.00

40,00

LOT 200965 1  
EXP 04 2023  
PPV 40.00

40,00

LOT 202004  
EXP 09 2023  
PPV 40.00

LOT 202004  
EXP 09 2023  
PPV 40.00

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguine avec des Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé • si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, c

Veuillez particulièrement lactique : STAGID complications appelée particulier fonctionne Le risque également diabète n prolongé d'alcool. l'acidose vomissement ventre (d avec cramp sensations avec une difficultés vous tr situation besoin immédiat un traitement lactique

immédiat un traite

l'insuffisanc

comprimé

comprimé

comprimé

comprimé

comprimé

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguine avec des Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé • si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, c

Veuillez particulièrement lactique : STAGID complications appelée particulier fonctionne Le risque également diabète n prolongé d'alcool. l'acidose vomissement ventre (d avec cramp sensations avec une difficultés vous tr situation besoin immédiat un traitement lactique

immédiat un traite

l'insuffisanc

comprimé

al l'

D a

l'hy

dans

cependan

STAGID

d'autres m

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguine avec des Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé • si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, c

Veuillez particulièrement lactique : STAGID complications appelée particulier fonctionne Le risque également diabète n prolongé d'alcool. l'acidose vomissement ventre (d avec cramp sensations avec une difficultés vous tr situation besoin immédiat un traitement lactique

immédiat un traite

l'insuffisanc

cardiaque graves et

sanguine avec des

Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé

• si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

l'insuffisanc

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguine avec des Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé • si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, c

Veuillez particulièrement lactique : STAGID complications appelée particulier fonctionne Le risque également diabète n prolongé d'alcool. l'acidose vomissement ventre (d avec cramp sensations avec une difficultés vous tr situation besoin immédiat un traitement lactique

immédiat un traite

l'insuffisanc

cardiaque graves et

sanguine avec des

Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé

• si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

l'insuffisanc

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguinolentes, avez des antécédents d'apport qui peut entraîner une acidose lactique.

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable

Veuillez particulièrement faire attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable lorsque vous avez une infection grave, une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique.

Le risque d'acidose lactique est également augmenté chez les personnes diabétiques, mais aussi chez celles qui prennent des médicaments pour traiter le diabète. L'acidose lactique peut entraîner des symptômes tels que la faiblesse, la sueur, la confusion mentale et la mort. Si vous avez ces symptômes, contactez immédiatement un professionnel de la santé ou un centre d'urgence.

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguinolentes, avez des antécédents d'apport qui peut entraîner une acidose lactique.

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable

Veuillez particulièrement faire attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable lorsque vous avez une infection grave, une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique.

Le risque d'acidose lactique est également augmenté chez les personnes diabétiques traitées par STAGID 700 mg, comprimé sécable. L'acidose lactique peut entraîner des symptômes tels que la faiblesse, la sueur, la confusion, la somnolence et la mort. Si vous présentez ces symptômes, contactez immédiatement votre médecin ou un centre de soins d'urgence.

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguine avec des Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé • si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, c

Veuillez particulièrement lactique : STAGID complications appelée particulier fonctionne Le risque également diabète n prolongé d'alcool. l'acidose vomissement ventre (d avec cramp sensations avec une difficultés vous tr situation besoin immédiat un traitement lactique

immédiat un traite

l'insuffisanc

comprimé

comprimé

comprimé

comprimé

comprimé

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguinolentes, avez des antécédents d'apport qui peut entraîner une acidose lactique.

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable

Veuillez particulièrement faire attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable lorsque vous avez une infection grave, une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique.

Le risque d'acidose lactique est également augmenté chez les personnes diabétiques traitées par STAGID 700 mg, comprimé sécable. L'acidose lactique peut entraîner des symptômes tels que la faiblesse, la sueur, la confusion, la douleur abdominale et la mort. Si vous présentez ces symptômes, contactez immédiatement votre médecin ou un centre de soins d'urgence.

# STAGID 700 mg, comprimé sécable Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

- Ne prenez jamais STAGID 700 mg, comprimé sécable dans les cas suivants :
  - si vous êtes allergique (hypersensible) à la metformine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
  - si vous avez des problèmes liés à vos reins ou votre foie,
  - si vous avez un diabète non contrôlé, s'accompagnant par exemple d'une hyperglycémie sévère (taux de sucre trop élevé dans le sang), de nausées, de vomissements, d'une déshydratation, d'une perte de poids rapide ou d'une acidocétose. L'acidocétose est une affection qui consiste en une accumulation dans le sang de substances appelées « corps cétoniques » et qui peut provoquer un précoma diabétique. Les symptômes sont plus particulièrement une douleur à l'estomac, une respiration rapide et profonde, une envie de dormir ou une haleine ayant une odeur fruitée inhabituelle,
  - si vous avez perdu trop d'eau (déshydratation), par exemple suite à une diarrhée persistante ou sévère, ou si vous avez vomi plusieurs fois d'affilée. La déshydratation peut entraîner des problèmes de reins, qui peuvent vous mettre en danger d'acidose lactique (voir « Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable »),
  - si vous avez une infection grave, par exemple une infection des poumons,

comprimé sécable » ci-dessous).

- si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque graves et sanguine avec des Ceci peut d'apport qui peut d'acidose attention comprimé • si vous d'alcool. Si l'un des à vous, pa avant de ce médicame

## • Faites attention avec STAGID 700 mg, c

Veuillez particulièrement lactique : STAGID complications appelée particulier fonctionne Le risque également diabète n prolongé d'alcool. l'acidose vomissement ventre (d avec cramp sensations avec une difficultés vous tr situation besoin immédiat un traitement lactique

immédiat un traite

l'insuffisanc

comprimé

comprimé

comprimé

comprimé

comprimé