

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M20- 0004122

57119

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : Société :
 Actif Pensionné(e) Autre :
Nom & Prénom : **KHADDIoui CHAIBIA**
Date de naissance : **01-01-1925**
Adresse : **AIN CHOIR DERB EL KHICIR RUE 9**
N° 5 CASA
Tél. : **0663 81 37 01** Total des frais engagés : **350 + 482,2** Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : 
Date de consultation : **31/12/2020**
Nom et prénom du malade : Age :
Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
Nature de la maladie : **Affecta neuro psychiatrique**
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : **09/01/21**
Signature de l'adhérent(e) : 

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Dr RGUIBI LOUAFI

Psychiatre

Diplômé de la Faculté

de médecine de Paris

Consultant, ancien chef service

et chef consultation au C.H.S. de Taïf

Centre Abdelmoumen - Angle Bd Abdelmoumen

et Bd Anoual (Derb Ghalef) - Casablanca

Tél.: 05.22.86.02.65 / 05.22.86.00.78

Sur Rendez-vous

الدكتور ارگيبى الوفي

اختصاصي في الأمراض النفسية والعقلية

خريج كلية الطب بباريس

استشاري الطب النفسي

رئيس مصلحة ومدير العيادات

الخارجية بـ م.ص.ن. بالطائف (سابقا)

مركز عبد المومن - تقاطع شارع عبد المومن

وشارع أنوال (درب غلف) الدار البيضاء

الهاتف : 05.22.86.00.78 / 05.22.86.02.65

بالموعود



Casablanca, le 31/12/2020 في الدار البيضاء، في

Dr JESSAMI CHABRI

58.30 x 3
234.90

1) Atypical 38



14308

0-0-1) 3 mois

19.50 x 5
119.00

2) Alpridol (P)



14313

LOT : 20E003
PER.: 07 2022

TEMESTA 1MG
CP SEC B50
P.P.V : 23DH00



LOT : 19E002
PER.: 11 2021

TEMESTA 1MG
CP SEC B50
P.P.V : 23DH00



0-0-1) 3 moi
23.00 x 3
69.00

3) Temesta 1



14360

LOT : 19E002
PER.: 11 2021

TEMESTA 1MG
CP SEC B50
P.P.V : 23DH00



Dr. RGUIBI Louafi
- Psychiatre -

Centre Abdelmoumen, Angle Boulevard
Abdelmoumen & Bd Anoual (Derb Ghalef)
Casablanca - Tél. : 05 22 86 00 78

ATHYMIL 30 mg

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 20
DCI : Chlorhydrate de miansérine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament

Principe actif :

Chlorhydrate de miansérine...

Les excipients :

Amidon de pomme de terre, Si
Méthylcellulose, Hydrogénoph
Dioxyde de titane.

Excipients à effet notoire : Néa

2. Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est un antidépresseur

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N06AX03

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs

4. Posologie

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin.

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous ressentez une amélioration.

Votre médecin, dans certains cas, pourra adapter progressivement la posologie.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Avalez les comprimés avec un verre d'eau sans les croquer.

Fréquence d'administration

La dose quotidienne pourra être répartie au cours de la journée ou administrée de préférence le soir au coucher.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin et n'arrêtez pas la prise de ce médicament sans son avis.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable :

- si vous êtes allergique à la miansérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « composition ».
- maladie du foie sévère.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :

- association avec l'alcool (voir rubrique « interactions avec d'autres médicaments »).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- somnolence,
- sécheresse de la bouche,

- constipation.

Rarement :

- convulsions,
- prise de poids,
- douleurs articulaires,
- œdème (gonflement),
- douleurs musculaires,
- élévation des enzymes du foie, fonction hépatique anormale.

Exceptionnellement :

- agranulocytose (taux anormalement bas des globules blancs dans le sang).

En cas d'apparition d'une fièvre, d'une angine, d'une éruption cutanée, consultez immédiatement votre médecin.

LOT 200813
EXP 06/2023
PPV 98.30DH

Athymil® 30 mg
Comprimés pelliculés
sécables



des idées d'auto-agression (agression envers soi-même) peuvent être majorées au début du traitement car ce type de médicament n'agit pas tout de suite. Vous êtes plus susceptible de présenter ces manifestations si vous êtes plus âgé.

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou si vous êtes un jeune adulte. Les études ont montré que le risque de comportement suicidaire était accru chez les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique et traitées par anti-dépresseurs.
- si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression avant de commencer votre traitement ou allez directement à l'hôpital si vous pouvez vous faire aider par un ami ou un proche.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un proche. Si vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble de l'humeur, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez lui demander de vous accompagner lors de votre consultation. Si votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou si vous présentez des idées suicidaires, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans : ATHYMIL ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants de moins de 18 ans. Il est également important de noter que les enfants de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables, notamment des idées suicidaires et comportement hostile (comportement d'opposition et colère) lorsqu'ils prennent des médicaments. Néanmoins, il est possible que votre médecin vous prescrive ATHYMIL à des patients de moins de 18 ans si le bénéfice attendu pour votre patient est supérieur au risque. Si votre médecin a prescrit ATHYMIL à votre enfant, discutez avec votre médecin de la nécessité de continuer le traitement. Si vous désirez en discuter, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous remarquez des symptômes non mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La prise de ATHYMIL par un patient de moins de 18 ans peut entraîner des effets indésirables graves, notamment une diminution de la sécurité à long terme concernant le développement cognitif et comportemental.

ATHYMIL 30 mg

Comprimés pelliculés sécables - Boîte de 20
DCI : Chlorhydrate de miansérine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition du médicament

Principe actif :

Chlorhydrate de miansérine...

Les excipients :

Amidon de pomme de terre, Si
Méthylcellulose, Hydrogénoph
Dioxyde de titane.

Excipients à effet notoire : Néa

2. Classe pharmaco-thérapeutique

Ce médicament est un antidépresseur

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N06AX03

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs

4. Posologie

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin.

N'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, même si vous ressentez une amélioration.

Votre médecin, dans certains cas, pourra adapter progressivement la posologie.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Avalez les comprimés avec un verre d'eau sans les croquer.

Fréquence d'administration

La dose quotidienne pourra être répartie au cours de la journée ou administrée de préférence le soir au coucher.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Le traitement est habituellement de plusieurs mois (de l'ordre de 6 mois).

Conformez-vous strictement à la prescription du médecin et n'arrêtez pas la prise de ce médicament sans son avis.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

5. Contre-indications

Ne prenez jamais ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé sécable :

- si vous êtes allergique à la miansérine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « composition ».
- maladie du foie sévère.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être utilisé dans les cas suivants, sauf avis contraire de votre médecin :

- association avec l'alcool (voir rubrique « interactions avec d'autres médicaments »).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- somnolence,
- sécheresse de la bouche,

- constipation.

Rarement :

- convulsions,
- prise de poids,
- douleurs articulaires,
- œdème (gonflement),
- douleurs musculaires,
- élévation des enzymes du foie, fonction hépatique anormale.

Exceptionnellement :

- agranulocytose (taux anormalement bas des globules blancs dans le sang).

En cas d'apparition d'une fièvre, d'une angine, d'une éruption cutanée, consultez immédiatement votre médecin.

LOT 200813
EXP 06/2023
PPV 98.30DH

Athymil® 30 mg

Comprimés pelliculés
sécables



des idées d'auto-agression (agression envers soi-même) peuvent être majorées au début du traitement car ce type de médicament n'agit pas tout de suite. Vous êtes plus susceptible de présenter ces manifestations si vous êtes plus âgé.

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou si vous êtes un jeune adulte. Les études ont montré que le risque de comportement suicidaire était accru chez les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique et traitées par anti-dépresseurs.
- si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression avant de commencer votre traitement ou allez directement à l'hôpital si vous pouvez vous faire aider par un ami ou un proche.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un proche. Si vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble de l'humeur, consultez votre médecin. Cette notice vous pouvez lui demander de vous aider. Si votre dépression ou votre anxiété s'aggrave, ou si vous présentez un comportement suicidaire, consultez immédiatement votre médecin.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans : ATHYMIL ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants de moins de 18 ans. Il est également important de noter que les enfants de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables, notamment des idées suicidaires et comportement hostile (comportement d'opposition et colère) lorsqu'ils prennent des médicaments. Néanmoins, il est possible que votre médecin prescrive ATHYMIL à des patients de moins de 18 ans. Si votre médecin a prescrit ATHYMIL, discutez avec lui de ce que vous désirez en discuter, adressez-vous à votre médecin si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient. La prise d'ATHYMIL par un patient de moins de 18 ans doit être surveillée de près pour assurer la sécurité à long terme concernant le développement cognitif et comportemental.

