

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 0 Réclamation | contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | adhession@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-497962

57444

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

3673

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Société :

HARADJ DRISS

Autre :

Nom & Prénom :

03.03.1960

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

0661 18 40 34

Total des frais engagés :

27/09/20

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. BENNIS Khalid
HEPATICO GASTRO-ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE & ANOLOGICO - CHIRURGICALE
Rés. Alali n° 4 Angle Bd Abdellah Ben
et Bd Anouar - Casablanca
Tel : 05 22 98 41 16

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CMA 28.09.2021

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

SAAD BENNIS Khalid

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le travail des Actes
20/11/2020	Consultation	12	200,00	INP : [REDACTED]
20/11/2020	Examen	12	400,00	600,00

DR BENNTIS Khalid
PROTHÉTOLOGIE GASTRO-ENTÉROLOGIQUE
PROTHÉSE MÉDIALE ANGLO-ARABE
Anouar 08/22 08/21 18

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE HAY BOUCHE Pharmacie Hay Bouche Dokhla - Casablanca Tél: 05 22 58 19 49	20/11/2020	250,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE SIDI MAAROUF Tél: 05 22 335 209 Tél: 05 22 335 209 Tél: 05 22 335 209	17/11/2020		1869,20

AUXILIAIRES MEDICAUX






Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [REDACTED]
				COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
				MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
				DEBUT D'EXECUTION [REDACTED]
				FIN D'EXECUTION [REDACTED]
O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412	21433562	COEFFICIENT DES TRAVAUX [REDACTED]
D	00000000	00000000	00000000	MONTANTS DES SOINS [REDACTED]
	35533411	11433553	B	DATE DU DEVIS [REDACTED]
				DATE DE L'EXECUTION [REDACTED]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echographie Abdominale - Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

الدكتور بنيس خالد

اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والبواسير

خريج كلية الطب بأنجيه وباريس

شهادة التشخيص بالمنظار الباطني (باريس)

شهادة التشخيص في أمراض وجراحة المخرج (باريس)

عضو الجمعية الفرنسية في أمراض المخرج والمصارين

عضو الجمعية الفرنسية في الكشف بالموجات فوق الصوتية

Casablanca, le 20/11/2020.

el Marjan

latif

صيدلانية حي بنشور
Pharmacie HAY BOUCHRA
Dr. N. ROUDEGGA
44, Lot 1 - El Mennem Bouchra
Sidi Maâaout - Casablanca
Tél: 05 22 66 19 49

41,80

Archantyl S.V

alu - o - 114

مس

73,50

Forlas S.V

al - 2 mli á 134

(vape
d'au)

99,00

Crabostim S.V

1 sachet, 500

20

35,70

Almaz S.V

1/2 á 1250

250,00

Dr BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE
Résidence "AL Mawlid 4" Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd. Anoual - Casablanca
Tél : 05 22 66 41 16

إقامة "المولد 4" - زاوية شارع عبد المورمن وشارع أنوال - الطابق الثاني شقة رقم "24" - الدار البيضاء - الهاتف : 05.22.98.41.16

Résidence "AL Mawlid 4" Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual 2e Etage "A 24" - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16

Macrogol 4000 forlax® 10g

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

10 g, poudre pour solution buvable en sachet

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de donner ce médicament à votre enfant.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que FORLAX ?
2. Quelles sont les informations à prendre pour prendre FORLAX ?
3. Comment prendre FORLAX ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FORLAX ?
6. Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Forlax appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques. Forlax permet d'augmenter la quantité d'eau dans les matières fécales, ce qui aide à résoudre les problèmes liés à un transit intestinal ralenti. Forlax n'est pas absorbé dans la circulation sanguine et n'est pas modifié dans l'organisme.

FORLAX est indiqué pour le traitement de la constipation chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans.

Ce médicament se présente sous forme d'une poudre qu'il faut dissoudre dans un verre d'eau (au minimum 50 ml) et boire. Son effet se manifeste généralement en 24 h à 48 h.

Le traitement de la constipation par un médicament doit être associé à des règles d'hygiène de vie et à une alimentation saine.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

Ne prenez jamais Forlax si :

- vous êtes allergique (hypersensible) au macrogol (polyéthylène glycol) ou à l'un des autres composants contenus dans le médicament qui sont listés à la rubrique 6 « Informations supplémentaires ».
- vous avez une maladie telle qu'une maladie sévère de l'intestin :
 - inflammation de l'intestin (telle que rectocolite hémorragique, maladie de Crohn's)
 - perforation de l'intestin ou risque de perforation de l'intestin
 - iléus ou suspicion d'obstruction de l'intestin.
 - Douleurs abdominales de cause indéterminée.

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes atteint par l'une des affections citées ci-dessus. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec Forlax :

De très rares cas de manifestations allergiques se manifestant par une éruption sur la peau et un gonflement du visage ont été rapportées chez l'adulte après la prise de médicaments contenant du Macrogol (polyéthylène Glycol).

Des cas isolés de manifestations allergiques ayant conduit à des pertes de connaissance ou malaise et sensations de malaise général ont été rapportées.

LOT : T05334
EXP : 02/2023

•

• où ce médicament peut quelque fois provoquer diarrhée, contactez votre médecin ou un pharmacien avant de prendre ce médicament si votre fonction rénale ou hépatique altérée ou - vous prenez des diurétiques (médicaments augmentant l'élimination urinaire) ou vous êtes âgé, car vous êtes susceptible d'avoir une diminution de vos taux sanguins de sodium (sel) et de potassium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Forlax peut être pris pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de FORLAX

Si votre médecin vous a informé que vous êtes intolérant à certains sucres (sorbitol), contactez votre médecin avant de prendre ce médicament. Ce médicament contient une faible quantité de sucre appelé sorbitol qui est transformé dans l'organisme en fructose.

De fait de la présence de dioxyde de soufre (ou anhydride sulfureux), ce médicament peut engendrer de rares cas de réactions d'hypersensibilité et de bronchospasme.

Forlax peut néanmoins être utilisé si vous êtes diabétique ou si vous devez suivre un régime exempt de lactose.

3 COMMENT PRENDRE FORLAX 10 g, poudre pour solution buvable en sachet ?

Lorsque vous prenez Forlax, respectez toujours les conseils de votre médecin ou ce qui est indiqué dans cette notice. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie

Adultes et enfants de plus de 8 ans

La dose habituelle est de 1 à 2 sachets par jour, de préférence en prise unique le matin.

La dose journalière peut être adaptée à l'effet obtenu et peut varier de 1 sachet tous les 2 jours (chez les enfants en particulier) à 2 sachets par jour au maximum.



PROBIOSTIM®

Association exclusive de 3 PROBIOTIQUES & 1 PRÉBIOTIQUE.

Les probiotiques et le prébiotique de PROBIOSTIM® sont sélectionnés spécifiquement pour participer à renforcer la barrière de protection contre les microbes et à équilibrer la microflore.

QUE FONT LES PROBIOTIQUES ?

Le terme "probiotique" vient de l'anglais "probiotic" qui, ingéré en quantité suffisante, favorise la santé de celui qui les consomme.

Selon l'OMS "un probiotique est un micro-organisme vivant qui, ingéré en quantité suffisante, favorise la santé de celui qui les consomme".

QUE FONT LES PRÉBIOTIQUES ?

Les prébiotiques sont des ingrédients nutritifs qui servent de carburant aux probiotiques : ils stimulent leur croissance et/ou leur activité.

COOPER PHARMA

PPC : 99,00 DH

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DE PROBIOSTIM® ?

PROBIOSTIM® est une formule symbiotique associant 3 souches de probiotiques qui sont déposées à « Collection Nationale de Cultures de Microorganismes » (CNCM) à l'Institut Pasteur (Paris, France):

- Lactobacillus helveticus Rosell®-52 (CNCM I-1722)
- Bifidobacterium infantis Rosell®-33 (CNCM I-3424)
- Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 (CNCM I-3426)

Elles ont été spécialement sélectionnées en raison de leur capacité à résister à l'acidité gastrique pour atteindre l'intestin sans être dégradées et agir spécifiquement.

Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 associé à Bifidobacterium infantis Rosell®-33 siège dans le colon et Lactobacillus helveticus Rosell®-52 siège dans l'intestin grêle. Cette distribution le long du GALT contribue à renforcer la barrière de protection contre les microbes et à équilibrer la microflore.

Le procédé de lyophilisation utilisé pour la conservation des probiotiques dans PROBIOSTIM® garantit leur survie jusqu'à leur utilisation. Une fois dans l'organisme, les probiotiques redeviennent actifs.

Le prébiotique (Fructo-Oligosaccharides (FOS)), présent dans PROBIOSTIM®, est l'alimentation idéale des probiotiques : il stimule leur croissance et/ou leur activité.

COMMENT CONSERVER PROBIOSTIM® ?

PROBIOSTIM® doit être conservé dans un endroit sec et frais à une température inférieure à 25°C dans l'emballage d'origine. À consommer de préférence avant la date limite d'utilisation optimale indiquée sur l'emballage.

Validité : 24 mois à compter de la date de fabrication.

DE QUOI EST COMPOSÉ PROBIOSTIM® ?

- Ingrédients actifs:

		Quantité par sachet
Probiotiques*	Lactobacillus helveticus Rosell®-52 * Bifidobacterium infantis Rosell®-33 * Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 *	3 milliards d'UFC ** par sachet
Prébiotique	Fructo-Oligosaccharides	750 mg

* Contient de la poudre de lait et/ou du soja

**Unité Formant Colonies

- Excipients :

	Quantité par sachet
Amidon de pomme de terre	570 mg*
Arôme vanille	75 mg**

* Quantité pouvant varier selon la quantité de poudre bactérienne additionnée afin d'obtenir la concentration garantie, sans modifier les proportions du total d'UFC par sachet.

** Ne contient pas de sulfites

ANALYSE NUTRITIONNELLE PAR SACHET : 5,85 Kcal

À QUI EST DESTINÉ PROBIOSTIM® ?

• PROBIOSTIM® est conseillé à l'enfant de plus de 12 mois et à l'adulte.

AVLOCARDYL®

PROPRANOLOL

40 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de vous avez d'autres questions, interroger votre pharmacien. • Ce médicament ne le donnez pas même si les vous ressentez médecin, ou indésirable. Voir rubrique 4.



1. QU'EST-CE QU'AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS AVLOCARDYL UTILISE ?

Ce médicament contient une substance active, le propranolol qui appartient à la famille des bêta-bloquants. Il agit en diminuant la tension artérielle, en réduisant les troubles du rythme cardiaque et en ralentissant le cœur.

Ce médicament est utilisé principalement : • pour traiter une tension artérielle élevée, • pour éviter des douleurs au niveau de la poitrine (crises douloureuses de l'angine de poitrine), • après une crise cardiaque (infarctus du myocarde), • pour des maladies du cœur et des vaisseaux causées par un taux élevé d'hormones thyroïdiennes dans le sang, • pour traiter certaines maladies du cœur et notamment certains troubles du rythme cardiaque, • pour éviter des migraines, • pour traiter certains types de tremblements, • pour éviter des palpitations liées par une situation stressante (tel que le trac), • pour éviter des saignements digestifs chez les personnes qui souffrent d'une maladie grave du foie (cirrhose).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le propranolol) ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la section 6. • Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encobrement des bronches et des poumons (bronchopneumopathie chronique obstructive). • Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque non contrôlée par un traitement. • Si vous avez eu un problème cardiaque grave (choc cardigénique). • Si votre tension artérielle élevée est causée par une maladie d'une glande située au-dessus du rein (phéochromocytome non traité). • Si vous souffrez d'une certaine forme d'angine de poitrine appelée angor de Prinzmetal (reconnaissable par des douleurs au niveau de la poitrine). • Si votre cœur bat trop lentement (moins de 45-50 battements par minute). • Si vous souffrez de troubles de la conduction : blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième

degrés, bloc sino-auriculaire. • Si vous avez des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud). • Si vous avez une maladie très grave du foie. • Si vous avez une tension artérielle basse. • Si vous avez une prédisposition à faire de l'hypoglycémie (taux de sucre trop bas dans le sang).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable.

Vous devez prévenir votre médecin : • Si vous avez un taux de sucre élevé dans le sang (diabète). • Si vous avez une maladie grave du foie et/ou du rein. • Si vous avez une maladie de la peau (psoriasis). • Si vous avez déjà eu des allergies. • Si vous avez une maladie de la circulation sanguine (telle que la maladie de Raynaud). • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. • Si vous avez des antécédents cardiaques.

Vous ne devez jamais arrêter brutalement votre traitement sans avoir demandé, au préalable, l'avis de votre médecin.

• Si vous devez subir une opération, vous devez prévenir votre anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Patients devant faire attention au risque d'hypoglycémie

Une hypoglycémie est un taux trop bas de sucre dans le sang. Ce médicament peut aggraver une hypoglycémie en particulier, chez les personnes souffrant de diabète et les personnes non diabétiques mais qui sont prédisposées à l'hypoglycémie (le nourrisson, l'enfant, la personne âgée, les personnes souffrant d'une maladie du foie, les personnes sous dialyse, les personnes qui ont fait un jeûne ou les personnes qui ont pris trop de comprimés).

Cette hypoglycémie peut conduire à des convulsions ou un coma.

Vous reconnaîtrez les signes annonciateurs d'une hypoglycémie par une faiblesse, des sueurs, une fringale, des tremblements, une somnolence, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré. Si l'un de ces signes survient, mangez ou buvez quelque chose de sucré et contactez votre médecin.

La substance active de ce médicament (le propranolol) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle antidopage.

Autres médicaments et AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

Sauf avis contraire de votre médecin, n'utilisez pas AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable avec certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium : bépridil, diltiazem, vérapamil et flingolmid). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, si certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence,

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echographie Abdominale - paris

Diplômé de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

Dr BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE
Rés Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd. Anoual - Casablanca
Tél. 05.22.98.41.16

Casablanca, le 20/11/2020.

El Marjani latif

- ✓ vit de 73 -
✓ Femmes
✓ cheur - Fe - Azang
✓ ASAT - ALAT - VGT
- NPS (mag) - T.M. vs.
- C.R.
- anci gbg - crabe

Résidence " AL Mawlid 4 " Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual
2eme Etage " A24 " - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16

Docteur BENNIS Khalid

Spécialiste en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplôme d'Echographie Abdominale - paris

Diplômé de Proctologie Médico-Chirurgicale - Paris (Saint Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

El Mawlid
Casablanca, le 20/11/2020

Facture

= 400 Dhs

Echo abdominal
Ch 20/11/2020

Dr. BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO - ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO - CHIRURGICALE
Rés. Mawlid - Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd. Anoual - Casablanca
Tél 05 22 98 41 16

Résidence " AL Mawlid 4 " Angle Bd. Abdelmoumen et Bd. Anoual
2eme Etage " A24 " - CASABLANCA - Tél. : 05.22.98.41.16

Le : _____

ORDONNANCE

Léridys

1 - 0 - 1 - 23

Arums

Dr BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE
Rés Mawlid 4 Angle Bd. Abdelmoumen
et Bd. Anoual - Casablanca
Tél 05 22 55 41 16

Dr. BENNIS Khalid
HEPATOGASTROENTEROLOGIC
PROCTOLOGIC MEDICO - CHIRURGICALE
Res. Mawridi 4 Anqah Bd. Abdelmoumen
Tel. 06 22 98 41 16
et Bd. Anqah - Casablanca

Officer 200 10: A - 0 - A

Handout

ORDONNANCE

30/11/2022

Dr. BENNIS Khalid
HEPATOGASTROENTEROLOGIC
PROCTOLOGIC MEDICO - CHIRURGICALE
Res. Mawridi 4 Anqah Bd. Abdelmoumen
Tel. 06 22 98 41 16
et Bd. Anqah - Casablanca

Laboratoire d'Analyses Médicales

Sidi Maarouf

Facture

Casablanca, le 27/11/2020

Dossier N°: 251120-048 du: 25/11/2020

Patient :Mme EL MARJANI Latifa

Analyse	Valeur en B	Montant
HEMOGRAMME : NFS + PLQ	80	107,20
VITESSE DE SEDIMENTATION	30	40,20
TAUX DE PROTHROMBINE	40	53,60
CRP : PROTEINE-C REACTIVE	100	134,00
GLYCEMIE A JEUN	30	40,20
UREE	30	40,20
CREATININE	30	40,20
ACIDE URIQUE	30	40,20
CHOLESTEROL TOTAL	30	40,20
TRIGLYCERIDES	50	67,00
CALCIUM	30	40,20
SGOT/ASAT aspartate aminotransférase	50	67,00
SGPT/ALAT alanine-aminotransférase :	50	67,00
PHOSPHATASES ALCALINES	50	67,00
GGT (Gamma glutamyl transférase)	50	67,00
FERRITINE	250	335,00
VITAMINE D-25-Hydroxy-vitD (25 OH D2+D3)	450	603,00
Prélèvement sang veineux	1	20,00
	Total :	1 869,20

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
ICE. N°: 001681692000016
IF. N°: 40606866 - TP. N°: 36159885
CNSS. N°: 986124 - RC. N°: 410236

LABORATOIRE SIDI MAAROUF
Tél.: 0522335211
IF: 40606866 - TP: 36159885
CNSS: 986124 - RC: 410236

DOCTEUR BENNIS KHALID

SPECIALISTE en Hépato-Gastroentérologie

Proctologie Médicale et Chirurgicale

Diplômé de la Faculté de Médecine d'ANGERS et de PARIS

Diplômé d'Échographie Abdominale Paris

Diplôme de Proctologie Médico-Chirurgicale Paris (St Louis)

Membre de la Société Française de Colo-Proctologie

Membre de la Société Française d'Endoscopie Digestive

ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

20/11/2020

EL MARJANI Latifa

Clinique

BALLONNEMENT ABDOMINAL SUR CONSTIPATION CHRONIQUE ET DYSPEPSIE POST-PRANDIALE.

Examen

Foie de taille normale (FH= 11 cm), d'échostructure homogène et de contours réguliers.

Au niveau du segment 7 du foie; image hyperéchogène de 30 mm; absence de dilatation des VBIH.

TP de calibre normal (8 mm). VBP fine (4 mm).

Vésicule biliaire alithiasique, à paroi fine.

Pancréas normal et homogène dans son ensemble.

Absence d'adénopathies profondes. Aspect moucheté du cadre colique.

Rate homogène, de taille normale (grand axe de 8 cm).

Reins de taille et d'échostructure normales avec bonne différenciation corticosinusale, sans dilatation des cavités pyélocalicielles. Vessie et utérus normaux.

Conclusion

ANGIOME DU SEGMENT 7 DU FOIE STABLE (30 mm).
ENCOMBREMENT STERCORAL COLIQUE DIFFUS.

DR BENNIS Khalid
HEPATO GASTRO ENTEROLOGIE
PROCTOLOGIE MEDICO CHIRURGICALE
Rés Mawlid 4 Angle Bd Abdelmoumen
et Bd Anoual - Casabla ca
Tél 05 22 98 41 16