

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M20- 0004433

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☒ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 02015 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : EL OIRDI EL MOSTAFA
Date de naissance : 01.01.1952
Adresse : Derb Nejma Bloc 429 n° 20 Hay Hassan
Tél. : 06 61 26 40 76 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation :
Nom et prénom du malade :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :
Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/01/2021		29	16.29	DR. M. GUNNOUNI MEDECIN SEMU

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE NEJIM INPE: 092045145	11/01/2021	16.29,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> H 25533412 00000000 </div> <div> G 21433552 00000000 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> D 00000000 35533411 </div> <div> B 00000000 11433553 </div> </div>			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



SEMUR

أطباء المستعجلات

MEDECINS D'URGENCE

M^{rs} El Mostafa El andi

11/01/2021

208.10 x 3

1)

Coveron 5 mg/5g
14 b mot

75

213.00 x 2

2)

Umo x 5 mg
14 b mot

75

121.40 x 2

3)

Megaflex 500mg x 2
14 x 2/7

75

92.50 x 2

4)

58.40

Solupred 20g
34 b mot

75

PHARMACIE NEJMA
Derb Nejma Bloc 415 N°902
Hay Hassani - Casablanca
Tél: 05 22 89 54 35

215.00

5)

Ro ciph 400g
14 b mot

75

PHARMACIE NEJMA
INPE: 092045145

1629,80

SEMUR
Service Médical d'Urgence
Angle Rue d'Azemmour et Bd Sidi Abderahmane
Hay Hassani Casablanca - Tél: 05 22 90 50 50
DR. M. GUNNOUNI
MEDECIN SEMUR

مستعجلة بالمنزل و النقل الطبي 24/24 ساعة

Consultation à domicile & transports médicalisés - 24H/24

Angle Route Azemmour et Boulevard Sidi Abderahmane - Hay Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.50.50 (L.G.) / 05.22.91.33.33 - GSM : 06.61.14.04.01

Lot :
Exp :
PPV :
92,50

Lot :
Exp :
PPV :
92,50

IES LIMITED
a Sahib,
radesh, Ind
PPV:215DH00
CODE No.: HP/DRUGS/MNB/95

208,00

208,00

208,00

58,40
Solupred 20mg

أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ

كلورهيدرات طمسولوزين

أو الصيدلي
في حالة ظهور نفس الأعراض لأن هذا قد يكون ضارا.
النشرة: أو في حال أصبحت بعض التأثيرات الجانبية خطيرة.

يجب قراءة النشرة كاملة ويتمتع قبل استعمال هذا الدواء.
احتفظوا بهذه النشرة قد تحتاجون إلى إعادة قراءتها.
إذا كان لديكم أسئلة أو شك اطلبوا
هذا الدواء من الصيدلي أو من
يجب إيد

LOT 191319
EXP 04/2021
PPV 213.00DH

حجم: الحفيد للبروستات.

الدواء:

التركيبية
المادة الفع
كلورهيدرات
سواغ: كم
الشكل و
حبيبات ذات
ما هي حالا
فوائدها
يستعمل ها

ما هي حا

لا تستعمل أبدا أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ في الحالات التالية:
- الحساسية للعروقة لهذا الدواء أو الأدوية من نفس الفئة العلاجية.
- ودمة سابقة (انتفاخ الوجه، الشفاه والأغشية المخاطية) بعد أخذ هذا الدواء.
- المصابين بانخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض الضغط عند اللور من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف مصاحبة بدوار وتوعك).
- القصور الكبدى الشديد.
عموما لا ينصح بالجمع بين هذا الدواء والأدوية الخافضة لضغط الدم من نفس الفئة: ألفا - مانعة، وعند المرضى الذين يعانون من إغماء النبول.

تنبيهات خاصة واحتياطات الاستعمال:
يجب أخذ الحذر مع أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ.

تنبيهات خاصة:

إذا كنت تشعر بأي توعك، والدوخة، والتعب أو التعرق (بسبب انخفاض الضغط الدموي خلال تغيير الوضعية): في هذه الحالة يجب الاستلقاء كي تخفئ.
هذه الأعراض بسرعة.
في أعراض تورم في الوجه والشفاه والأغشية المخاطية قد تكون علامة على رد فعل حساسية الأدوية التي تتطلب توقف العلاج -
يجب عليك إبلاغ الطبيب فوراً عن ذلك.
إذا كنت ستجري قريبا عملية جراحية من أجل مرض الحلاية يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت استعملت أو تستعمل حاليا أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ. يجب عليك أحد الاحتياطات المناسبة مع تناولك للعلاج في وقت العملية الجراحية. في حالة جراحة الحلاية يجب أن تسأل طبيبك هل يجب عليك تجنب أو إيقاف العلاج مؤقتا.

احتياطات الاستعمال:

يجب توخي الحذر عند الأشخاص المعالجين بالأدوية الخافضة للضغط الدموي مرض القصور الكلوي المزمن، والمرضى المسنين فوق 65 سنة والمصابين بأعراض الشرايين التاجية.
نمط الحياة: يجب الامتنال لنمط حياة معين خلال مدة العلاج خاصة: الحفاظ على النشاط البدني، إتباع نمط غذائي (تجنب الوجبات الغنية، الحارة جدا والكثيرة الكحول). لا يجب الشرب كثيرا في المساء يجب تجنب الإسهال والقيء.
فائضة السوائل ذات آثار معروفة:
لا ينصح بأخذ هذا الدواء عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز، سوء امتصاص الكلكتوز والكلكتوز أو نقص في سكرزاز إيزومالتاز (أمراض وراثية نادرة).

التفاعلات الدوائية:

أخذ أو استعمال أدوية أخرى:

قصد تفادي التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية وخاصة إذا كنت قد خضعت للعلاج بخفض لارتفاع ضغط الدم ألفا - مانعة، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر جاري.

الحمل والرضاعة:

دواعي استعمال هذا الدواء لا تخص المرأة.
تأثيرات هذا الدواء أثناء الحمل ومبروره إلى حليب الأم غير معروفة يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

المساقون ومستعملي الآلات:

يجب على المساقين ومستعملي الآلات اتخاذ الحذر نظرا لخطر انخفاض ضغط الدم الانتصابي (مع الإحساس بالدوار أو الإغماء). خصوصا أثناء بداية العلاج.

التأثيرات الغير مرغوب فيها:

كباقي الأدوية، يمكن لأوماكس® ت.م. 0,4 ملغ أن يسبب بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها دون أن يكون الجميع عرضة لها:
غاليا (أقل من واحد بالعشرة أو أكثر من واحد بالمائة): دوران وخاصة عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.
استثنائيا (أقل من واحد بالمائة وأكثر من واحد بالألف): صداع الرأس، خفقان (دقات القلب أسرع من المعتاد والملاحظ)، انخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض الضغط عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى وضعية الوقوف)، انسداد وسيلان الأنف (التهاب مخاطية الأنف)، إسهال، غثيان، في.

أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ

كلورهيدرات طمسولوزين

أو الصيدلي
في حالة ظهور نفس الأعراض لأن هذا قد يكون ضارا.
النشرة: أو في حال أصبحت بعض التأثيرات الجانبية خطيرة.

يجب قراءة النشرة كاملة ويتمتع قبل استعمال هذا الدواء.
احتفظوا بهذه النشرة قد تحتاجون إلى إعادة قراءتها.
إذا كان لديكم أسئلة أو شك اطلبوا من الصيدلي.
هذا الدواء من شأنه أن يسهل عليكم الحياة.
يجب إيد

LOT 191319
EXP 04/2021
PPV 213.00DH

حجم الحفيد للبروستات.

الدواء:

التركيبية
المادة الفعالة
كلورهيدرات
سواغ: كم
الشكل والشكل
حبيبات ذات
ما هي حاله
فوائدها
يستعمل هذا

ما هي حاله

لا تستعمل أبدا أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ في الحالات التالية:
- الحساسية للعروقة لهذا الدواء أو الأدوية من نفس الفئة العلاجية.
- وطفة سابقة (انتفاخ الوجه، الشفاه والأغشية المخاطية) بعد أخذ هذا الدواء.
- المصابين بانخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض الضغط عند اللور من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف مصاحبة بدوار وتوعك).
- القصور الكبدى الشديد.
عموما لا ينصح بالجمع بين هذا الدواء والأدوية المخفضة لضغط الدم من نفس الفئة: ألفا - مانعة، وعند المرضى الذين يعانون من إغماء النبول.

تنبيهات خاصة واحتياطات الاستعمال:
يجب أخذ الحذر مع أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ.

تنبيهات خاصة:

إذا كنت تشعر بأي توعك، والدوخة، والتعب أو التعرق (بسبب انخفاض الضغط الدموي خلال تغيير الوضعية): في هذه الحالة يجب الاستلقاء كي تختفي هذه الأعراض بسرعة.
في أعراض شبيهة في الوجه والشفاه والأغشية المخاطية قد تكون علامة على رد فعل حساسية الأدوية التي تتطلب توقف العلاج -
يجب عليك إبلاغ الطبيب فوراً عن ذلك.
إذا كنت ستجري قريبا عملية جراحية من أجل مرض الحالبية يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت استعملت أو تستعمل حاليا أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ. يجب عليك أخذ الاحتياطات المناسبة مع تناولك للعلاج في وقت العملية الجراحية. في حالة جراحة الحالبية يجب أن تسأل طبيبك هل يجب عليك تجنب أو إيقاف العلاج مؤقتا.

احتياطات الاستعمال:

يجب توخي الحذر عند الأشخاص المعالجين بالأدوية الخافضة للضغط الدموي مرض القصور الكلوي المزمن، والمرضى المسنين فوق 65 سنة والمصابين بأعراض الشرايين التاجية.
نمط الحياة: يجب الامتناع لنمط حياة معين خلال مدة العلاج خاصة: الحفاظ على النشاط البدني، اتباع نمط غذائي (تجنب الوجبات الغنية، الحارة جدا والكثيرة الكحول). لا يجب الشرب كثيرا في المساء يجب تجنب الإسهال والقيء.
فائض السوائل ذات آثار معروفة:
لا ينصح بأخذ هذا الدواء عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز، سوء امتصاص الكلكتوز والكلكتوز أو نقص في سكرزاز إيزومالتاز (أمراض وراثية نادرة).

التفاعلات الدوائية:

أخذ أو استعمال أدوية أخرى:

قصد تفادي التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية وخاصة إذا كنت قد خضعت للعلاج بخفض لارتفاع ضغط الدم ألفا - مانعة، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر جاري.

الحمل والرضاعة:

دواعي استعمال هذا الدواء لا تخص المرأة.
تأثيرات هذا الدواء أثناء الحمل ومبروره إلى حليب الأم غير معروفة يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

المساقون ومستعملي الآلات:

يجب على المساقين ومستعملي الآلات اتخاذ الحذر نظرا لخطر انخفاض ضغط الدم الانتصابي (مع الإحساس بالدوار أو الإغماء). خصوصا أثناء بداية العلاج.

التأثيرات الغير مرغوب فيها:

كباقي الأدوية، يمكن لأوماكس® ت.م. 0,4 ملغ أن يسبب بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها دون أن يكون الجميع عرضة لها:
غالباً (أقل من واحد بالعشرة أو أكثر من واحد بالمائة): دوران وخاصة عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.
استثنائياً (أقل من واحد بالمائة وأكثر من واحد بالألف): صداع الرأس، خفقان (دقات القلب أسرع من المعتاد والملاحظ)، انخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض الضغط عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى وضعية الوقوف)، انسداد وسيلان الأنف (التهاب مخاطية الأنف)، إسهال، غثيان، في.

أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ

كلورهيدرات طمسولوزين

أو الصيدلي
في حالة ظهور نفس الأعراض لأن هذا قد يكون ضارا.
النشرة: أو في حال أصبحت بعض التأثيرات الجانبية خطيرة.

يجب قراءة النشرة كاملة ويتمتع قبل استعمال هذا الدواء.
احتفظوا بهذه النشرة قد تحتاجون إلى إعادة قراءتها.
إذا كان لديكم أسئلة أو شك اطلبوا من الصيدلي.
هذا الدواء من شأنه أن يسهل عليكم الحياة.
يجب إيد

LOT 191319
EXP 04/2021
PPV 213.00DH

حجم الحفيد للبروستات.

الدواء:

التركيبية
المادة الفعالة
كلورهيدرات
سواغ: كم
الشكل والشكل
حبيبات ذات
ما هي حاله
فوائدها
استعملها

ما هي حاله

لا تستعمل أبدا أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ في الحالات التالية:
- الحساسية للعروقة لهذا الدواء أو الأدوية من نفس الفئة العلاجية.
- ورمه سابق (انتفاخ الوجه، الشفاه والأغشية المخاطية) بعد أخذ هذا الدواء.
- المصابين بانخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض الضغط عند اللور من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف مصاحبة بدوار وتوعك).
- القصور الكبدى الشديد.
عموما لا ينصح بالجمع بين هذا الدواء والأدوية المخفضة لضغط الدم من نفس الفئة. ألفا - مانعة. وعند المرضى الذين يعانون من إغماء النبول.

تنبيهات خاصة واحتياطات الاستعمال:
يجب أخذ الحذر مع أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ.

تنبيهات خاصة:

إذا كنت تشعر بأي توعك، والدوخة، والتعب أو التعرق (بسبب انخفاض الضغط الدموي خلال تغيير الوضعية): في هذه الحالة يجب الاستلقاء كي تخفئ.
هذه الأعراض بسرعة.
في أعراض تورم في الوجه والشفاه والأغشية المخاطية قد تكون علامة على رد فعل حساسية الأدوية التي تتطلب توقف العلاج.
يجب عليك إبلاغ الطبيب فوراً عن ذلك.
إذا كنت ستجري قريبا عملية جراحية من أجل مرض الحثالة يتوجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت استعملت أو تستعمل حاليا أوماكس® ت.م. 0,4 ملغ. يجب عليك أحد الاحتياطات المناسبة مع تناولك للعلاج في وقت العملية الجراحية. في حالة جراحة الحثالة يجب أن تسأل طبيبك هل يجب عليك تجنب أو إيقاف العلاج مؤقتا.

احتياطات الاستعمال:

يجب توخي الحذر عند الأشخاص المعالجين بالأدوية الخافضة للضغط الدموي. مرض القصور الكلوي المزمن. والمرضى المسنين فوق 65 سنة والمصابين بأعراض الشرايين التاجية.
نمط الحياة: يجب الامتناع لنمط حياة معين خلال مدة العلاج خاصة: الحفاظ على النشاط البدني، اتباع نمط غذائي (تجنب الوجبات الغنية. الحارة جدا والكثيرة الكحول). لا يجب الشرب كثيرا في المساء يجب تجنب الإسهال والقيء.
فائده السواغات ذات آثار معروفة:
السكروز.
لا ينصح بأخذ هذا الدواء عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز. سوء امتصاص الكلكتوز والكلكتوز أو نقص في سكراراز (إبرومالتاز) (أمراض وراثية نادرة).

التفاعلات الدوائية:

أخذ أو استعمال أدوية أخرى:

قصد تفادي التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية وخاصة إذا كنت قد خضعت للعلاج بخفض لارتفاع ضغط الدم ألفا - مانعة. يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر جاري.

الحمل والرضاعة:

دواعي استعمال هذا الدواء لا تخص المرأة.
تأثيرات هذا الدواء أثناء الحمل ومبروره إلى حليب الأم غير معروفة يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء.

المساقون ومستعملي الآلات:

يجب على المساقين ومستعملي الآلات اتخاذ الحذر نظرا لخطر انخفاض ضغط الدم الانتصابي (مع الإحساس بالدوار أو الإغماء). خصوصا أثناء بداية العلاج.

التأثيرات الغير مرغوب فيها:

كباقي الأدوية. يمكن لأوماكس® ت.م. 0,4 ملغ أن يسبب بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها دون أن يكون الجميع عرضة لها:
غاليا (أقل من واحد بالعشرة أو أكثر من واحد بالمائة). دوران وخاصة عند الانتقال من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الوقوف.
استنتانيا (أقل من واحد بالمائة وأكثر من واحد بالألف): صداع الرأس خفان (نفاذ القلب أسرع من المعتاد والملاحظ). انخفاض ضغط الدم الانتصابي (انخفاض الضغط عند الانتقال من وضعية الجلوس أو الاستلقاء إلى وضعية الوقوف). انسداد وسيلان الأنف (التهاب مخاطية الأنف). إسهال. غثيان. في.