

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° W19-541571

☒ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2408 Société : 57939

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : BOUABDELLAH Chirifa

Date de naissance : 03/09/49

Adresse : 26, rue che Jhaoune - Oujda

Tél : 0666 120549 Total des frais engagés : 374,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr MERZOUK Mohammed, Professeur Agrégé, Gastro Entérologie, Résidence Farah - Oujda

Date de consultation : 10/09/20

Nom et prénom du malade : BOUABDELLAH Chirifa Age : 71 an

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection digestive

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Oujda Le : 10 / 09 / 2020

Signature de l'adhérent(e) : Chirifa

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/19/20	C	C3	200 84	INP : 0824193434

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	12/05/20	2745

ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F. PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H			
25533412	21433552		
00000000	00000000		
D		G	
00000000	00000000		
35533411	11433553		
	B		

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur Mohammed MERZOUK

Médecin Spécialiste en
Gastro-Entérologie

Diplômé d'Echographie de Paris
Endoscopie Digestive
Chirurgie Anale



الأستاذ محمد مرزوق

طبيب اختصاصي في أمراض
الجهاز الهضمي

حاصل على دبلوم الفحص بالصدى من باريس
التنظير الداخلي للجهاز الهضمي
جراحة البواسير

وجدة، في 10 / 9 / 20 Oujda, Le

Dr. BOUABDELLAH Chirfa



Agaz (AS) 31 x 1 gelule

Alperide (AS) 3 x 1 cp / le soir

2745

Dr MERZOUK Mohammed
Professeur Agrégé
Gastro-Entérologue
Résidence Farah - Oujda

Signature

cas la
ske
des
tuez
tre
un
tion
mise

021000 0323
PPV 59DH50
59,50

15 ans.
L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans.
Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que l'insomnie, les nausées, les vomissements mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.
En CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le sinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le talopram, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

Certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, urgence, pergolide, piribédil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, lévodopa).

Certains médicaments pouvant entraîner des troubles graves du rythme cardiaque (torsades de pointes) tels que :

Des médicaments utilisés pour traiter un rythme cardiaque irrégulier (les antiarythmiques de classe I tels que quinidine, hydroquinidine, monodaron, disopyramide et les antiarythmiques de classe III tels que sotalol, dronedarone, sotalol, dofétilide et ibutilide).

Certains médicaments contre les troubles psychiatriques (chlorpromazine, cyamémazine, dropridol, flupenthixol, fluphénazine, loperidol, lévomépromazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, artidole, sulpiride, sultopride, tiapride, zuclopenthixol).

Certains antiparasitaires (halofantrine, luméfántrine, pentamidine).
Un médicament utilisé pour lutter contre la dépendance à certaines drogues (la méthadone).

Et d'autres médicaments tels que : arsénieux, bépripil, cisapride, phémanil, dolasetron IV, érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV, impéridone, lévofloxacine, méquitazine, vandetanib, moxifloxacine, tétracycline IV, toféramine).

Des médicaments contenant de l'alcool.

Vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons
Aliments et boissons

Comme avec tous les médicaments psychotiques de cette famille, vous devez éviter la prise de boissons alcoolisées pendant votre traitement.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

GROSSESSE :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez immédiatement

votre médecin car lui seul peut décider s'il est nécessaire de poursuivre ce traitement.

Si vous avez pris ALPERIDE pendant les 3 derniers mois de votre grossesse, les symptômes suivants peuvent survenir chez votre bébé : tremblement, rigidité musculaire et/ou faiblesse musculaire, somnolence, agitation, problèmes respiratoires, problèmes d'alimentation.
Si votre bébé souffre d'un de ces symptômes, contactez rapidement votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Si vous prenez ce médicament, vous ne devez pas allaiter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

EFFETS SUR LA CAPACITE DE CONDUIRE DES VEHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Ce médicament peut provoquer une somnolence. Vous devez être vigilant si vous conduisez ou si vous utilisez une machine.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de ALPERIDE®, comprimé sécable, que vous n'auriez dû :

Vous pourriez ressentir une somnolence, une sédation (effet apaisant), une baisse de la pression artérielle, des symptômes extrapyramidaux (notamment des tremblements, une rigidité musculaire) ou vous pourriez tomber dans le coma.

Si une de ces situations se produit, vous ou votre entourage devez impérativement appeler un médecin ou les urgences médicales.

INFORMEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE.

Si vous oubliez de prendre ALPERIDE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre. Si vous avez oublié plusieurs doses, demandez l'avis de votre médecin.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE :

Sans Objet.

Liste I

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

NOM ET ADRESSE DE L'EPI TITULAIRE DE L'AMM AU MAROC :

A. POLYMÉDIC

Quartier Arsalane

Rue Amyot d'Inville

B.P. 10877

Casablanca (MAROC)

Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable

N° d'AMM :

ALPERIDE 50mg: 238/14 DMP/21/NNP

ALPERIDE 100mg: 237/14 DMP/21/NNP


ALPERIDE 200 mg: 313/16DMP/21/NRQr

ALPERIDE 400 mg: 476/16DMP/21/NNP

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE

JUIN 2017

Fabriqué par

 **POLYMÉDIC**

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane

Casablanca - Maroc

Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable.

cas la
ske
des
tuez
tre
un
tion
mise

021000 0323
PPV 59DH50
59,50

15 ans.
L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans.
Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que l'insomnie, les nausées, les vomissements mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.
En CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le sinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le talopram, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

Certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, urgence, pergolide, piribédil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, lévodopa).

Certains médicaments pouvant entraîner des troubles graves du rythme cardiaque (torsades de pointes) tels que :

Des médicaments utilisés pour traiter un rythme cardiaque irrégulier (les antiarythmiques de classe I tels que quinidine, hydroquinidine, monodaron, disopyramide et les antiarythmiques de classe III tels que sotalol, dronedarone, sotalol, dofétilide et ibutilide).

Certains médicaments contre les troubles psychiatriques (chlorpromazine, cyamémazine, dropridol, flupenthixol, fluphéazine, alopridol, lévomépromazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, artidole, sulpiride, sultopride, tiapride, zuclopenthixol).

Certains antiparasitaires (halofantrine, luméfantine, pentamidine).
Un médicament utilisé pour lutter contre la dépendance à certaines drogues (la méthadone).

Et d'autres médicaments tels que : arsénieux, bépripil, cisapride, phémanil, dolasetron IV, érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV, impéridone, lévofloxacine, méquitazine, vandetanib, moxifloxacine, tétracycline IV, toremifène).

Des médicaments contenant de l'alcool.

Vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons

Comme avec tous les médicaments psychotiques de cette famille, vous devez éviter la prise de boissons alcoolisées pendant votre traitement.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez immédiatement

votre médecin car lui seul peut décider s'il est nécessaire de poursuivre ce traitement.

Si vous avez pris ALPERIDE pendant les 3 derniers mois de votre grossesse, les symptômes suivants peuvent survenir chez votre bébé : tremblement, rigidité musculaire et/ou faiblesse musculaire, somnolence, agitation, problèmes respiratoires, problèmes d'alimentation.
Si votre bébé souffre d'un de ces symptômes, contactez rapidement votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Si vous prenez ce médicament, vous ne devez pas allaiter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

EFFETS SUR LA CAPACITE DE CONDUIRE DES VEHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Ce médicament peut provoquer une somnolence. Vous devez être vigilant si vous conduisez ou si vous utilisez une machine.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de ALPERIDE®, comprimé sécable, que vous n'auriez dû :

Vous pourriez ressentir une somnolence, une sédation (effet apaisant), une baisse de la pression artérielle, des symptômes extrapyramidaux (notamment des tremblements, une rigidité musculaire) ou vous pourriez tomber dans le coma.

Si une de ces situations se produit, vous ou votre entourage devez impérativement appeler un médecin ou les urgences médicales.

INFORMEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE.

Si vous oubliez de prendre ALPERIDE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre. Si vous avez oublié plusieurs doses, demander l'avis de votre médecin.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE :

Sans Objet.

Liste I

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

NOM ET ADRESSE DE L'EPI TITULAIRE DE L'AMM AU MAROC :

P. POLYMÉDIC

Quartier Arsalane

Rue Amyot d'Inville

B.P. 10877

Casablanca (MAROC)

Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable

N° d'AMM :

ALPERIDE 50mg: 238/14 DMP/21/NNP

ALPERIDE 100mg: 237/14 DMP/21/NNP

ALPERIDE 200 mg: 313/16DMP/21/NRQr

ALPERIDE 400 mg: 476/16DMP/21/NNP

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE

JUIN 2017

Fabriqué par

 **POLYMÉDIC**

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane

Casablanca - Maroc

Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable.

cas la
ske
des
tuez
tre
un
tion
mise

021000 0323
PPV 59DH50
59,50

15 ans.
L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée entre 15 et 18 ans.
Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels que l'insomnie, les nausées, les vomissements mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.
En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le sinagolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le talopram, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

Certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, urgence, pergolide, piribédil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, lévodopa).

Certains médicaments pouvant entraîner des troubles graves du rythme cardiaque (torsades de pointes) tels que :

Des médicaments utilisés pour traiter un rythme cardiaque irrégulier (les antiarythmiques de classe I tels que quinidine, hydroquinidine, sotalol, disopyramide et les antiarythmiques de classe III tels que amiodarone, dronedarone, sotalol, dofétilide et ibutilide).

Certains médicaments contre les troubles psychiatriques (chlorpromazine, cyamémazine, dropridol, flupenthixol, fluphénazine, loperidol, lévomépromazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, artidole, sulpiride, sultopride, tiapride, zuclophenthixol).

Certains antiparasitaires (halofantrine, luméfantine, pentamidine).
Un médicament utilisé pour lutter contre la dépendance à certaines drogues (la méthadone).

Et d'autres médicaments tels que : arsénieux, buprénorphine, cisapride, phémanil, dolasetron IV, érythromycine IV, mizolastine, vincamine IV, ampicillone, lévofloxacine, méquitazine, vandetanib, moxifloxacine, érythromycine IV, toremifène).

Des médicaments contenant de l'alcool.

Vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons
Aliments et boissons

Comme avec tous les médicaments psychotiques de cette famille, vous devez éviter la prise de boissons alcoolisées pendant votre traitement.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

GROSSESSE :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez immédiatement

votre médecin car lui seul peut décider s'il est nécessaire de poursuivre ce traitement.

Si vous avez pris ALPERIDE pendant les 3 derniers mois de votre grossesse, les symptômes suivants peuvent survenir chez votre bébé : tremblement, rigidité musculaire et/ou faiblesse musculaire, somnolence, agitation, problèmes respiratoires, problèmes d'alimentation.
Si votre bébé souffre d'un de ces symptômes, contactez rapidement votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Si vous prenez ce médicament, vous ne devez pas allaiter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

EFFETS SUR LA CAPACITE DE CONDUIRE DES VEHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Ce médicament peut provoquer une somnolence. Vous devez être vigilant si vous conduisez ou si vous utilisez une machine.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de ALPERIDE®, comprimé sécable, que vous n'auriez dû :

Vous pourriez ressentir une somnolence, une sédation (effet apaisant), une baisse de la pression artérielle, des symptômes extrapyramidaux (notamment des tremblements, une rigidité musculaire) ou vous pourriez tomber dans le coma.

Si une de ces situations se produit, vous ou votre entourage devez impérativement appeler un médecin ou les urgences médicales.

INFORMEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE.

Si vous oubliez de prendre ALPERIDE® :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre. Si vous avez oublié plusieurs doses, demander l'avis de votre médecin.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE :

Sans Objet.

Liste I

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

NOM ET ADRESSE DE L'EPI TITULAIRE DE L'AMM AU MAROC :

A. POLYMÉDIC

Quartier Arsalane

Rue Amyot d'Inville

B.P. 10877

Casablanca (MAROC)

Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable

N° d'AMM :

ALPERIDE 50mg: 238/14 DMP/21/NNP

ALPERIDE 100mg: 237/14 DMP/21/NNP


ALPERIDE 200 mg: 313/16DMP/21/NRQr

ALPERIDE 400 mg: 476/16DMP/21/NNP

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE

JUIN 2017

Fabriqué par

 **POLYMÉDIC**

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane

Casablanca - Maroc

Dr. M. HOUBACHI - Pharmacien Responsable.