

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Déclaration de Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

AS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Déclaration de Maladie : N° P19- 0017799

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1840

Société : Royal air maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : LAKNINE MUSTAPHA Date de naissance :

Adresse : Rue E 65 N 72 G Roulifa

Tél. : 06 26 33 83 92

Total des frais engagés : 755.8 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 12/24/2021

Nom et prénom du malade : LAKNINE MUSTAPHA Age : 41

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Depression

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : maladie

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 4/2/2021

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12/11/12	C		300	Rue Soumaya Prés des Taxis de Casablanca Tél : 05 22 22 57 40

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE SELMA HASSOUNI 756, Boulevard Oued Sebou Tél : 05 22 90 50 06 - Casablanca	12/11/12	455,8

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of upper and				

DOCTEUR ALI RIMANI

Psychiatre

Ex. Psychiatre à
l'Hôpital de Berrechid
et Lhank

الدكتور رمانى على

طبيب أخصائى في الأمراض
النفسية والعقلية

طبيب سابق بمستشفى
برشيد و العنق

Casab.

PHARMACIE SALAHEDDINE
Mme SELMA HASSOUNH
756, Boulevard Oued Sebou
Tél : 05 22 90 50 06 Casablanca

وصفة
Ordonnance

16740

X2

1) Ibylopius



1380

2)

1 - 0
Heldin
100 mg



Mo 30

X2

3) Xanax 10 mg



1330

+2

4/2 -



DOCTEUR RIMANI Ali
Psychiatre
Rue Soumaya Rés. Soumaya 1er Etage N°3
près des Taxi de Bouskoura - Casablanca
Tél. 05 22 22 57 40

لصق
du
docteur du
Medecin

RDV

12/2/2024

الموعد

زنقة سمية إقامة سمية الطابق 1 رقم 3 (قرب طاكيسيات بوسكورة) - البيضاء، الهاتف: 05 22 22 57 40 / 06 74 79 89 57

Rue Soumia Résidence Soumia 1er étage N°3 (près des Taxi de Bouskoura) - Casa - Tél.: 05 22 22 57 40 / 06 74 79 89 57

40,30

CILAC LOT: 20E030
PER: 07/23 PPV: 13DH80

073020 0722
PPV 167DH40

167,40

073020 0722
PPV 167DH40

167,40

Xanax 0.5 mg®

Comprimé sécable - Boîte de 30
(DCI : Alprazolam)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- trouble de l'attention,
 - sommeil excessif,
 - tremblement,
 - vision trouble,
 - nausée,
 - inflammation de la peau (dermatite),
 - dysfonction sexuelle,
 - prise ou perte de poids.
- Peu fréquents (peuvent affecter 1 à 10 personnes)
- hallucination,
 - colère.

1. Composition du médicament

Principe Actif :

Alprazolam.

Excipients :

Lactose, Microcristalline cellulose, Docusate de sodium, Benzoate de sodium anhydre (Aerosil 200), Stéarate de magnésium, Amidon de maïs, Erythrose.

Liste des excipients à effet notable :

Lactose.

2. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Classe pharmacothérapeutique : ANXIOLYTIQUE - code ATC : N05BA12

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

3. Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci, troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à

4. Posologie

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications pharmaceutiques. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Réservez à l'adulte.

La posologie est strictement individuelle et il n'est pas possible de définir une dose. Dans tous les cas, conformez-vous à la prescription de votre médecin traitant.

Mode et/ou voie d'administration

Voie orale.

Avalez ce médicament avec un verre d'eau.

Durée du traitement

La durée du traitement doit être aussi brève que possible et ne devrait pas dépasser 6 à 12 semaines (cf. avertissements et précautions).

5. Contre-indications

Ne prenez jamais Xanax 0,50 mg, comprimé sécable :

- si vous êtes allergique à l'alprazolam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 1 ;
- si vous avez une insuffisance respiratoire grave ;
- si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires pendant le sommeil) ;
- si vous avez une insuffisance hépatique grave ;
- si vous avez une myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

6. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient :

Très fréquents (peuvent affecter plus d'une personne sur 10)

- dépression,
- sédation,
- somnolence,
- difficulté à coordonner certains mouvements,
- troubles de la mémoire,
- difficulté pour parler,
- étourdissements,
- mal de tête,
- constipation,
- fatigue,
- irritabilité.

Fréquents (peuvent affecter 1 à 10 personnes sur 100)

- diminution de l'appétit,
- confusion,
- baisse ou augmentation de la libido,
- anxiété,
- insomnie,
- nervosité,
- troubles de l'équilibre,
- difficulté à coordonner certains mouvements,

40,30

Xanax 0,50mg

30 comprimés sécables



6 118000 081364

res involontaires (dystonie),

êtres hépatiques (modifica-

légères (œdème de Quin-

mission dans l'œil.

secondaires

étonnant effet indésirable qui r-

les et précautions pa-

sitions

vous à votre médecin ou pharmacien a Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul convient de demander conseil à votre médecin. Il lutte contre l'anxiété.

Avertissements

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation dose.

Risque de DEPENDANCE : ce traitement peut entraîner un état de dépendance physique et psychique. Divisez la dose.

dépendance :

- durée du traitement,
- dose,

• antécédents d'autres dépendances médicamenteuses.

La dépendance peut survenir même en l'absence de médicament.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer des réactions de sevrage.

Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures, d'une anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, une irritabilité, une tension nerveuse, des maux de tête, des étourdissements, une sensibilité anormale au bruit, une dépression, une confusion, une constipation, une fatigue, une irritabilité.

Malgré la décroissance progressive des doses, il peut arriver, à l'arrêt du traitement, avec réapparition de ces symptômes.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations d'apparence dans les heures qui suivent la prise peuvent apparaître dans les heures qui suivent la prise.

Chez certains sujets, particulièrement chez les enfants, ces effets peuvent provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : euphorie ou irritabilité, tension, modifications de comportement et de l'humeur.

Il est recommandé de faire une diminution progressive des doses et de l'arrêter progressivement.

Ces effets peuvent également être provoqués par l'abus ou la surconsommation de ce médicament.

Le risque de surdosage est élevé. Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être administrés avec prudence et sous surveillance médicale.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être administrés avec prudence et sous surveillance médicale.



Artane® 5 mg

Chlorhydrate de Trihexyphénidyle

Comprimés

SANOFI

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle 5 mg
Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (lélilit), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises à jour : 07/2013
Périodicité : 06/2013
Délai : 07/2013
ARTANE 5 MG
CP 820
P.P.V : 13DH30
meilleur avant le 11/08/2014
118000060314

peuvent survenir
en cas de
galactosémie...
du glucose et du...
lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse – Allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSETE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la

• r...
• c...
• Ces e...
âgées



Artane® 5 mg

Chlorhydrate de Trihexyphénidyle

Comprimés

SANOFI

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle 5 mg
Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (llevilite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

- Date de fabrication : LOI : 20/07/11
- E.P. : 03/2023

ARTANE 5MG
CP B20

P.P.V : 130H30

6 118000 060314

lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse – Allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la