

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educateur :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Maladie chronique :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044407

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3687 Société : R 58600

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre :

Nom & Prénom : MAKHLOUKI MUSTAPHA

Date de naissance : 23/11/1953

Adresse : 21 rue Mohamed Ben Ahmed BELVEDER CASABLANCA

Tél. : 06 62 87 55 60 Total des frais engagés : 1192,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : MAKHLOUKI Mustapha Age : 52

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : HTA + Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 05/08/2021

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
5-FEV-2024	C	1	1500	DR. SANDAOUY 258 Av. "A" En Face de l'Université CASA BLANCA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

5/02/24 1042,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient



Coefficient
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS


DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CCEFFICIENT
MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 G
35533411 11433553
B



Coefficient
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur SANDAOUI Mostafa

Medecine Générale

Ancien Médecin à l'Hôpital AL Hassani

Nador

356, Av. Chouhada (en Face Cinéma Saâda)

Hay Mohammadi - Casablanca

Tél.: 05 22 60 20 20

الدكتور سنداوي مصطفى

الطب العام

طبيب سابقاً بمستشفى الحسني

الناظور

356، محج الشهداء (مقابل سينما السعادة)

الحي المحمدي - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 60 20 20

05 FEB 2021

Dr. SANDAOUI Mostafa

6x28,00

Almouhamed

3x68,90

My + 2/1
Dinet LP

4x40,00

My 1/1
Melgou

15x7x4/3

My 1/1
Flethal 6

30x5

My 1/1
del tram

1042,60

Dr. SANDAOUI Mostafa
351, Rue Abdel Ben Ahmed
Tél : 05 22 60 20 20
Fax : 05 22 60 20 44

PPV: 159DH30



بدون شروط معينة للتخزين
يحفظ بعيداً عن متناول و مراه الأطفال.

PPV: 159DH30



Dr. SANDAOUI Mostafa
356, Av. Chouhada - Hay Mohammadi - Casablanca
Tél : 05 22 60 20 20
Fax : 05 22 60 20 44

☒ valable 3 mois

Le 05/02/2021

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE ☒

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Dr. HAN MALLAH - MOKE

Certifie que Mlle, Mme, M. :

DAKH LOUKI MUSTAPHA

Présente

une H TA + Diabète + Joints

Nécessitant un traitement d'une durée de :

indéterminée (Chronique)

Dont ci-joint ordonnance :

ordonnance

(à défaut noter le traitement prescrit)

[Stamp: Dr. HAN MALLAH MOKE, Medecin Conseil, MUPRAS, 0522-22-78-14]

FLUDEX[®] LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimé pelliculé à Libération Prolongée

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels?».

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilisation.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malab-

sorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants et adolescents

Sans objet

Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Évitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bédridil (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphémanil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisée pour traiter certains types de pneumonie),
- mizolastine (utilisée pour traiter les réactions allergiques comme le rhume des foins),
- anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments antifongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant de maladie comme la sclérose multiple),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte)
- diurétiques éparpilleurs de potassium (amiloride, spironolactone, triamterène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosuppresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatologiques ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).

FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse est planifiée ou non, si possible.

Prévenez votre médecin si

Le principe actif est excré-

vous prenez ce médicament

Sportifs

Sportifs, attention, cette

réaction positive des tests p

FLUDEX[®] LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimé pelliculé à Libération Prolongée

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels?».

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilisation.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malab-

sorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants et adolescents

Sans objet

Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Évitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bédridil (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphémilil (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisée pour traiter certains types de pneumonie),
- mizolastine (utilisée pour traiter les réactions allergiques comme le rhume des foins),
- anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments antifongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant de maladie comme la sclérose multiple),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte)

• diurétiques éparpilleurs de potassium (amiloride, spironolactone, triamterène),

• metformine (pour traiter le diabète),

• produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),

• comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,

• ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosuppresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatologiques ou dermatologiques graves,

• tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).

FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse est planifiée ou non, si possible.

Prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou allaitez.

Le principe actif est excrété dans le lait maternel. Si vous devez allaiter, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sportifs

Sportifs, attention, cette notice contient des informations importantes pour vous.

La réaction positive des tests de dépistage de la drogue peut être positive.

La réaction positive des tests de dépistage de la drogue peut être positive.

La réaction positive des tests de dépistage de la drogue peut être positive.

La réaction positive des tests de dépistage de la drogue peut être positive.

FLUDEX[®] LP

INDAPAMIDE 1,5 MG

30 comprimé pelliculé à Libération Prolongée

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique «Quels sont les effets indésirables éventuels?».

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
3. Comment prendre FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1-QU'EST-CE QUE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

FLUDEX 1,5 mg est un comprimé pelliculé à libération prolongée et contient de l'indapamide comme principe actif. L'indapamide est un diurétique. La plupart des diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Toutefois, l'indapamide est différent des autres diurétiques car il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite.

Ce médicament est indiqué pour réduire la pression artérielle élevée (hypertension) chez l'adulte.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLUDEX 1,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez une maladie grave du rein,
- si vous avez une maladie grave du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (maladie dégénérative du cerveau),
- si vous avez un taux bas de potassium dans le sang.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre FLUDEX 1,5 mg :

- si vous avez une maladie du foie,
- si vous êtes diabétique,
- si vous souffrez de goutte,
- si vous avez des troubles du rythme cardiaque ou des problèmes rénaux,
- si vous devez faire un examen de votre glande parathyroïde.

Vous devez informer votre médecin si vous avez eu des réactions de photosensibilisation.

Votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens biologiques afin de surveiller des taux faibles de sodium ou de potassium ou des taux élevés de calcium dans le sang.

Si vous pensez être concernés par ces situations ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malab-

sorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants et adolescents

Sans objet

Autres médicaments et FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Évitez de prendre FLUDEX 1,5 mg avec du lithium (utilisé pour traiter la dépression), en raison du risque d'augmentation des taux de lithium dans le sang.

Si vous prenez l'un des médicaments suivants, parlez-en à votre médecin, certaines précautions d'emploi particulières peuvent être nécessaires :

- médicaments utilisés pour des troubles du rythme cardiaque (ex : quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, ibutilide, dofetilide, digitaline),
- médicaments utilisés pour traiter des troubles mentaux tels que dépression, anxiété, schizophrénie... (ex : antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques, neuroleptiques),
- bédridil (utilisé pour traiter l'angine de poitrine, maladie provoquant des douleurs dans la poitrine),
- cisapride, diphémilan (utilisés pour traiter les troubles gastro-intestinaux),
- sparfloxacine, moxifloxacine, érythromycine par injection (antibiotiques utilisés pour traiter des infections),
- vincamine par injection (utilisé pour traiter des troubles cognitifs symptomatiques chez les patients âgés, y compris la perte de mémoire),
- halofantrine (antiparasitaire utilisé pour traiter certains types de paludisme),
- pentamidine (utilisée pour traiter certains types de pneumonie),
- mizolastine (utilisée pour traiter les réactions allergiques comme le rhume des foins),
- anti-inflammatoires non-stéroïdiens pour soulager la douleur (ex : ibuprofène) ou fortes doses d'acide acétylsalicylique,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) (utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque),
- amphotéricine B par injection (médicaments antifongiques),
- corticostéroïdes oraux utilisés pour traiter divers troubles : asthme sévère et arthrite rhumatoïde,
- laxatifs stimulants,
- baclofène (pour traiter la raideur musculaire survenant de maladie comme la sclérose multiple),
- allopurinol (pour le traitement de la goutte)
- diurétiques éparpilleurs de potassium (amiloride, spironolactone, triamterène),
- metformine (pour traiter le diabète),
- produits de contrastes iodés (utilisés pour les examens aux rayons X),
- comprimés de calcium ou autres suppléments calciques,
- ciclosporine, tacrolimus ou autres immunosuppresseurs utilisés suite à une transplantation d'organe, pour le traitement de maladies auto-immunes ou de maladies rhumatologiques ou dermatologiques graves,
- tétracosactide (pour traiter la maladie de Crohn).

FLUDEX 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse est planifiée ou non, si possible.

Prévenez votre médecin si

Le principe actif est excréé dans le lait maternel. Si vous prenez ce médicament pendant la grossesse, consultez votre médecin.

Sportifs

Sportifs, attention, cette substance peut donner une réaction positive des tests de

MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg	
Acide tiaprofénique	100 mg
Excipients q.s.p.....	1 comprimé
Molgam® 200 mg	
Acide tiaprofénique	200 mg
Excipients q.s.p.....	1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :
 - des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
 - de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.
- Traitement symptomatique de courte durée :
 - des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
 - des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
 - dysménorrhées après recherche étiologique,
 - traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine, antiagrégants plaquettaires, lithium, méthotrexate utilisé, ticlopidine, femme enceinte (4 premiers mois).

Mises en garde et précautions :

Interrompre le traitement en cas de :

Prévenir le médecin en cas de :
Antécédents digestifs, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, Asthme...

LOT : 9638
UT. AV : 04-23
P.P.V : 40 DH 00

200 mg
20 comprimés
Anti-inflammatoire

MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg	
Acide tiaprofénique	100 mg
Excipients q.s.p.....	1 comprimé
Molgam® 200 mg	
Acide tiaprofénique	200 mg
Excipients q.s.p.....	1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :
 - des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
 - de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.
- Traitement symptomatique de courte durée :
 - des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
 - des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
 - dysménorrhées après recherche étiologique,
 - traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine, antiagrégants plaquettaires, lithium, méthotrexate utilisé à fortes doses, ticlopidine, femme enceinte (4 premiers mois).

Mises en garde et précautions d'emploi :

Interrompre le traitement en cas de :

Prévenir le médecin en cas de :

- Antécédents digestifs, insuffisance hépatocellulaire, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, Asthme...

LOT : 9638
UT. AV : 04-23
P.P.V : 40 DH 00

200 mg
20 comprimés
Anti-inflammatoire

MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg	
Acide tiaprofénique	100 mg
Excipients q.s.p.....	1 comprimé
Molgam® 200 mg	
Acide tiaprofénique	200 mg
Excipients q.s.p.....	1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :
 - des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
 - de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.
- Traitement symptomatique de courte durée :
 - des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
 - des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
 - dysménorrhées après recherche étiologique,
 - traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, anticoagulants oraux, héparine, aspirine, méthotrexate utilisé, ticlopidine, femme enceinte (4 premiers mois).

Mises en garde et précautions :

Interrompre le traitement en cas de :

Prévenir le médecin en cas de :
Antécédents digestifs, insuffisance respiratoire, Asthme...

LOT : 9638
UT. AV : 04-23
P.P.V : 40 DH 00

200 mg
20 comprimés
Anti-inflammatoire

حَمْلٌ وَالْإِرْضَاعُ

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف

كلوبريدات المنقورمين

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
 احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لإرجاعها من جديد.
 إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إنا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب أو الصيدلي.
 وصف هذا الدواء لك شخصيا، لا تعلم أبدا لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
 إذا تقاعد أحد الأشخاص عن المروعة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 3 - ما هي طريقة تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 4 - ما هي الآثار الجانبية للمروعة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية.
- 7 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفحة الصيدلي الكليجاف العلاجي

دواعي الاستعمال:

يحتوي كليكوجاف على منقورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدين في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يحزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعالني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
 يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
 يستعمله المرضى البالغون تناول كليكوجاف وحده أو دواء أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدمج أو إنسولين).
 يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمرافقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

- لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه المنقورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلا فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارمة، شائبة، تقبؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حاض لمني (انظر حواشٍ خفية في أسفله) أو حاض كيتوني. الحاض الكيتوني إصابة لكن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسكري كيتوني. (أدوية الأمراض في نتمثل التي في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة).

L0T 201389
 EXP 10/2023
 PPV 28.00DH

- إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.
- إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.
- يجب استشارة الطبيب في حالة:
- إذا كنت تعاني من الخسوف لفحص التصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مياينة تحتوي على اليود في وركك الدوية.
- إذا كنت مقبلا على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
- يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. يسفر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتيه بدقة تعليمات الطبيب.
- يجب الانتهاء من كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت الألياف لا تعمل بصورة صحيحة، كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو والتأثيرات شديدة أو انقطاع دمول عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية، وإلحاقاً، انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الآحاد).)

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بجفاف (فقدان مع لسوائل الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو غير سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (آلام في البطن)
- تقلصات العضلات
- صعوبة في التنفس
- صعوبة في النوم
- انخفاض معدل حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- انخفاض البني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية. سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكدت عليك باستخدام غلوكوجاف. كليكوجاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل الأسفاميدات المستعملة ضد السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينيدات)، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فشرّب أو أكل شيء ما، يحتوي على سكر قد يساعد على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق. أثناء فترة العلاج بكليكوجاف، سوف يتم فحص وظيفية الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و / أو تدهورت وظائف الكلى.

الاطفال لا ينطبق.

معلومات عن سوافاتها التي تاتير لحظوظ لا تنطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى
 إذا كنت مقبلا على حقن وعاني من مادة مياينة تحتوي على اليود، مثلا لفحص الأشعة أو بالسكاير، عليك إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرا أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضيف طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة أن الأدوية التالية من الموصفة طبيبا للأغراض من النوع 2 (السكري) التي تزيد من كمية البول (تزيد البول).

الأدوية التي تزيد من كمية البول (التي تزيد من كمية البول) (مضادات الاتهاب، مضادات الالتهاب، مضادات الكولي، هيدروكورتيزون، ديفلاميد، ريفاميسين، ميسيتدين، دولوفين، غرافير، وألوانا، كيت، تريموغاف، فانيبتاب، إيزوفانولون، كيزوتينيب، أو ألاباربي).

أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

• ضادات المستقبلات بيتا-2-الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتيكوستيرويد (المستعملة لعلاج مختلف الالتهابات خاصة التهابات الأمعاء الجلد أو الربو)،

• الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوجاف في الدم، وخاصة إذا كنت وظيف الكلى منخفضة (مثل فرياباميل، ريفاميسين، ميسيتدين، دولوفين، غرافير، وألوانا، كيت، تريموغاف، فانيبتاب، إيزوفانولون، كيزوتينيب، أو ألاباربي).

أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الحبوب
 تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

لحم أو الإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف

كلوبريدات المنقورمين

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
 احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لإرجاعها من جديد.
 إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إنا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب أو الصيدلي.
 وصف هذا الدواء لك شخصيا، لا تعلم أبدا لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
 إذا تقاعد أحد الأشخاص عن المروعة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 3 - ما هي طريقة تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 4 - ما هي الآثار الجانبية للمروعة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية.
- 7 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفحة الصيدلي الكليجاف العلاجي

دواعي الاستعمال:

يحتوي كليكوجاف على منقورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدين في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يحزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعالني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
 يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
 يستعمله المرضى البالغون تناول كليكوجاف وحده أو دواء أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدمج أو إنسولين).
 يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمرافقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

- لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه المنقورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلا فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارمة، غثبان، تقبؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حاض لمني (انظر حواشٍ خفية في أسفله) أو حاض كيتوني. الحاض الكيتوني إصابة لكن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسكري كيتوني. (أدوية الأمراض في نتمثل التي في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة).

L0T 201389
 EXP 10/2023
 PPV 28.00DH

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

• يجب استشارة الطبيب في حالة:

- إذا كنت تتناول أدوية الخضوع لفحص التصوير الشعاعي أو السكران والذي قد يقتضي حقن مادة مياينة تحتوي على اليود في وركك الدوية.
- إذا كنت مقبلا على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
- يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. يسفر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتيه بقة تعليمات الطبيب.

يجب الانتباه مع كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت الألياف لا تعمل بصورة صحيحة، كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو والتأثيرات شديدة أو انقطاع دمول عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية، وإلخاف، انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الآحاد).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطا بجفاف (فقدان مع لسوائل الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أوغير سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (آلام في البطن)
- تقلصات العضلات
- صعوبة في التمشيح
- صعوبة في النوم
- انخفاض معدل حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- انخفاض البنية حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت وبعد العملية. سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكدت عليك باستخدام غلوكوجاف. كليكوجاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل الأسفاميدات المستعملة ضد السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينيدات)، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فشرّب أو أكل شيء ما، يحتوي على سكر قد يساعد على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق.

إنشاء فترة العلاج بكليكوجاف، سوفيق معدل فحص وظيفية الكلى مرة واحدة على الأقل سنويا أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسنا / أو تدهورت وظائف الكلى.

الإفراط لا ينطبق.
 معلومات عن سوغاتفا التي تاتير لحظوظ لا تنطبق.
 تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلا على حقن وعاني من مادة مياينة تحتوي على اليود، مثلا لفحص الأشعة أو السكران، عليك إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرا أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة أن الأدوية التالية من الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
 الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والألم مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبّات كوكسي، إيبوبروفين، ريفاميسين، سيستيدين، دولونيفرغراف، وأولانزات، تريموغراف، فانيتاتيب، إيزونيكولازول، كيزوتينيب، أو ألابارب)
 أدوية أخرى المستخدمة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الحبوب

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

لحم أو الإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف

كلوبريدات المنقورمين

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
 احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لإرجاعها من جديد.
 إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إنا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب أو الصيدلي.
 وصف هذا الدواء لك شخصيا، لا تعلم أبدا لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
 إذا تقاعد أحد الأشخاص عن المروعة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 3 - ما هي طريقة تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 4 - ما هي الآثار الجانبية للمروعة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية.
- 7 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفحة الصيدلي الكليجاف العلاجي

دواعي الاستعمال:

يحتوي كليكوجاف على منقورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدين في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يحزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعالني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
 يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
 يستعمله المرضى البالغون تناول كليكوجاف وحده أو دواء أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدم أو إنسولين).
 يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمرافقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

- لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه المنقورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلا فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارمة، غثبان، تقبؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حاض لمني (انظر حواشٍ خفية في أسفله) أو حاض كيتوني، الحاض الكيتوني إصابة لكن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسكري كيتوني، أوتي، الأمراض في نكش مثل في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة.

L0T 201389
 EXP 10/2023
 PPV 28.00DH

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

• يجب استشارة الطبيب في حالة:

• إذا كنت مقبلا على الخضوع لفحص التصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مياينة تحتوي على اليود في وركك الدوية.

• إذا كنت مقبلا على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

• يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. يسفر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتيه بقة تعليمات الطبيب.

يجب الانتباه مع كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت الألياف لا تعمل بصورة صحيحة، كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو والتأثيرات شديدة أو انقطاع دويل عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية، وإلخاف، انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الآحاد).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطا بجفاف (فقدان مع لسوائل الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أوغير سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (آلام في البطن)
- تقلصات العضلات
- صعوبة في التنفس
- صعوبة العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير

• انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب

الحماض البني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية.

سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكدت عليك باستخدام غلوكوجاف.

كليكوجاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل الأسفاميدات المستعملة ضد السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينيدات)، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، عدم الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فشرّب أو أكل شيء ما، يحتوي على سكر قد يساعد على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق.

إنشاء فترة العلاج بكليكوجاف، سوفيق معدل فحص وظيفية الكلى مرة واحدة على الأقل سنويا أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسنا / أو تدهورت وظائف الكلى.

• الإفراط في تناول.

معلومات عن سوافاتها التي تاتير لحظوظ لا تنطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلا على حقن وعاني من مادة مياينة تحتوي على اليود، مثلا لفحص بالأشعة أو بالسكاير، عليك إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن . سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرا أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة أن الأدوية التالية

• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والألم مثل (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو مثبّات كوكسي-2، إيبوبروفين، ريفاميسين، سيستيدين، دولونيفرغراف، وأولانزات، تريموغراف الكلى

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأجنوسين II)

• ضادات المستقبلات بيتا-2-الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتكوستيرويد (المستعملة لمرض مختلف الاتصالات خاصة التهابات الأمعاء الجلد أو الربو).

• الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوجاف في الدم، وخاصة إذا كنت ووظائف الكلى منخفضة (مثل فرياباميل، ريفاميسين، سيستيدين، دولونيفرغراف، وأولانزات، تريموغراف الكلى

فانديتابيل، إيزوفلورونول، كيزوتينيب، أو ألاباربي)

• أدوية أخرى المستخدمة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الحبوب

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

لحم أو الإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف

كلوبريدات المنقورمين

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
 احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد.
 إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إنا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب أو الصيدلي.
 وصف هذا الدواء لك شخصيا، لا تعلم أبدا لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
 إذا تقاعد أحد الأشخاص عن المروعة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 3 - ما هي طريقة تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 4 - ما هي الآثار الجانبية للمروعة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية.
- 7 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصف الصيدلي الكليوجاف العلاجي

دواعي الاستعمال:

يحتوي كليكوجاف على منقورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدة في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يحزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعالني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
 يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
 يستعمله المرضى البالغون تناول كليكوجاف وحده أو دواء أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدمج أو إنسولين).
 يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمرافقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

- لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه المنقورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارمة، شائناً، تقبؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حاض لمني (انظر حواشٍ خفية في أسفله) أو حاض كيتوني. الحاض الكيتوني إصابة لكن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسكري كيتوني. (الأمراض في نضج مثل التي في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة).

L0T 201389
 EXP 10/2023
 PPV 28.00DH

- إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.
- إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.
- يجب استشارة الطبيب في حالة:
- إذا كنت تعاني من الخسوف لفحص التصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مائية تحتوي على اليود في وركك الدومية.
- إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
- يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. يسفر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتيب بدقة تعليمات الطبيب.
- يجب الانتهاء من كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت الألياف لا تعملان بصورة صحيحة، كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو والتأثيرات شديدة أو انقطاع دمولن عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية، وإلحاقاً، انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الآحاد).)

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بجفاف (فقدان مع لسوائل الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو غير سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (آلام في البطن)
- تقلصات العضلات
- صعوبة في التنفس
- صعوبة في النوم
- انخفاض معدل حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- انخفاض البنية حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية. سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكدت عليك باستخدام غلوكوجاف. كليكوجاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل الأسفاميدات المستعملة ضد السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينيدات)، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فسرّب أو أكل شيء ما، يحتوي على سكر قد يساعد على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق. أثناء فترة العلاج بكليوجاف، سوف يتم فحص وظيفية الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً و / أو تدهورت وظائف الكلى.

الاطفال لا ينطبق.

معلومات عن سوافاتها التي تاتير لحظوظ لا تنطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو بالسكاير، عليك إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضيف طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة أن الأدوية التالية من الموصفة طبيك أو الأدوية التالية:

• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والألم مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبّات كوكسي-2، إيبوبروفين، ريفاميسين، سيستيدين، دولويفرغراف، وأولانزات، تريموغراف الكلى).

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأجنوسين II).

• ضادات المستقبلات بيتا-2-الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتكوستيرويد (المستعملة لعلاج مختلف الحالات خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو).

• الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوجاف في الدم، وخاصة إذا كنت وظيف الكلى منخفضة (مثل فرياميل، ريفاميسين، سيستيدين، دولويفرغراف، وأولانزات، تريموغراف الكلى، فانيتاب، إيزوفلورون، كيزوتينيب، أو ألاباربي).

• أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الحبوب

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

لحم أو الإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف

كلوبريدات المنقورمين

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
 احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لإرجاعها من جديد.
 إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إنا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب أو الصيدلي.
 وصف هذا الدواء لك شخصيا، لا تعلم أبدا لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
 إذا تقاعد أحد الأشخاص عن المروعة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 3 - ما هي طريقة تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 4 - ما هي الآثار الجانبية للمروعة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية.
- 7 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفحة الصيدلي الكليجاف العلاجي

دواعي الاستعمال:

يحتوي كليكوجاف على منقورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدين في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يحزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في الدم حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعالني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
 يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.
 يستعمله المرضى البالغون تناول كليكوجاف وحده أو دواء أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للدمج أو إنسولين).
 يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمرافقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

- لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه المنقورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلا فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارمة، غثبان، تقبؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حاض لمني (انظر حواشٍ خفية في أسفله) أو حاض كيتوني. الحاض الكيتوني إصابة لكن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسكري كيتوني. (أدوية الأمراض في نتمثل التي في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة).

L0T 201389
 EXP 10/2023
 PPV 28.00DH

• إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.

• إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

• يجب استشارة الطبيب في حالة:

- إذا كنت تتناول أدوية الخضع لفحص التصوير الشعاعي أو السكران والذي قد يقتضي حقن مادة مياينة تحتوي على اليود في دورتك الدورية.
- إذا كنت مقبلا على الخضع لعملية جراحية كبيرة.
- يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. يسفر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتيه بقة تعليمات الطبيب.
- يجب الانتهاء من كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت الألياف لا تعمل بصورة صحيحة، كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو والتأثيرات شديدة أو انقطاع دمول عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية، وإلخاف، انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطا بجفاف (فقدان مع لسوائل الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أوغير سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (آلام في البطن)
- تقلصات العضلات
- صعوبة في التنفس
- صعوبة في النوم
- انخفاض معدل حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- انخفاض البنية حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية. سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكدت عليك باستخدام غلوكوجاف.

كليكوجاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل الأسفاميدات المستعملة ضد السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينيدات)، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصبب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فشرّب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعد على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق.

إنشاء فترة العلاج بكليكوجاف، سوفقم بفحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل سنويا أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسنا / أو تدهورت وظائف الكلى.

الاطفال

معلومات عن سوافاتها التي تاتير لحظوظ لا تنطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلا على حقن وعاني من مادة مياينة تحتوي على اليود، مثلا لفحص بالأشعة أو السكران، عليك إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرا أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يفضض طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة أن الأدوية التالية قد تتداخل مع كليكوجاف:

• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والألم مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مشتقات الكوكايين، البيروبيرون، ريفاميسين، سيبيدين، دولونيفرغراف، وأولانولاز، تريموغراف الكلى).

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأنجيوتنسين II).

• ضادات المستقبلات بيتا-2-الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتيكوستيرويد (المستعملة لعلاج مختلف الأمراض خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو).

• الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوجاف في الدم، وخاصة إذا كنت ووظائف الكلى منخفضة (مثل فرياباميل، ريفاميسين، سيبيدين، دولونيفرغراف، وأولانولاز، تريموغراف الكلى، فانيتابيل، إيزوفلورونولاز، كيزوتينيب، أو ألاباربي).

• أدوية أخرى المستخدمة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الحبوب

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

لحم أو الإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف

كلوبريدات المنقورمين

يجب قراءة هذه النشرة بأكملها بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
 احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لإرجاعها من جديد.
 إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، إنا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات عن الطبيب أو الصيدلي.
 وصف هذا الدواء لك شخصيا، لا تعلم أبدا لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
 إذا تقاعد أحد الأشخاص عن المروعة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

- 1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 3 - ما هي طريقة تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 4 - ما هي الآثار الجانبية للمروعة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ كليكوجاف ، قرص مغلف؟
- 6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية.
- 7 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصفحة الصيدلي الكليجاف A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:

يحتوي كليكوجاف على منقورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـغوانيد.

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدين في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يحزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعالني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات الصحية للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟

يستخدم كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السمي كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. يستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستخدم كليكوجاف أيضا مع الباقون تناول كليكوجاف وحده أو أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للبلع أو إنسولين).

يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمرافقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
 - إذا كنت تعاني من الأوعية (الحساسية المفرطة) تجاه المنقورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
 - إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
 - إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
 - إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارمة، شائبة، تقبؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حاض ليني (انظر حواشٍ خاض لي أسفله) أو حاض كيتوني. الحاض الكيتوني إصابة لكن في تركا مد خط في الدم يسمى "جسام كيتونة" والذي من شأنه التسبب بسكري كيتوني. (الأمراض في تفسل التي في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة).

L0T 201389
 EXP 10/2023
 PPV 28.00DH

• إذا كنت تستهلك بكثرة الشروب الكحولية.

• إذا انطبق عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

يجب استشارة الطبيب في حالة:

• إذا كنت تتناول لفص الضخوع (التي تستخدم لتصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مياينة تحتوي على اليود في بورت الدوية).

• إذا كنت مقبلا على الضخوع لعملية جراحية كبيرة.

• يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. يسفر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتيه بقة تعليمات الطبيب.

يجب الانتهاء من كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت الألياف لا تعمل بصورة صحيحة، كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو والتهايت شديد أو انقطاع طويل عن الطعام أو استهلاك الشروبات الكحولية، (والجفاف) انظر المعلومات الإضافية أدناه (ومشاكل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأوكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الآحاد).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كنت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطا بجفاف (فقدان مع لسوائل الجسم) مثل القيء الشديد، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو غير سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- القيء.
- اضطراب في المعدة (آلام في البطن)
- تقلصات العضلات
- صعوبة في التنفس
- صعوبة في النوم
- انخفاض معدل حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- انخفاض البنية حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى

إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية.

سوف يقرر طبيبك متى توقف وتتأكدت عليك باستخدام غلوكوجاف.

كليكوجاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل الأسفاميدات المستعملة ضد السكر في الدم، الإنسولين، الغليبتينيدات)، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، عدم الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة تصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فشرّب أو أكل شيء ما، يحتوي على سكر قد يساعد على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق.

إنشاء فترة العلاج بكليكوجاف، سوف يتم فحص وضعية الكلى مرة واحدة على الأقل سنويا أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسنًا / أو تدهورت وظائف الكلى.

الإفراط لا ينطبق.

معلومات عن سوافاتها التي تاتير لحظوظ لا تنطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلا على حقن وعاني من مادة مياينة تحتوي على اليود، مثلا لفحص بالأشعة أو بالسكاير، عليك إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخرا أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم معرفة أن الأدوية التالية:

• الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).

• الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والألم مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبّات كوكسي، إيبوبروفين، ريفاميسين، سيستيدين، دولويفرغراف، وأولانز، تريموغراف الكلى

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأجنوسين II)

• ضادات المستقبلات بيتا-2-الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتكوستيرويد (المستعملة لعلاج مختلف الحالات خاصة التهابات الحادة للجلد أو الربو).

• الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوجاف في الدم، وخاصة إذا كنت ووظائف الكلى منخفضة (مثل فرياميل، ريفاميسين، سيستيدين، دولويفرغراف، وأولانز، تريموغراف الكلى

• فانيثانيل، إيزوفلورون، كيزوتينيب، أو ألاباربي)

• أدوية أخرى المستخدمة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الحبوب

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

لحم أو الإرضاع

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

لا ينبغي تناول كليكوجاف أثناء الحمل أو الإرضاع.

DOLTRAM®

37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé, boîte de 20

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament:

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition :

Les substances actives sont:

Chlorhydrate de tramadol 37,50 mg

Paracétamol 325,00 mg

Pour un comprimé pelliculé:

Noyau: cellulose en poudre, amidon prégélatinisé, carboxyméthylamidon sodique, amidon de maïs, stéarate de magnésium

Pelliculage: Opadray jaune, Cire de carnauba.

Liste des excipients à effet notoire : sans objet

Indications thérapeutiques :

DOLTRAM® est une association de 2 antalgiques, le tramadol et le paracétamol, qui agissent ensemble pour soulager votre douleur.

DOLTRAM® est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses lorsque votre médecin pense qu'une association de tramadol et de paracétamol est nécessaire.

DOLTRAM® est réservé à l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

Posologie :

Mode et voie d'administration.

Les comprimés sont destinés à la voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, ni mâchés.

Durée du traitement.

Prenez toujours **DOLTRAM®** en respectant strictement les instructions de votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Fréquence d'administration.

DOLTRAM® ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Sauf prescription contraire de votre médecin, la dose initiale recommandée chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans est de 2 comprimés.

Des doses supplémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins; se conformer à la prescription médicale.

L'intervalle entre les prises doit être au minimum de 6 heures.

Ne pas prendre plus de 8 comprimés de DOLTRAM® par jour.

Votre médecin peut augmenter le délai entre les prises:

- si vous avez plus de 75 ans; une maladie du rein; une maladie du foie.
- Il est conseillé de prendre **DOLTRAM®** pour une durée la plus courte possible.

Contre-indications :

Ne prenez jamais **DOLTRAM®**, comprimé pelliculé:

- si vous avez eu une réaction allergique (par exemple: éruption cutanée, gonflement du visage, sifflement ou difficulté respiratoire) après avoir pris du tramadol ou du paracétamol ou tout autre composant de **DOLTRAM®**
- en cas d'intoxication aiguë par l'alcool, par les somnifères, par d'autres médicaments contre la douleur ou des médicaments psychotropes (médicaments qui agissent sur l'humeur et les émotions).
- si vous prenez en même temps des inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (médicaments utilisés pour le traitement de la dépression ou la maladie de Parkinson) ou si vous en avez pris au cours des deux semaines précédant le traitement par **DOLTRAM®**.

- si vous avez une maladie grave du foie,
- si vous avez une épilepsie non contrôlée par un traitement.

Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, **DOLTRAM®**, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Très Fréquents (plus de 1 patient sur 10):

- nausées, sensation de vertige, somnolence.
- vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnement),
- démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements,
- confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur.

Peu Fréquents (moins de 1 patient sur 100, mais plus de 1

- augmentation de la pression artérielle, troubles du rythme cutanées (éruptions, urticaire par exemple), picotements, membres, bourdonnements d'oreille, contractions musculaires, amnésie, difficultés à avaler, sang dans les selles, frissons,

Rares (moins de 1 patient sur 1000, mais plus de 1 patient

- convulsions, difficulté à coordonner les mouvements, dépression transitoire (syncope). Diminution du taux de sucre dans le sang.
- Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez les patients prenant du tramadol ou du paracétamol. Contactez votre médecin si vous remarquez l'un d'eux.

DOLTRAM®, comprimé pelliculé :

- sensation de faiblesse lorsque vous vous levez après être resté allongé.
- modification de l'appétit, faiblesse musculaire, respiration rapide.
- l'activité, modification de la perception, aggravation d'un asthme.
- dans de rares cas, une éruption cutanée, signe de réaction allergique.
- visage et du cou, des difficultés respiratoires ou une diminution de la fréquence cardiaque.
- concernés, arrêtez votre traitement et consultez immédiatement votre médecin.

30,00
PPV 30DH00
PER 05/23
LOT J1507



MOLGAM®

Acide tiaprofénique

Composition :

Molgam® 100 mg

Acide tiaprofénique 100 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

Molgam® 200 mg

Acide tiaprofénique 200 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant au groupe des propioniques, dérivé de l'acide aryl-carboxylique.

Indications :

Elles sont limitées chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 kg soit environ 4 ans au :

- Traitement symptomatique au long cours :

- des rhumatismes inflammatoires chroniques ; notamment polyarthrite rhumatoïde,
- de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.

- Traitement symptomatique de courte durée :

- des poussées aiguës d'arthrose, de lombalgies,
- des affections aiguës post-traumatiques bénignes de l'appareil locomoteur,
- dysménorrhées après recherche étiologique,
- traitement des douleurs inflammatoires dans les domaines ORL (bouche, gorge, nez, oreille) et stomatologique.

Contre indications :

Absolues :

Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise d'acide tiaprofénique ou de substances d'activité proche telles que autres AINS, aspirine.

Ulcère gastroduodénal en évolution.

Insuffisance hépatocellulaire sévère.

Insuffisance rénale sévère.

Enfant de moins de 15 kg.

Femme enceinte (4 derniers mois).

Relatives :

Autres AINS y compris les salicylés à forte anticoagulants oraux, héparine par voie par
lithium, méthotrexate utilisé à des doses > 1
ticlopidine, femme enceinte (5 premiers mo

Mises en garde et précautions d'emploi :

Interrompre le traitement en cas d'hémorrag

Prévenir le médecin en cas de :

Antécédents digestifs, insuffisance rénale chr

Insuffisance respiratoire, Asthme...

A16171

40,00