

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## cique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**UPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

Nº M20- 0007947

59 270

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 50049 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : ABOU OBIDA KHALDOUN

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 05 22 89 77 30 Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : 01/02/2021

Nom et prénom du malade : Mme ABOU OBIDA KHALDOUN Age : 868

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 11/02/2021

Signature de l'adhérent(e) :

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/02/2021	C.2		G	Docteur HASSAN AL KHATIB 20 Bd Al Oumara 3101 Fax: 0523 744 111 8d Al Hassana 3101 Al Khateeb Tél: 0522 111 0910 Fax: 0523 744 111 Docteur HASSAN AL KHATIB CARDIOLOGUE Oumera 3101 Al Khateeb 0523 744 111 Fax: 0523 744 111 Signature Al Khateeb 0523 744 111 Signature Al Khateeb 0523 744 111
08 FEV 2021	C.2 K.N.G (ECG)		300 DH	

## **EXÉCUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Montant de la Facture
 <b>Mme. BENJELLOUN NEAMA</b> Date: 2023-01-02	364.50 0.00 364.50

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
ASSISTANCE SOCIETE DE RADIOPHYSIQUE PARIS			

## AUXILIAIRES MEDICAUX

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

40  
hu

# CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

Résidence Star Youness , Rue Oumaima Sayeh, N°20, 2ème étage, Appt. N°6  
Boulevard Al Massira Al Khadra , Quartier Racine - Casablanca 20000

الدكتور حسن جملي  
أمراض القلب والشرايين

Dr. Hassan JAMMI  
CARDIOLOGUE

Diplômé de l'Université  
de Nice - Sophia Antipolis  
Ex. Assistant spécialiste  
des Hôpitaux de France

27,50 X 3 = 82,50

08 FEV. 2021

A. Aboyoussra khadley

Neblier 14 Nat



Medgar 1er lot

Li-Trou 1/2 cr 68,-

1/2 cr 27,90 33,97  
C.R.A.S.B.I.A.N.C.A.  
S.M.A.C.F.A.L.B.O.U.S.T.A.M.L  
Bd. Al Massira Al Khadra  
Casablanca 20000

Tilmax 1/2 cr 30,-



Savene 1cr 120,-

193,60 X 3 = 580,80

923,30

4.

80

1/2 cr 27,90 33,97  
C.R.A.S.B.I.A.N.C.A.  
S.M.A.C.F.A.L.B.O.U.S.T.A.M.L  
Bd. Al Massira Al Khadra  
Casablanca 20000

Docteur Hassan JAMMI  
CARDIOLOGUE  
20, Rue Oumaima SAYAH  
Bd. Al Massira Al Khadra Casa  
Tél.: 0522 39 31 01 Fax: 0522 36 79 31  
INP : 091080218

GSM : 06 61 14 94 22  
Tél : 05 22 39 31 01  
Fax : 05 22 36 79 35



## **Vous oubliez de prendre FOSAVANCE**

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE le lendemain. Ne prenez pas deux comprimés le même jour. Reprenez votre traitement d'un comprimé une fois par semaine, au moins une heure avant ou après les repas.

## **Vous arrêtez de prendre FOSAVANCE**

Il est important de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit. Comme on ne sait pas combien de temps vous devez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin de la nécessité de poursuivre ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient toujours.

La carte d'instructions est incluse dans la boîte de FOSAVANCE.

Elle contient des informations importantes vous rappelant comment prendre correctement FOSAVANCE.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament,

-demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **Effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez un des effets indésirables suivants, qui pourrait être grave et pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui relie la bouche à l'estomac) qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur pour avaler.

(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

Réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner une difficulté à respirer ou à avaler ; réactions cutanées.

70065270/00-1  
AHP 24/17 DMP/21/ANQ



6 118 001160471  
Fosavance 5600 UI

4 comprimés

DISTRIBUÉ PAR MSD MAROC B.P. 136 - BOUSKOURA  
P.P.V: 193,60 DH

146

S

## i vous oubliez de prendre FOSAVANCE

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez un comprimé de FOSAVANCE au réveil. Ne prenez pas deux comprimés le même jour. Reprenez votre traitement au jour correspondant à votre choix initial.

## Si vous arrêtez de prendre FOSAVANCE

Il est important de prendre FOSAVANCE aussi longtemps que votre médecin le prescrira. Le temps que vous devrez prendre FOSAVANCE, vous devrez discuter périodiquement avec votre médecin pour suivre ce traitement afin de déterminer si FOSAVANCE vous convient toujours.

Une carte d'instructions est incluse dans la boîte de FOSAVANCE.

Celle-ci contient des informations importantes vous rappelant comment prendre correctement FOSAVANCE.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas nécessairement chez tout le monde.

**Consultez votre médecin immédiatement** si vous ressentez un des effets indésirables suivants, qui pourrait être grave et pour lequel vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent : Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : brûlures d'estomac ; difficulté ou douleur pour avaler ; ulcération de l'œsophage (œsophage : tube qui relie la bouche à l'estomac) qui peut entraîner des douleurs dans la poitrine, des brûlures d'estomac ou une difficulté ou une douleur pour avaler.

(peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : réactions allergiques telles que urticaire ; gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner



chez les patients jeunes. Jusqu'à la dose initiale recommandée est de 2,5 mg (imprimé). Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les patients de plus de 65 ans, la dose journalière est de 2,5 mg par jour (1/2 gélule). La dose journalière nécessaire, la dose journalière est de 5 mg par jour. Cependant cette limite chez les patients du p. surv. insuff. Le tra. être int. \* suffisance cardiaque doit être assurée.

Le patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique doit être prévenu de la prise en charge, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante. L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie  $\geq 250 \text{ mol/L}$ ) n'est pas recommandée.

### **Précautions d'emploi**

- Anesthésie générale : si vous devez subir une anesthésie générale prévenez l'anesthésiste que

la dose initiale recommandée est de 2,5 mg (imprimé). Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les patients de plus de 65 ans, la dose journalière est de 2,5 mg par jour (1/2 gélule). La dose journalière nécessaire, la dose journalière est de 5 mg par jour. Cependant cette limite chez les patients du p. surv. insuff. Le tra. être int. \* suffisance cardiaque chronique doit être assurée.

Le patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique doit être prévenu de la prise en charge, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante. L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie  $\geq 250 \text{ mol/L}$ ) n'est pas recommandée.

## **VIGNETTE**

**NEBILET® 5mg**  
28 comprimés  
PPV 87DH50

Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez votre pharmacien) qui adsorbera le produit présent dans l'estomac.

**Si vous oubliez de prendre NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable :**  
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Maux de tête.
- Flouïdements.
- Fourmillements, picotement au niveau des extrémités des membres.
- Essoufflement.
- Constipation.
- Nausées.
- Diarrhée.
- Fatigue.
- Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).
- Plus rarement, ont également été rapportés :
  - Cauchemars.
  - Troubles de la vue.
  - Ralentissement du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, troubles de la

chez les patients jeunes. Jusqu'à la dose initiale recommandée est de 2,5 mg (imprimé). Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les patients de plus de 65 ans, la dose journalière est de 2,5 mg par jour (1/2 gélule). La dose journalière nécessaire, la dose journalière est de 5 mg par jour. Cependant cette limite chez les patients du p. surv. insuff. Le tra. être int. \* suffisance cardiaque doit être assurée.

Le patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique doit être pris par un cardiologue, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante. L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie ≥ 250 mol/L) n'est pas recommandée.

### Précautions d'emploi

- Anesthésie générale : si vous devez subir une anesthésie générale prévenez l'anesthésiste que

VIGNETTE  
NEBILET® 5mg  
28 comprimés  
PPV 87DH50

La dose journalière recommandée est de 2,5 mg (imprimé). Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les patients de plus de 65 ans, la dose journalière est de 2,5 mg par jour (1/2 gélule). La dose journalière nécessaire, la dose journalière est de 5 mg par jour. Cependant cette limite chez les patients du p. surv. insuff. Le tra. être int. \* suffisance cardiaque chronique doit être assurée.

Le patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique doit être pris par un cardiologue, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante. L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie ≥ 250 mol/L) n'est pas recommandée.

### Si vous oubliez de prendre NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Maux de tête.
- Flouïdissements.
- Fournissements, picotement au niveau des extrémités des membres.
- Essoufflement.
- Constipation.
- Nausées.
- Diarrhée.
- Fatigue.
- Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).
- Plus rarement, ont également été rapportés :
  - Cauchemars.
  - Ralentissement du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, troubles de la

pharmacien. Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez votre pharmacien) qui adsorbera le produit présent dans l'estomac.

chez les patients jeunes. Jusqu'à la dose initiale recommandée est de 2,5 mg (imprimé). Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les patients de plus de 65 ans, la dose journalière est de 2,5 mg par jour (1/2 gélule). La dose journalière nécessaire, la dose journalière est de 5 mg par jour. Cependant cette limite chez les patients du p. surv. insuff. Le tra. être int. \* suffisance cardiaque doit être assurée.

Le patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique doit être pris par un cardiologue, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante. L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie ≥ 250 mol/L) n'est pas recommandée.

### Précautions d'emploi

- Anesthésie générale : si vous devez subir une anesthésie générale prévenez l'anesthésiste que

VIGNETTE  
NEBILET® 5mg  
28 comprimés  
PPV 87DH50

La dose journalière recommandée est de 2,5 mg (imprimé). Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 5 mg par jour. Chez les patients de plus de 65 ans, la dose journalière est de 2,5 mg par jour (1/2 gélule). La dose journalière nécessaire, la dose journalière est de 5 mg par jour. Cependant cette limite chez les patients du p. surv. insuff. Le tra. être int. \* suffisance cardiaque chronique doit être assurée.

Le patient atteint d'insuffisance cardiaque chronique doit être pris par un cardiologue, et la posologie ne doit pas être modifiée sans son avis. Si la première dose est bien tolérée, le traitement sera poursuivi avec une posologie progressivement croissante. L'initiation du traitement par nébivolol nécessite une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivolol chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie ≥ 250 mol/L) n'est pas recommandée.

### Si vous oubliez de prendre NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NEBILET 5 mg, comprimé quadrisécable est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'hypertension artérielle essentielle, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Maux de tête.
- Flouïdissements.
- Fournissements, picotement au niveau des extrémités des membres.
- Essoufflement.
- Constipation.
- Nausées.
- Diarrhée.
- Fatigue.
- Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).
- Plus rarement, ont également été rapportés :
  - Cauchemars.
  - Ralentissement du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, troubles de la


pharmacien. Peuvent apparaître un pouls anormalement faible, une baisse de la pression artérielle, des difficultés respiratoires et des problèmes cardiaques. Avant l'arrivée du médecin, vous pouvez prendre du charbon activé (disponible chez votre pharmacien) qui adsorbera le produit présent dans l'estomac.

٤٢٩٢  
ملاعنة

سينتروم


Sintrom® 4 mg  
Acénocoumarol 10 comprimés

6 118000 181187



PPV :  
Exp :  
N° Lot :


20,00



سینتروم  
۴۲۹۲  
ملان


Sintrom® 4 mg  
Acénocoumarol 10 comprimés

6 118000 181187



PPV :  
Exp :  
N° Lot :


20,00



سینتروم  
۴۲۹۲  
ملان


Sintrom® 4 mg  
Acénocoumarol 10 comprimés

6 118000 181187



PPV :  
Exp :  
N° Lot :


20,00



سینتروم  
۴۲۹۲  
ملان

Sintrom® 4 mg  
Acénocoumarol 10 comprimés

6 118000 181187



PPV :  
Exp :  
N° Lot :

20,00

