

1/40

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Gachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/11/67	1/67	310		INP : <input type="text"/>
				INP : 09 10 244

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LA SOURCE T. EL MOUMNI MOUNA 6-7 Rue Ain Asserdou CIL - Casablanca tel: 05.22.36.24	28/01/2021 11/21	3656,10 150 MM

[illegible]



AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>														

T CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

GSM : 06 63 08 09 47 - Email : abdel.benn@hotmail.fr

$$3686,10$$




MR MERNISSI DRISS

FACTURE N° : 202100043

Casablanca le, 03/02/2021

Code Client : 000542

Code Article	Désignation	Qté	P.U.HT	Tva	P.U.JTC	MontantTTC
48665	BL N° 202100413 DU 03/02/2021 ON CALL SURE/50	1.00	125.00	20.00%	150.000	150.00
<div><p>Planet Santé 50, Rue de l'Isère Polo Casablanca - M : 4 683 Tél : 05 22 28 24 93</p></div>						

Arrêtée la présente facture à la somme de :
CENT CINQUANTE DH.

TOTAL H.T.	125.00
TOTAL T.V.A.	25.00
TOTAL T.T.C.	150.00


N° 0258

CABINET DOCTEUR
BENNANI Abdellah
Diabétologue - Endocrinologue - Nutritionniste
2ème Etage Belvédère
33, Bd N. - Casablanca - Maroc
Tél : 05 22 40 33 35 - 06 63 08 09 47
INP 091024488

Le 20/1/27

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (✓)

(A adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

A remplir par le praticien	
Je soussigné:	
Certifie que Mlle, Mme, M :	nommi. D(1))
Présente	Diabète - allérgique
Nécessitant un traitement d'une durée de:	une ordonnance
Dont ci-joint l'ordonnance:	
(A défaut noter le traitement prescrit)	3 - 25 (seuil 1.16)

(✓) : Valable 3 mois

Contact: 05-22-22-78-14 Fax 05-22-22-78-18

Tardyferon® 80 mg

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PRÉPARATIONS ANTI-ANÉMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est préconisé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinal chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Ne prenez pas de thé en même temps que votre médicament.

319334

6 118001 103041

Tardyferon® 80mg
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

• Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer, consultez votre médecin avant de commencer le traitement par Tardyferon.

319334

6 118001 103041

Tardyferon® 80mg
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

la thyroïde (par exemple les médicaments pour traiter la maladie de Parkinson ou la carbidopa).

319334

6 118001 103041

Tardyferon® 80mg
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments.

319334

6 118001 103041

Tardyferon® 80mg
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

Conduite de véhicules
Aucune donnée disponible sur l'utilisation de ce médicament avec des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg, comprimé sécable

Spironolactone

Encadré

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute Laboratoires Pfizer S.A. vous avez un doute, contactez votre pharmacien. BP 35, 24 000
- Ce médicament est prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALDACTONE, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALDACTONE, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.
1. QU'EST-CE QUE ALDACTONE

P.P.V. : 57DH70
LOT : B23055
EXP : 10.2021

Fabriqué par :
PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED
WHALTON ROAD - MORPETH
NORTHUMBERLAND NE61 3YA
ROYAUME UNI

- rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle,
- médicaments destinés à baisser le taux de sucre dans le sang,
- triméthoprime-sulfaméthoxazole.

P.P.V. : 57DH70
LOT : B23055
EXP : 10.2021

Interaction boissons

Sans objet

Interaction phytothérapie

Sans objet

Utilisation l'allaitement

Gros
Ce médicament

Fabriqué par :
PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED
WHALTON ROAD - MORPETH
NORTHUMBERLAND NE61 3YA
ROYAUME UNI

- si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être,
 - si vous allaitez.
- Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

- Un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- Une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (augmentation de certains globules blancs) et manifestations cutanées touchant les muqueuses.



- Une pommphigose (maladie se caractérisant par la présence d'amphoules remplies de liquide sur la peau).
- Un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aiguë).
- Un taux anormal de sels minéraux dans l'organisme tel qu'une augmentation du potassium dans le sang et une diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous observez un effet indésirable, contactez votre médecin ou votre pharmacien. P.P.V. : 57DH70 LOT : B24044 EXP : 03.2022



6 118001 170029

Informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ALDACTONE, comprimé sécable ?
- Tenir ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

NO-DEP® 50mg

Sertraline

**COMPOSITION :**

Sertraline chlorhydrate (DCI) 50 mg par comprimé.

Excipients : Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Amyglycolate sodique, Stéarate de magnésium, Talc, HPMC E-15, Indigo carmine lake, Dioxyde de titane, Propylène glycol, Alcool isopropylique, Eau purifiée.

FORMES ET PRESENTATIONS:

NO-DEP 50 mg, comprimés pelliculés sécables, Boîte de 15, 30 et de 60.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Le composant actif de NO-DEP® est la sertraline, un inhibiteur sélectif de la Recapture de la Sérotonine (ISRS); ces m

NO-DEP® 50mg

rs Sélectifs de

Sertraline**30 Comprimés pelliculés
sécables**

LOT: 266
PER: DEC 2021
PPV: 126 DH 80

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- Episodes dépressifs majeurs.
- Prévention des récurrences d'épisodes dépressifs.
- Troubles panique, avec ou sans agoraphobie.
- Troubles obsessionnels compulsifs (TOC).
- Trouble anxiété sociale.
- Etat de stress post-traumatique (ESPT).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Les comprimés de sertraline peuvent être administrés avec ou sans nourriture.
Prenez votre médicament une fois par jour, le matin ou le soir, à la dose habituelle est:

Adultes:

Dépression et trouble obsessionnel compulsif.

Dans la dépression et le TOC, la dose efficace est de 50 mg/jour.

La dose quotidienne peut être augmentée par tranches de 50 mg sur une période de 2 à 4 semaines jusqu'à 200 mg/jour.

sécables

et état de stress
est sociale et l'
jour après
menté

نو-ديب 50 مغ**سيرترالين**

LOT: 266
PER: DEC 2021
PPV: 126 DH 80

NO-DEP® 50mg

30 cps pelliculés sécables



6 118000 050889

NO-DEP® 50mg

30 cps pelliculés sécables



6 118000 050889

**30 قرصا ملبسا
قابلا للكسر**

4/10

Durée d'administration
nature d
symptôn

CONTRAINDICATIONS :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Un traitement concomitant par inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO, notamment la sélégiline, le moclobémide) ou des médicaments de type IMAO (par exemple le linézolide) est contre-indiqué.
- L'usage concomitant de pimozone est contre-indiqué.

GLURENOR comprimés 30 mg
Gliquidone

CATEGORIE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Sulfamide Hypoglycémiant. Antidiabétique Oral.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement du diabète sucré (type II) non insulino-dépendant lorsque le régime alimentaire et l'exercice ph.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif, aux sulfonamides en général ou à l'un des excipients

Les sulfonylurées sont contre-indiquées dans le diabète de type I (insulinodépendant), acido-cétosique, le diabète gestationnel, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance surrénale et l'allaitement, en cas de fonction rénale ou hépatique gravement compromise ou en cas d'insuffisance surrénalienne.

PRECAUTIONS D'USAGE

L'usage des hypoglycémisants oraux du groupe des sulfonylurées doit être limité aux patients adultes atteints de d ne peut être contrôlé par un régime et à qui l'administration d'insuline n'est pas indiquée.

En cas de manifestations hypoglycémiques (voir effets indésirables) administrer des hydrates de carbone; dans perte de conscience, il faut effectuer une perfusion lente i.v. de solution glucosée.

En cas de traumatismes, d'interventions chirurgicales, de maladies infectieuses et de fièvre, il peut s'avérer nécessaire de maintenir un contrôle métabolique approprié.

Les patients doivent apprendre à reconnaître les premiers symptômes de l'hypoglycémie (qui sont, en général, le mal de tête, l'irritabilité et la nervosité, les troubles du sommeil, les tremblements, la forte transpiration) afin de pouvoir avertir en temps utile leur médecin, qui doit être aussi informé de l'apparition de troubles digestifs intercurrents.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'activité hypoglycémiante des sulfonurés peut être augmentée par le dicumaryl et ses dérivés, par les inhibiteurs de la coagulation, par le phénylbutazone et ses dérivés, par le chloramphénicol, par les tétracyclines, par la tuberculothérapie, par les salicylates; elle peut être au contraire diminuée par les sympathicomimétiques, la chlorthalidone, les diurétiques thiazidiques et les préparations d'acide nicotinique.

Il faut également agir avec prudence lors de l'administration simultanée de bêta-bloquants.

Chez les patients traités avec des sulfonamides, il faut tenir compte de la possibilité d'un effet antabuse après ingestion de boissons alcoolisées.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris récemment tout autre type de médicament, même ceux sans prescription médicale.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement aux sulfoylurées de patients ayant un déficit en G6PD peut entraîner une anémie hémolytique.

Le Gliquidone doit donc être utilisé avec précaution chez ces patients et doit être considéré une alternative thérapeutique.

Le médicament contient du lactose, en cas d'intolérance à certains sucres, informer votre médecin traitant avant de prendre ce médicament

Grossesse et allaitement

Grossesse

Glurenore est contre-indiqué pendant la grossesse. Dans ce cas le traitement à l'insuline est instauré.

Les patientes voulant programmer une grossesse doivent en informer leur médecin.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre n'importe quel médicament.

Allaitement

Comme il n'existe pas de données sur le passage du gliquidone dans le lait maternel, Glurenor ne doit pas être pris par les femmes qui allaitent.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Aucune étude n'a été effectuée sur la capacité à conduire ou à utiliser des machines. Toutefois, Gluconore peut causer une hypoglycémie. Les patients devraient être informés pour savoir reconnaître les symptômes de l'hypoglycémie et agir avec prudence lorsqu'ils conduisent des véhicules ou utilisent des machines.

* VIGNETTE

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

...r un contrôle adéquat de la

* VIGNETTE

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

non cétogénique, qui

ivent déboucher sur la

Thérapie insulinaire pour

* **VIGNETTE**

GLURENOR® 30 mg
60 comprimés O
PPV 69DH

; bêta-bloquants par

contraceptifs oraux et les

comprimés pelliculés

comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Un effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE?

1. Qu'est-ce que Coralan et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coralan ?
3. Comment prendre Coralan ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Coralan ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations ?

1. QU'EST-CE QUE CORALAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Coralan (ivabradine) est un médicament pour le cœur utilisé dans :

- ▶ le traitement symptomatique de l'angor stable ou « angine de poitrine » (une maladie qui provoque des douleurs thoraciques) chez les adultes ayant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute.

Coralan est utilisé chez les patients adultes présentant une

Informations sur l'a

L'insuffisance cardiaque apparaît lorsque votre cœur n'arrive pas à pomper suffisamment de sang dans le reste de l'organisme. Les symptômes les plus fréquents sont les essoufflements, les gonflements des jambes, la fatigue, les palpitations, la sensation de faiblesse.

Comment agit Coralan

Coralan agit principalement
quelques battements par
oxygène, particulièrement
crise d'angine de poitrine es
Coralan aide à éviter et à ré
De plus, une fréquence car
du cœur et le pronostic vit
chroniques, l'action spé
cardiaque permet d'améliorer le fonctionnement cardiaque et le

MXGS0059



6 118001 130030

CORALAN 5 mg - O

Boîte de 28 comprimés

PPV : 295,00 DH

Servier Maroc - Casablanca

MXGS0058



6 118001 130047

CORALAN 5 mg

PPV:448DH00

Trajenta®

5 mg comprimés pelliculés

Linagliptine

**Veuillez lire attentivement
les informations importantes**



Ne prenez pas de ce médicament

- Gardez cette notice avec vous. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Trajenta et dans quel cas est-il utilisé
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Trajenta
- Si vous ressentez une douleur aiguë, comme une douleur abdominale) consultez votre médecin.

KALIEFF®

Bicarbonate de potassium

PRESENTATIONS

Boîte de 18 comprimés effervescent.

Boîte de 36 comprimés effervescent.

COMPOSITION

Bicarbonate de potassium
(correspondant à 14 mmol de potassium)

Excipient : un comprimé effervescent

PROPRIÉTÉS

Le potassium agit sur le métabolisme cellulaire. De plus, les électrolytes sont essentiels à l'activité cardiaque.

INDICATIONS

L'administration de potassium est indiquée en cas de déficit potassiumique, de pertes gastriques, d'abus de laxatifs, de traitement par diurétiques, de traitement par diurétiques osmotiques, de paresthésies chroniques.

- A l'administration de potassium, il faut tenir compte de la fonction rénale. A l'administration de potassium, il faut tenir compte de la fonction rénale. A l'administration de potassium, il faut tenir compte de la fonction rénale.

- Insuffisance rénale
- syndrome addisonien
- Myotonie congénitale
- Traitement concomitant par épargneur de potassium

PPV 28DH40
EXP 12/2023
LOT 99019 4

1400 mg

1 volume

laques et

états de
durance à

PPV 28DH40
EXP 12/2023
LOT 99019 4

PPV 28DH40
EXP 12/2023
LOT 99019 4

contenue

imés de

oyenne
s prises.
oubles

répartie

PPV 28DH40
EXP 12/2023
LOT 99019 4

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contrôler la kaliémie avant et pendant le traitement. Utiliser avec prudence chez le sujet âgé.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

a - Associations contre indiquées
Les diurétiques hyperkaliémiques : amiloride (seuls ou associés) : risque d'hyperkaliémie potentiellement létale en particulier chez l'insuffisant rénal (addition des effets hyperkaliémiques) sauf s'il existe une hypokaliémie.

b - Association déconseillée
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion

EFFETS SECONDAIRES

Irritation des muqueuses digestives, vomissements.
L'absorption d'une préparation potassique, après la prise pendant les repas, prévient ces effets.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Aspartame
Sodium environ 21,5 mg par comprimé

SURDOSAGE

Hyperkaliémie : paresthésie, apathie, confusion, état de choc, arrêt cardiaque.

Mesures thérapeutiques : vomissement provoqué, lavage gastrique, résines échangeuses d'ions.

A CONSERVER A L'ABRI DE LA CHALEUR

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

141298F56344P101000

KALIEFF®
18 comprimés effervescent

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

PPV 28DH40
EXP 06/2024
LOT 03025 2

Coralan[®] 5 mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

Coralan[®] 7,5 mg

Ivabradine

compr

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle co

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres p de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin r indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que Coralan et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coralan ?
3. Comment prendre Coralan ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Coralan ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations ?

QU'EST-CE QUE CORALAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Coralan (ivabradine) est un médicament pour le cœur utilisé dans :
le traitement symptomatique de l'angor stable ou « angine de poitrine » (une maladie qui provoque des douleurs thoraciques) chez les adultes ayant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute.

Coralan est utilisé chez les patients adultes présentant une tolérance ou ne pouvant pas prendre de médicaments pour le appelés bêta-bloquants.

Informations

L'insuffisance
reste de
respirat

Comme

Coralan aide à éviter et à réduire
quelq
oxygé

crise u ang

De plus, une fréquence cardiaque élevée an...
du cœur et le pronostic vital chez les patients insuffisants cardiaques chroniques, l'action spécifique de l'ivabradine sur la fréquence cardiaque permet d'améliorer le fonctionnement cardiaque et le pronostic vital de ces patients.

MXGS0059



6 118001 130030
CORALAN 5 mg
Boîte de 28 comprimés
PPV : 295,00 DH
Serrier Maroc - Casablanca

MXGS0059



6 118001 130030
CORALAN 5 mg
Boîte de 28 comprimés
PPV : 295,00 DH
Serrier Maroc - Casablanca

pour vous.

es signes

à tout effet

que:

aque qui apparaît
sang dans le
sont difficultés
des chevilles.

se cardiaque de
soin du cœur en
s desquelles une
De cette manière,
angine de poitrine.

DE

Coralan[®] 5mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

Coralan[®] 7,5mg

Ivabradine

comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Certains effets indésirables peuvent être graves. Consultez votre médecin si cela vous paraît nécessaire. Vous devrez peut-être arrêter de prendre ce médicament.

Informations importantes pour vous.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Certains effets indésirables peuvent être graves. Consultez votre médecin si cela vous paraît nécessaire. Vous devrez peut-être arrêter de prendre ce médicament.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

- 1. Qu'est-ce que Coralan et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Coralan ?
- 3. Comment prendre Coralan ?
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5. Comment conserver Coralan ?
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations ?

QU'EST-CE QUE CORALAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Coralan (ivabradine) est un médicament pour le cœur utilisé dans le traitement symptomatique de l'angor stable ou « angine de poitrine » (une maladie qui provoque des douleurs thoraciques) chez les adultes ayant une fréquence cardiaque supérieure ou égale à 70 battements par minute.

Coralan est utilisé chez les patients adultes présentant une fréquence cardiaque élevée ou ne pouvant pas prendre de médicaments pour le cœur.

Informations

L'insuffisance cardiaque est une maladie du cœur qui provoque des difficultés respiratoires.

Comment

Coralan agit en réduisant la fréquence cardiaque, ce qui permet au cœur de mieux fonctionner. De plus, une réduction de la fréquence cardiaque peut améliorer le pronostic vital de ces patients.

YXG00058



PPV:448DH00

YXG00058



PPV:448DH00

ronique:

cardiaque qui apparaît sous la forme de douleurs de sang dans le thorax. Ces douleurs sont souvent aggravées par les efforts et les émotions.

Le traitement cardiaque de l'angor stable agit en réduisant la fréquence cardiaque, ce qui permet au cœur de mieux fonctionner.

Le traitement cardiaque de l'angor stable agit en réduisant la fréquence cardiaque, ce qui permet au cœur de mieux fonctionner.