

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OPTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

50172

Déclaration de Maladie : N° P19- 0020135

 Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 5340 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : MOUANZI BOUCHAIB Date de naissance : 1953

Adresse :

Tél. : 0663517268 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. AMRANI HENCHI SAIDA
Pneumo-Phtisiologue et Allergologue
Résidencia Firdaus, GHCPA
RDC - CASABLANCA
Tél : 05 22 89 02 02

Date de consultation : 16/02/2021

Nom et prénom du malade : MOUANZI Ben Abdellah Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : B.P.C. Sérile

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 17/02/2021

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16.02.2021	G		250 Dhs	<i>Dr. AMRANI HENNA</i> Pneumo-Phtisiologue et Allergiste Résidencia Firdous, GHSA RDC - CASABLANCA Tél : 05 22 89 02 02
CC				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE SEMALI n°83, Angle des Rues 11 et 18 Sidi El Khadir Tél : 05.22.89.62.93	16/02/2021	1271,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
				Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	35533411
G	11433553	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur AMRANI HENCHI SAIDA

Pneumo - phthisiologue
 Maladies Respiratoires et Allergiques
 Asthme, Rhinite, Tuberculose
 Ronflement et Apnées du Sommeil

Adultes et Enfants

Ex Médecin au CHU Ibn Rochd
 Et Hôpital Moulay Youssef



الدكتورة عمراني حنفي سعيدة
 اختصاصية
 في أمراض الجهاز التنفسى
 الصبيحة ، داء السل

كبار وأطفال

طبيبة سابقة بالمستشفى الجامعي ابن رشد
 و مستشفى مولاي يوسف

Casablanca, le

16.02.2021

الدار البيضاء، في

M. Mousa Rida

291.000 Dhs

① Foster

2 bouff + 2 fl

161.800 Dhs

②

Tova
sgli

15.350

127.50

S.V.

S.V.
Tova

S.V.



Dr. AMRANI HENCHI SAIDA
 Pneumo-Phthisiologue et Allergologue
 Résidence FIRDAOUS, GH2SA
 RDC - CASABLANCA
 Tél : 05 22 89 02 02

Foster 100/6µg, solution pour
inhalation en flacon pressurisé

Distribué par PROMOPHARM
Z.I. du Sahel - Had Soualem

PPV : 291DH00

Foster 100/6µg, solution pour
inhalation en flacon pressurisé

Distribué par PROMOPHARM
Z.I. du Sahel - Had Soualem

PPV : 291DH00

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule, Pilulier de 15 gélules

LOTBA0247
EXP 02/2022

PPN: 181 DH 80

L'intégralité de cette notice avant de car elle contient des informations

Intégrité de cette notice avant de prendre ce qui est contenu dans les informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir rubrique (4) Quels sont les effets indésirables éventuels.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Tiova Rotacaps 18 µg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
3. Comment prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Tiova Rotacaps 18 µg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou mode d'action

Tiova Rotacaps appartient à la classe des médicaments anticholinergiques. C'est un bronchodilatateur (il augmente le calibre des bronches pour favoriser le passage de l'air dans les poumons) à longue durée d'action qui s'administre par voie inhalée et sa durée d'action est de 24 heures.

Indications thérapeutiques

Tiova Rotacaps 18 µg permet aux patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de respirer plus facilement. La BPCO est une maladie pulmonaire chronique qui provoque l'essoufflement et la toux. Le terme BPCO est associé à la bronchite chronique et à l'emphysème. La BPCO étant une maladie chronique et vous devez donc utiliser Tiova Rotacaps 18 µg de façon régulière quotidiennement et non pas seulement quand vous ressentez une gêne respiratoire ou d'autres symptômes de BPCO.

Tiova Rotacaps 18 µg est un bronchodilatateur à longue durée d'action qui aide à ouvrir vos voies respiratoires et facilite l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. L'utilisation régulière de Tiova Rotacaps 18 µg peut aussi vous aider lorsque vous souffrez d'essoufflement continu lié à votre maladie et vous permettra de minimiser les effets de la maladie sur votre vie

quotidienne. Il vous permet également d'être actif plus. L'utilisation quotidienne de Tiova Rotacaps 18 µg permettra de prévenir l'aggravation soudaine à court terme des symptômes qui peuvent survenir plusieurs jours. L'effet de ce médicament ainsi que nous n'auriez à le prendre qu'une fois par jour. Pour une posologie de Tiova Rotacaps 18 µg, veuillez voir la rubrique prendre Tiova Rotacaps 18 µg et les instructions d'utilisation à verso de la notice.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE TIOVA ROTACAPS 18 µg, POUDRE POUR INHALATION EN GÉLULE ?

Liste des informations nécessaire avant la prise du médicament. Veuillez lire attentivement les questions suivantes. Si vous répondez par « Oui » à l'une de ces questions, veuillez en dire à votre médecin avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule.

- Êtes-vous allergique au tiotropium, à l'atropine ou à des médicaments similaires tels que l'ipratropium ou l'oxitropium ou aux produits laitiers ?
- Prenez-vous tout autre médicament contenant de l'ipratropium ?
- Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte ou allaitez-vous ?
- Souffrez-vous de glaucome à angle fermé, de problèmes d'angle ou de difficultés à uriner ?
- Avez-vous des problèmes rénaux ?
- Avez-vous subi un infarctus du myocarde au cours des 6 mois ou d'arythmie cardiaque instable ou dangereuse d'insuffisance cardiaque sévère au cours l'année passée ?

Ne prenez jamais Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au tiotropium, à sa substance active ou au lactose monohydrate qui contient des protéines de lait.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'atropine ou à des médicaments similaires, par ex. l'ipratropium ou l'oxitropium.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

- Prévenez votre médecin si vous souffrez de glaucome à angle fermé, de problèmes de prostate ou avec des difficultés à uriner.
- Si vous avez des problèmes rénaux, veuillez consulter votre médecin.
- Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule est indiqué pour l'entretien de votre bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il ne faut pas l'utiliser pour traiter une aggrivation soudaine d'essoufflement ou de respiration sifflante.
- Des réactions allergiques immédiates telles qu'une éruption cutanée, œdème, démangeaisons, sifflement ou essoufflement peuvent survenir suite à l'administration de Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Les médicaments par inhalation comme Tiova Rotacaps 18 µg peuvent entraîner une oppression à la poitrine, toux, sifflement ou essoufflement immédiatement après l'inhalation. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Veillez à ne pas laisser la poudre en inhalation toucher votre œil, car cela peut provoquer une précipitation ou une aggravation de la glaucomate.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule, Pilulier de 15 gélules

LOTBA0247
EXP 02/2022

PPN: 181 DH 80

L'intégralité de cette notice avant de car elle contient des informations

Intégrité de cette notice avant de prendre ce qui est contenu dans les informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir rubrique (4) Quels sont les effets indésirables éventuels.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Tiova Rotacaps 18 µg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
3. Comment prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Tiova Rotacaps 18 µg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou mode d'action

Tiova Rotacaps appartient à la classe des médicaments anticholinergiques. C'est un bronchodilatateur (il augmente le calibre des bronches pour favoriser le passage de l'air dans les poumons) à longue durée d'action qui s'administre par voie inhalée et sa durée d'action est de 24 heures.

Indications thérapeutiques

Tiova Rotacaps 18 µg permet aux patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de respirer plus facilement. La BPCO est une maladie pulmonaire chronique qui provoque l'essoufflement et la toux. Le terme BPCO est associé à la bronchite chronique et à l'emphysème. La BPCO étant une maladie chronique et vous devez donc utiliser Tiova Rotacaps 18 µg de façon régulière quotidiennement et non pas seulement quand vous ressentez une gêne respiratoire ou d'autres symptômes de BPCO.

Tiova Rotacaps 18 µg est un bronchodilatateur à longue durée d'action qui aide à ouvrir vos voies respiratoires et facilite l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. L'utilisation régulière de Tiova Rotacaps 18 µg peut aussi vous aider lorsque vous souffrez d'essoufflement continu lié à votre maladie et vous permettra de minimiser les effets de la maladie sur votre vie

quotidienne. Il vous permet également d'être actif plus. L'utilisation quotidienne de Tiova Rotacaps 18 µg permettra de prévenir l'aggravation soudaine à court terme des symptômes qui peuvent survenir plusieurs jours. L'effet de ce médicament ainsi que nous n'auriez à le prendre qu'une fois par jour. Pour une posologie de Tiova Rotacaps 18 µg, veuillez voir la rubrique prendre Tiova Rotacaps 18 µg et les instructions d'utilisation à verso de la notice.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE TIOVA ROTACAPS 18 µg, POUDRE POUR INHALATION EN GÉLULE ?

Liste des informations nécessaire avant la prise du médicament. Veuillez lire attentivement les questions suivantes. Si vous répondez par « Oui » à l'une de ces questions, veuillez en dire à votre médecin avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule.

- Êtes-vous allergique au tiotropium, à l'atropine ou à des médicaments similaires tels que l'ipratropium ou l'oxitropium ou aux produits laitiers ?
- Prenez-vous tout autre médicament contenant de l'ipratropium ?
- Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte ou allaitez-vous ?
- Souffrez-vous de glaucome à angle fermé, de problèmes d'angle ou de difficultés à uriner ?
- Avez-vous des problèmes rénaux ?
- Avez-vous subi un infarctus du myocarde au cours des 6 mois ou d'arythmie cardiaque instable ou dangereuse d'insuffisance cardiaque sévère au cours l'année passée ?

Ne prenez jamais Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au tiotropium, à sa substance active ou au lactose monohydrate qui contient des protéines de lait.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'atropine ou à des médicaments similaires, par ex. l'ipratropium ou l'oxitropium.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

- Prévenez votre médecin si vous souffrez de glaucome à angle fermé, de problèmes de prostate ou avec des difficultés à uriner.
- Si vous avez des problèmes rénaux, veuillez consulter votre médecin.
- Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule est indiqué pour l'entretien de votre bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il ne faut pas l'utiliser pour traiter une aggrivation soudaine d'essoufflement ou de respiration sifflante.
- Des réactions allergiques immédiates telles qu'une éruption cutanée, œdème, démangeaisons, sifflement ou essoufflement peuvent survenir suite à l'administration de Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Les médicaments par inhalation comme Tiova Rotacaps 18 µg peuvent entraîner une oppression à la poitrine, toux, sifflement ou essoufflement immédiatement après l'inhalation. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Veillez à ne pas laisser la poudre en inhalation toucher votre œil, car cela peut provoquer une précipitation ou une aggravation de la glaucomate.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule, Pilulier de 15 gélules

LOTBA0247
EXP 02/2022

PPN: 181 DH 80

L'intégralité de cette notice avant de car elle contient des informations

Intégrité de cette notice avant de prendre ce qui est contenu dans les informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir rubrique (4) Quels sont les effets indésirables éventuels.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Tiova Rotacaps 18 µg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
3. Comment prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Tiova Rotacaps 18 µg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou mode d'action

Tiova Rotacaps appartient à la classe des médicaments anticholinergiques. C'est un bronchodilatateur (il augmente le calibre des bronches pour favoriser le passage de l'air dans les poumons) à longue durée d'action qui s'administre par voie inhalée et sa durée d'action est de 24 heures.

Indications thérapeutiques

Tiova Rotacaps 18 µg permet aux patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de respirer plus facilement. La BPCO est une maladie pulmonaire chronique qui provoque l'essoufflement et la toux. Le terme BPCO est associé à la bronchite chronique et à l'emphysème. La BPCO étant une maladie chronique et vous devez donc utiliser Tiova Rotacaps 18 µg de façon régulière quotidiennement et non pas seulement quand vous ressentez une gêne respiratoire ou d'autres symptômes de BPCO.

Tiova Rotacaps 18 µg est un bronchodilatateur à longue durée d'action qui aide à ouvrir vos voies respiratoires et facilite l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. L'utilisation régulière de Tiova Rotacaps 18 µg peut aussi vous aider lorsque vous souffrez d'essoufflement continu lié à votre maladie et vous permettra de minimiser les effets de la maladie sur votre vie

quotidienne. Il vous permet également d'être actif plus. L'utilisation quotidienne de Tiova Rotacaps 18 µg permettra de prévenir l'aggravation soudaine à court terme des symptômes qui peuvent survenir plusieurs jours. L'effet de ce médicament ainsi que nous n'auriez à le prendre qu'une fois par jour. Pour une posologie de Tiova Rotacaps 18 µg, veuillez voir la rubrique prendre Tiova Rotacaps 18 µg et les instructions d'utilisation à verso de la notice.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE TIOVA ROTACAPS 18 µg, POUDRE POUR INHALATION EN GÉLULE ?

Liste des informations nécessaire avant la prise du médicament. Veuillez lire attentivement les questions suivantes. Si vous répondez par « Oui » à l'une de ces questions, veuillez en dire à votre médecin avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule.

- Êtes-vous allergique au tiotropium, à l'atropine ou à des médicaments similaires tels que l'ipratropium ou l'oxitropium ou aux produits laitiers ?
- Prenez-vous tout autre médicament contenant de l'ipratropium ?
- Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte ou allaitez-vous ?
- Souffrez-vous de glaucome à angle fermé, de problèmes d'angle ou de difficultés à uriner ?
- Avez-vous des problèmes rénaux ?
- Avez-vous subi un infarctus du myocarde au cours des 6 mois ou d'arythmie cardiaque instable ou dangereuse d'insuffisance cardiaque sévère au cours l'année passée ?

Ne prenez jamais Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au tiotropium, à sa substance active ou au lactose monohydrate qui contient des protéines de lait.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'atropine ou à des médicaments similaires, par ex. l'ipratropium ou l'oxitropium.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

- Prévenez votre médecin si vous souffrez de glaucome à angle fermé, de problèmes de prostate ou avec des difficultés à uriner.
- Si vous avez des problèmes rénaux, veuillez consulter votre médecin.
- Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule est indiqué pour l'entretien de votre bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il ne faut pas l'utiliser pour traiter une aggrivation soudaine d'essoufflement ou de respiration sifflante.
- Des réactions allergiques immédiates telles qu'une éruption cutanée, œdème, démangeaisons, sifflement ou essoufflement peuvent survenir suite à l'administration de Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Les médicaments par inhalation comme Tiova Rotacaps 18 µg peuvent entraîner une oppression à la poitrine, toux, sifflement ou essoufflement immédiatement après l'inhalation. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Veillez à ne pas laisser la poudre en inhalation toucher votre œil, car cela peut provoquer une précipitation ou une aggravation de la glaucomate.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule, Pilulier de 15 gélules

LOTBA0247
EXP 02/2022

PPN: 181 DH 80

L'intégralité de cette notice avant de car elle contient des informations

Intégrité de cette notice avant de prendre ce qui est contenu dans les informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir rubrique (4) Quels sont les effets indésirables éventuels.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Tiova Rotacaps 18 µg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
3. Comment prendre Tiova Rotacaps 18 µg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Tiova Rotacaps 18 µg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou mode d'action

Tiova Rotacaps appartient à la classe des médicaments anticholinergiques. C'est un bronchodilatateur (il augmente le calibre des bronches pour favoriser le passage de l'air dans les poumons) à longue durée d'action qui s'administre par voie inhalée et sa durée d'action est de 24 heures.

Indications thérapeutiques

Tiova Rotacaps 18 µg permet aux patients souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de respirer plus facilement. La BPCO est une maladie pulmonaire chronique qui provoque l'essoufflement et la toux. Le terme BPCO est associé à la bronchite chronique et à l'emphysème. La BPCO étant une maladie chronique et vous devez donc utiliser Tiova Rotacaps 18 µg de façon régulière quotidiennement et non pas seulement quand vous ressentez une gêne respiratoire ou d'autres symptômes de BPCO.

Tiova Rotacaps 18 µg est un bronchodilatateur à longue durée d'action qui aide à ouvrir vos voies respiratoires et facilite l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons. L'utilisation régulière de Tiova Rotacaps 18 µg peut aussi vous aider lorsque vous souffrez d'essoufflement continu lié à votre maladie et vous permettra de minimiser les effets de la maladie sur votre vie

quotidienne. Il vous permet également d'être actif plus. L'utilisation quotidienne de Tiova Rotacaps 18 µg permettra de prévenir l'aggravation soudaine à court terme des symptômes qui peuvent survenir plusieurs jours. L'effet de ce médicament ainsi que nous n'auriez à le prendre qu'une fois par jour. Pour une posologie de Tiova Rotacaps 18 µg, veuillez voir la rubrique prendre Tiova Rotacaps 18 µg et les instructions d'utilisation à verso de la notice.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE POUR PRENDRE TIOVA ROTACAPS 18 µg, POUDRE POUR INHALATION EN GÉLULE ?

Liste des informations nécessaire avant la prise du médicament. Veuillez lire attentivement les questions suivantes. Si vous répondez par « Oui » à l'une de ces questions, veuillez en dire à votre médecin avant de prendre Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule.

- Êtes-vous allergique au tiotropium, à l'atropine ou à des médicaments similaires tels que l'ipratropium ou l'oxitropium ou aux produits laitiers ?
- Prenez-vous tout autre médicament contenant de l'ipratropium ?
- Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte ou allaitez-vous ?
- Souffrez-vous de glaucome à angle fermé, de problèmes d'angle ou de difficultés à uriner ?
- Avez-vous des problèmes rénaux ?
- Avez-vous subi un infarctus du myocarde au cours des 6 mois ou d'arythmie cardiaque instable ou dangereuse d'insuffisance cardiaque sévère au cours l'année passée ?

Ne prenez jamais Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au tiotropium, à sa substance active ou au lactose monohydrate qui contient des protéines de lait.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'atropine ou à des médicaments similaires, par ex. l'ipratropium ou l'oxitropium.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

- Prévenez votre médecin si vous souffrez de glaucome à angle fermé, de problèmes de prostate ou avec des difficultés à uriner.
- Si vous avez des problèmes rénaux, veuillez consulter votre médecin.
- Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule est indiqué pour l'entretien de votre bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il ne faut pas l'utiliser pour traiter une aggrivation soudaine d'essoufflement ou de respiration sifflante.
- Des réactions allergiques immédiates telles qu'une éruption cutanée, œdème, démangeaisons, sifflement ou essoufflement peuvent survenir suite à l'administration de Tiova Rotacaps 18 µg, poudre pour inhalation en gélule. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Les médicaments par inhalation comme Tiova Rotacaps 18 µg peuvent entraîner une oppression à la poitrine, toux, sifflement ou essoufflement immédiatement après l'inhalation. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin immédiatement.
- Veillez à ne pas laisser la poudre en inhalation toucher votre œil, car cela peut provoquer une précipitation ou une aggravation de la glaucomate.