

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

ique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0029362

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1024 Société : R.A.M

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : DRIFI mohamed

Date de naissance : 01-01-1949

Adresse : habituelle

Tél. : 0669351854 Total des frais engagés : 613,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 07/01/2021

Nom et prénom du malade : Drifi mohamed

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : rph

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.


Fait à : Casablanca Le : 07/01/2021

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/01/21	CS		300 D1	
07/01/21	CH		300 D1	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
	07/01/2021	613,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																						
				COEFFICIENT DES TRAVAUX																					
				MONTANTS DES SOINS																					
				DEBUT D'EXECUTION																					
				FIN D'EXECUTION																					
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			H		H	25533412	21433552		00000000	00000000		D		G	00000000	00000000		35533411	11433553		B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
H		H																							
25533412	21433552																								
00000000	00000000																								
D		G																							
00000000	00000000																								
35533411	11433553																								
B																									
				MONTANTS DES SOINS																					
				DATE DU DEVIS																					
				DATE DE L'EXECUTION																					

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Adil OUZZANE



الدكتور عادل وزان

Chirurgien Urologue - Andrologue

أخصائي في أمراض و جراحة المسالك البولية

Ex. Professeur associé à la faculté
de médecine de Lille (France)

أستاذ باحث سابقا في كلية الطب
ببليل (فرنسا)

Ancien Chef de Clinique et Praticien
Hospitalier au CHU de Lille

رئيس سابق لمصلحة جراحة المسالك البولية
بالمستشفى الجامعي ببليل

Membre des Associations Française
et Européenne d'Urologie

عضو رسمي في الجمعية الفرنسية و الأوروبية
لجراحة المسالك البولية

Casablanca le : 07/01/2021

MR DRIFI MOHAMED

- Permixon 160 mg
2 gélules, matin, pendant 2 mois



PHARMACIE POLYCLINIQUE
Dr. TIK Abdelaziz
58, Route Mly Thani Hay Hassan
Tel: 0522 90 21 67 Casa

Docteur Adil OUZZANE
Chirurgien Urologue et Andrologue
22, Bd. Yacoub El Mansour
Bureau N° 42 - Casablanca

بيرمكسون

كبسولة

مستخلص شحم ستيروليك

٤٤١٤٥٧

يرجى الاطلاع بحرص على كامل هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء. إنها تضم معلومات هامة من أجل علاجك. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قراءتها من جديد.
- إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات والنصائح، اقصد الصيدلي.
- إذا تفاقم الأعراض أو استمرت، استشر الطبيب.
- إذا لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيها لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا شعرت إحدى التأثيرات المذكورة تشكل خطراً، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

تحذيرات خاصة:

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان
إستعمال هذا الدواء لا يُغني عن المراقبة المنتظمة للبروستات
لدى الطبيب. بريمكسون 160 ملغ، كبسولة ليس بديلاً عن
الجراحة عندما تصبح ضرورية.
لا يترك الدواء في متناول الأطفال.

احتياطات الاستعمال

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان.
في حالة الشك، فمن ضروري طلب استشارة الطبيب أو
الصيدلي.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواء آخر، بما في ذلك دواء
محصل عليه دون وصفة طبية، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

الحمل والرضاعة

استشيري من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

الجرعات

كبسولتان في اليوم.

تقيد بالوصفة الطبية.

كيفية الاستعمال

عبر الفم.

ينصح بتناول الكبسولات بكأس من الماء خلال الوجبات.

في هذه النشرة:

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يجب حفظ بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
6. معلومات إضافية

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

أدوية أخرى تستعمل في التضخم الحميد للبروستات
يوصى هذا الدواء في علاج بعض اضطرابات التبول (خروج
البول) المرتبطة بتضخم (زيادة حجم) البروستات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

لا تتناول أبداً بريمكسون 160 ملغ، كبسولة، في
الحالة التالية:

- سوابق الحساسية لأحد مكونات هذه الكبسولة.
- في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- يجب الإنتباه أثناء تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة:

بيرمكسون

كبسولة

مستخلص شحم ستيروليك

٤٤١٤٥٧

يرجى الاطلاع بحرص على كامل هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء. إنها تضم معلومات هامة من أجل علاجك. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قراءتها من جديد.
- إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات والنصائح، اقصد الصيدلي.
- إذا تفاقم الأعراض أو استمرت، استشر الطبيب.
- إذا لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيها لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا شعرت إحدى التأثيرات المذكورة تشكل خطراً، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

تحذيرات خاصة:

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان
إستعمال هذا الدواء لا يُغني عن المراقبة المنتظمة للبروستات
لدى الطبيب. بريمكسون 160 ملغ، كبسولة ليس بديلاً عن
الجراحة عندما تصبح ضرورية.
لا يترك الدواء في متناول الأطفال.

احتياطات الاستعمال

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان.
في حالة الشك، فمن ضروري طلب استشارة الطبيب أو
الصيدلي.

تناول أو إستعمال أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواء آخر، بما في ذلك دواء
محصل عليه دون وصفة طبية، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

الحمل والرضاعة

استشيري من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

الجرعات

كبسولتان في اليوم.

تقيد بالوصفة الطبية.

كيفية الاستعمال

عبر الفم.

ينصح بتناول الكبسولات بكأس من الماء خلال الوجبات.

في هذه النشرة:

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يجب حفظ بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
6. معلومات إضافية

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

أدوية أخرى تستعمل في التضخم الحميد للبروستات
يوصى هذا الدواء في علاج بعض اضطرابات التبول (خروج
البول) المرتبطة بتضخم (زيادة حجم) البروستات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

لا تتناول أبداً بريمكسون 160 ملغ، كبسولة، في
الحالة التالية:

- سوابق الحساسية لأحد مكونات هذه الكبسولة.
- في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- يجب الإنتباه أثناء تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة:

بيرمكسون

كبسولة

مستخلص شحم ستيروليك

٤٤١٤٥٧

يرجى الاطلاع بحرص على كامل هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء. إنها تضم معلومات هامة من أجل علاجك. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قراءتها من جديد.
- إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات والنصائح، اقصد الصيدلي.
- إذا تفاقم الأعراض أو استمرت، استشر الطبيب.
- إذا لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيها لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا شعرت إحدى التأثيرات المذكورة تشكل خطراً، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

تحذيرات خاصة:

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان
إستعمال هذا الدواء لا يُغني عن المراقبة المنتظمة للبروستات
لدى الطبيب. بريمكسون 160 ملغ، كبسولة ليس بديلاً عن
الجراحة عندما تصبح ضرورية.
لا يترك الدواء في متناول الأطفال.

احتياطات الاستعمال

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان.
في حالة الشك، فمن ضروري طلب استشارة الطبيب أو
الصيدلي.

تناول أو إستعمال أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواء آخر، بما في ذلك دواء
محصل عليه دون وصفة طبية، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

الحمل والرضاعة

استشيري من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

الجرعات

كبسولتان في اليوم.

تقيد بالوصفة الطبية.

كيفية الاستعمال

عبر الفم.

ينصح بتناول الكبسولات بكأس من الماء خلال الوجبات.

في هذه النشرة:

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يجب حفظ بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
6. معلومات إضافية

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

أدوية أخرى تستعمل في التضخم الحميد للبروستات
يوصى هذا الدواء في علاج بعض اضطرابات التبول (خروج
البول) المرتبطة بتضخم (زيادة حجم) البروستات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

لا تتناول أبداً بريمكسون 160 ملغ، كبسولة، في
الحالة التالية:

- سوابق الحساسية لأحد مكونات هذه الكبسولة.
- في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- يجب الإنتباه أثناء تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة:

بيرمكسون

كبسولة

مستخلص شحم ستيرولييك

٤٤١٤٥٧

يرجى الاطلاع بحرص على كامل هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء. إنها تضم معلومات هامة من أجل علاجك. إذا كانت لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى إعادة قراءتها من جديد.
- إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات والنصائح، اقصد الصيدلي.
- إذا تفاقم الأعراض أو استمرت، استشر الطبيب.
- إذا لاحظت تأثيرات غير مرغوب فيها لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا شعرت إحدى التأثيرات المذكورة تشكل خطراً، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

تحذيرات خاصة:

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان
إستعمال هذا الدواء لا يُغني عن المراقبة المنتظمة للبروستات
لدى الطبيب. بريمكسون 160 ملغ، كبسولة ليس بديلاً عن
الجراحة عندما تصبح ضرورية.
لا يترك الدواء في متناول الأطفال.

احتياطات الاستعمال

قد يتسبب تناول هذا الدواء على الريق في الغثيان.
في حالة الشك، فمن ضروري طلب استشارة الطبيب أو
الصيدلي.

تناول أو إستعمال أدوية أخرى

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواء آخر، بما في ذلك دواء
محصل عليه دون وصفة طبية، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

الحمل والرضاعة

استشيري من الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

الجرعات

كبسولتان في اليوم.

تقيد بالوصفة الطبية.

كيفية الاستعمال

عبر الفم.

ينصح بتناول الكبسولات بكأس من الماء خلال الوجبات.

في هذه النشرة:

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
3. كيف يجب تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يجب حفظ بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟
6. معلومات إضافية

1. ما هو بريمكسون 160 ملغ، كبسولة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

أدوية أخرى تستعمل في التضخم الحميد للبروستات
يوصى هذا الدواء في علاج بعض اضطرابات التبول (خروج
البول) المرتبطة بتضخم (زيادة حجم) البروستات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة؟

لا تتناول أبداً بريمكسون 160 ملغ، كبسولة، في
الحالة التالية:

- سوابق الحساسية لأحد مكونات هذه الكبسولة.
- في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- يجب الإنتباه أثناء تناول بريمكسون 160 ملغ، كبسولة:

Docteur Adil OUZZANE

Chirurgien Urologue - Andrologue

Ex. Professeur associé à la faculté
de médecine de Lille (France)
Ancien Chef de Clinique et Praticien
Hospitalier au CHU de Lille
Membre des Associations Française
et Européenne d'Urologie



أخصائي في أمراض و جراحة المسالك البولية

أستاذ باحث سابقا في كلية الطب
ببليل (فرنسا)
رئيس سابق لمصلحة جراحة المسالك البولية
بالمستشفى الجامعي ببليل
عضو رسمي في الجمعية الفرنسية و الأوربية
لجراحة المسالك البولية

Facture N°: 540

Date : 07/01/2021
Bénéficiaire : Mr Drifi Mohamed
Mr DRIFI MOHAMED

Tél: 0669351854
Email:
Adresse: CASABLANCA

Code	Description	Quantité	Prix	Sous-total
Visite du 07/01/2021				
CNS	Consultation	1	300,00	300,00
Ece	Echographie*	1	300,00	300,00
Total				600,00

Arrêté le présent document à la somme de :
six cents dirham(s)

Docteur Adil OUZZANE
Chirurgien Urologue et Andrologue
22, Bd. Yacoub El Mansour
Bureau N° 42 - Casablanca