

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



61625

Déclaration de Maladie : N° P19-0017619

- ☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1177 Société : RAM
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : AÏSSOU FATHOU Date de naissance : 01/01/1952
 Adresse : Aliou Oulfa casa
 Tél. : 05 22 90 52 62 Total des frais engagés : 4005,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. HOUSNI JAOUAN
 Spécialiste des Maladies
 de l'Appareil Digestif
 Bd. Zerkouni - 47.25.77

Date de consultation : 08/12/2020
 Nom et prénom du malade : Aïssou Fathouma Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Douleurs Abdominales + Troubles de Transit
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 02/03/2021
 Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Honoraires
01/12/2020	Soins dentaires		3300,00	Dr. Azeradine EL HAIBI Anesthésiste Réanimateur Chirurgie de la Mère et de l'Enfant Rue Omar El Khirssi Casablanca Tél: 05 22 90 50 05
15-DEC-2020	Soins dentaires			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE SALAH EDDINE 795 Bd Oued Sebou Casablanca Tel: 05 22 90 50 05	15/12/2020	254,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RADIOLOGIE 52, Bd Zerktouni Casablanca Tel: 05 22 70 50 00	08/12/20	Ph09	450,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 G B		COEFFICIENT DES TRAVAUX	
			MONTANTS DES SOINS	
			DATE DU DEVIS	
			DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR HOUSNI JAOUAD

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

(Foie - Estomac - Intestins - Hémorroïdes)

Diplôme de la faculté de médecine de Toulouse

Ancien Chef de Service de Gastro-Entérologie

des Hôpitaux El Ghassani à Fès

et Bouafi à Casablanca

Explorations Digestives

الدكتور جواد حسني

إختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

(المعدة - الكبد - الأمعاء - البواسير)

خريج كلية الطب بتولوز

رئيس سابقا بقسم أمراض الجهاز الهضمي

بمستشفى الغساني بفاس - وبوافي بالدار البيضاء

الفحص بالأليات البصرية

Dr. Housni JAOUAD

Casablanca, Le

15 DEC. 2020

الدار البيضاء، في

31.00

Dehidat

1 cs + 3

quantity

122.80

Zegerit 40mg

1 pl de la nuit

37.00

Ultis Lami

1 gl + 2

autre

64.10

Asinyn

1 cp + 2

Dr. Jaouad HOUSNI
Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif
70, Bd. Zerkouni - Appt 14
Tél: 49 28 93 / 47 25 77 C.A.S.A.

254.90



70, شارع الزرقطوني - الطابق الثاني رقم 5 (أمام سوق الورد) - الهاتف : 05 22 49 28 93 / 05 22 47 25 77 - الدار البيضاء

70, Bd. Zerkouni - 2ème Étage - Appt N°5 (Face au Marché de fleurs) - Casablanca

Tél : 05 22 47 25 77 / 05 22 49 28 93 - E-mail : housnijaouad@hotmail.fr



DEBRIDAT®

Granulés pour suspension buvable
Triméthutine

LOT :
PER :
PPV :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à votre enfant, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable ?
2. EST-IL UTILISÉ ?
3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT d'utiliser ce médicament ?
4. COMMENT PRENDRE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable ?
5. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
6. COMMENT CONSERVER DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable ?
7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
8. QU'EST-CE QUE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable ?
9. EST-IL UTILISÉ ?

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

Ce médicament est indiqué dans les douleurs spasmodiques de l'intestin. Ne prenez jamais DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable, si vous êtes allergique à la triméthutine ou à l'un des autres composants dans la rubrique 6.

Ne donnez pas ce médicament à un enfant de moins de 2 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable :

Mises en garde

Maladies en garde

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (jaune orangé S (E 110)) et peut provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Pour les enfants de plus de 5 ans :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 6 g de saccharose par dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Pour les adultes :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 9 g de saccharose par dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament si vous allaitez.

Informations importantes concernant certains composants de DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en flacon :

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, jaune orangé S.

3. COMMENT PRENDRE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en flacon ?

Posologie

Adulte

1 cuillerée à soupe 3 fois par jour.

Exceptionnellement, cette posologie peut être augmentée jusqu'à 6 cuillerées à soupe par jour.

31,00

10/2022

31 00

علاج القروح والوقاية من عودتها في حالة الإصابة بالموتية البوابية (*Helicobacter pylori*).

AXIMYCINE®

Amoxicilline

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

- AXIMYCINE® 1 g comprimés dispersibles, boîtes de 14 et 24
- AXIMYCINE® 500 mg comprimés dispersibles, boîtes de 16 et 24
- AXIMYCINE® 250 mg/5 ml poudre pour suspension buvable, flacons de 12 et 20 doses
- AXIMYCINE® 500 mg/5 ml poudre pour suspension buvable, flacons de 12 et 20 doses

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si un de ces effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contiennent cette notice

1. Quels sont les effets AXIMYCINE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AXIMYCINE® ?
3. Comment prendre AXIMYCINE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AXIMYCINE® ?
6. Informations supplémentaires

1 - OUVREZ-CE QUE AXIMYCINE® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité**

AXIMYCINE® est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

- Indications thérapeutiques

AXIMYCINE® est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différents parties du corps.

AXIMYCINE® peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AXIMYCINE® ?

- Ne prenez jamais AXIMYCINE® (Contre-indications)
- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AXIMYCINE® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas d'AXIMYCINE®, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
- En cas de grossesse, consultez votre médecin avant de prendre AXIMYCINE®, en raison de la présence d'aspartame dans la poudre pour suspension buvable.

- Faites attention avec AXIMYCINE® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE® si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- n'avez pas régulièrement mangé
- En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE®.

Toutes saignées et urinales

- Si vous devez effectuer :
- des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
- un dosage d'astrotol (insuline) pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement),
- informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AXIMYCINE®. En effet, AXIMYCINE® peut influencer sur les résultats de ces tests.

- Enfants - et adolescents -

Sans objet.

- Prise d'autres médicaments (interactions avec d'autres médicaments)

- Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou devez prendre : d'autres médicaments (le traitement de la goutte) avec AXIMYCINE®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.
- Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre

PPV 64DH10

AXIMYCINE® 14 comprimés dispersibles

LOT 01029 4
EXP 04/2022

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Aliments et l'alcool.
- Utilisation pendant la grossesse.
- Si vous êtes enceinte ou envisagez de le faire, demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

- Si vous avez des problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.
- Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?
- Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certains bactéries devaient survivre, elles pourraient à nouveau provoquer une réapparition de l'infection.
- Une fois terminée la prise de votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.
- Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps) peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peaux blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.
- Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre sang fonctionnent normalement.

Lot / مجموعة: 595
Fab / صنع: 02 2020

EXP. / صلاحية: 02 2023
BIOCODEX MAROC
PPV 37.00 DH

ULTRA-LEVURE

Saccharomyces boulardii CNCM I-745



à boire

Prendre ce médicament. Elle contient
ment.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
3. Comment prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable et dans quel cas est-il utilisé ?

ULTRA-LEVURE 250 mg gélules : chaque gélule contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

ULTRA-LEVURE 250 mg, poudre pour suspension buvable : chaque sachet-dose contient 250 mg de *Saccharomyces boulardii* CNCM I-745 sous forme lyophilisée (au minimum 6 milliards de cellules reviviscentes).

- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour prévenir la diarrhée due à la prise d'antibiotiques chez les personnes prédisposées à développer une diarrhée à *Clostridium difficile* ou une rechute de diarrhée due à *Clostridium difficile*.
- ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable est indiqué pour traiter les diarrhées aiguës chez les enfants jusqu'à 12 ans, en complément de la réhydratation orale.

En cas de doute demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ULTRA-LEVURE 250 mg gélules ou poudre pour suspension buvable ?

Ne prenez pas...

avec les médicaments mentionnés



Laboratoire de Pathologie du Centre

Pr. Laïla Laraqui
Anatomo - Cytopathologiste

Dr. Nouhad Benkirane
Anatomo - Cytopathologiste

Demande d'examen

De la part du Dr.

Nom et Prénom du Patient

Age

Date du prélèvement

Référence

Renseignements cliniques et paracliniques

Siège du prélèvement

Nature de lacte réalisé

Thérapeutique préalablement instituée

Actes chirurgicaux antérieurs avec références

Biopsie antérieure :

Oui ☐

Non ☒

Si oui, rappeler la référence, SVP

Pour F.C.V. et biopsie endométriale à visée hormonale :

- Date des dernières règles

- Parité

- Thérapeutique antérieure ou en cours

- Durée du cycle

- Frottis monocouche :

Vagin ☐

Exocol ☐

Endocol ☐

- Frottis conventionnel :

CBE :

Endomètre ☐

Signature et Cachet



Laboratoire de Pathologie du Centre

Dr. Nouhad BENKIRANE

Pr. Laïla LARAQUI

Casablanca, le 15/12/2020

FACTURE N° : 20/12393

Le laboratoire vous prie de croire à l'assurance de ses meilleurs sentiments et vous présente le relevé de ses honoraires s'élevant à la somme de :

450,00 Dhs


QUATRE CENT CINQUANTE DIRHAMS

Concernant les analyses exécutées le **08/12/2020**

Pour **AIJJOU FATTOUMA**

Sur ordonnance du : **Dr HOUSNI JAOUAD**


LABORATOIRE DE PATHOLOGIE
DU CENTRE
52, Boulevard Zerktouni
Tél.: 0522 22 51 31 / 34 Fax: 05 22 50 90



Laboratoire de Pathologie du Centre

Dr. Nouhad BENKIRANE

Pr. Laïla LARAQUI

Casablanca, le 09/12/20

Nom & Prénom: Mme AIJJOU FATTOUMA
Sur ordonnance du: Dr HOUSNI JAOUAD
Réf: 20H12144

Prélevé et parvenu au laboratoire le: 08/12/20

Organe ou siège du prélèvement : Estomac + duodénum

Renseignement(s) clinique(s): Age : 68 ans

Syndrome ulcéreux + troubles du transit

Gastrite érosive hémorragique, bulbo-duodénite

COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

Ce prélèvement est constitué de cinq fragments biopsiques. Un fragment a porté sur une muqueuse duodénale aux villosités de hauteur normale revêtues d'un épithélium cylindrique haut comportant une proportion harmonieuse d'entérocytes et de cellules caliciformes. La lymphocytose intra-épithéliale est estimée à 22%. Le tissu interstitiel est parsemé de lymphoplasmocytes. La musculaire-muqueuse est normale.

La recherche de parasite est négative.

Deux fragments montrent une muqueuse gastrique de type fundique revêtue par un épithélium cylindrique haut normal bordant également les cryptes qui sont de profondeur conservée. La couche des glandes est d'épaisseur conservée ; les tubes sont bien différenciés, parfois siège d'abcès ou d'exocytose leucocytaires. Le chorion superficiel est congestif, infiltré de lymphoplasmocytes. La musculaire-muqueuse est sans particularité.

Deux fragments correspondent à une muqueuse gastrique de type antral, exulcérée très inflammatoire, à composante épithéliale remaniée par un foyer de métaplasie intestinale et au tissu interstitiel congestif, densément infiltré de lympho-plasmocytes accompagnés de polynucléaires neutrophiles.

Sur coloration spéciale, il n'est pas observé d'helicobacter pylori.

Conclusion : Poussée aigue ulcérée sur gastrite antrale chronique non atrophique en activité sévère (+++), avec métaplasie intestinale, sans helicobacter pylori.
Gastrite fundique chronique non atrophique en activité sévère sans HP.
Absence de signe de dysplasie.
Muqueuse duodénale légèrement inflammatoire, sans signe d'atrophie ni signe d'infestation parasitaire.
Pas de malignité.

Dr Nouhad BENKIRANE