

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



61619

Déclaration de Maladie : N° P19-0017617

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1177 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : AISSOU Fattouma Date de naissance : 01/01/1952
Adresse : N° 113 Rue 28 Alia 2 ouffa Casablanca
Tél. : 05 22 9052 62 Total des frais engagés : 641,5 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Jaouad HOUSNI
Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif
70, Bd. Zerkoun, 4 BP
Tél. 49 28 91 4-2

03 DEC. 2020

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : AISSOU FATTOUNA Age : 68 ans

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : affection digestive

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 03 / 03 / 2021

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03 DEC. 2020	G	2	250	
01/12/20	G	1	0	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture

PHARMACIE SALAH EDDINE
Mme HASSOUNI Selma
56, ...
C.A. ...

3/12/20 236,6
05/12/20 154,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre Montant détaillé des Honoraires

A M P C I M I V

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D G
00000000 00000000
35533411 11433553
B

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR HOUSNI JAOUAD

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif

(Foie - Estomac - Intestins - Hémorroïdes)

Diplôme de la faculté de médecine de Toulouse

Ancien Chef de Service de Gastro-Entérologie

des Hôpitaux El Ghassani à Fès

et Bouafi à Casablanca

Explorations Digestives

الدكتور جواد حسني

إختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي
(المعدة - الكبد - الأمعاء - البواسير)

خريج كلية الطب بتولوز

رئيس سابقا بقسم أمراض الجهاز الهضمي
بمستشفى الغساني بفاس - وبوافي بالدار البيضاء
الفحص بالأليات البصرية

Attestation de FATOUMAH
03 DEC. 2020
Casablanca, Le :

الدار البيضاء، في:

31,00 . Demisak
1 cu - 3 au v w

142,20 . Fortreus
18/10 x 2
Ouen leige
180/10 x 2

63,40
236,60 . Mep 2
10 - 2 au v w

PHARMACIE SALAH EDDINE
Mme HASSOUNI Selma
Docteur en Pharmacie
56, Bd Oued Sbou Oulfa
Casablanca Tel 05 22 90 50 06

Dr. Jaouad HOUSNI
Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif
70, Bd Zerktouni Appt 1
Tel. 49 26 91 - 47.25 77 CAS

Mutesa®

Oxydes d'aluminium
et de magnésium

Suspension Buvable

1-IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

• Composition qualitative et quantitative

Pour 100 g de suspension buvable :

-Oxydes d'aluminium et de magnésium

-OXETACAINE.....

-Excipients:

Excipients à effet notoire : glycérol

• Forme pharmaceutique

Suspension buvable, flacon de 200 ml

• Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIACIDE associé à un anesthésique de contact (A : appareil digestif et métabolisme).

2- INDICATIONS THERAPEUTIQUES

• Traitement symptomatique des gastralgies dues à l'acidité gastrique, notamment dans :

- les maladies ulcéreuses.

- Les hernies hiatales

- Le reflux gastro- oesophagien.

- Les gastrites et gastro duodénites.

- Les dyspepsies accompagnant les troubles fonctionnels intestinaux, et le pyrosis

• Traitement symptomatique des intoxications accidentelles dues aux produits acides ou corrosifs.

3- CONTRE INDICATIONS

• Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave,

- antécédent d'allergie à l'un des constituants.

4- INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

• Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec les quinidiniques

• les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux médicaments. Par précaution, il convient d'espacer les prises de 2 heures entre l'antiacide et un autre médicament.

5- Grossesse et allaitement :

Aucun effet néfaste n'a été rapporté après de nombreuses années d'utilisation de ce produit au cours de la grossesse. En conséquence, MUTESA® peut, dans les conditions normales d'utilisation, être prescrit au cours des deux derniers trimestres de la grossesse.

32.10

يحدث عن ذلك مع الطبيب أو مع الصيدلي.

حکومت الدواء

شكّل ملح الفينيسيوم ثنائي المائية:

في شكل ملح الفينيسيوم ثنائي المائي (المائي)

دېوم، احادي لوات پروېلي غلېکولسورېتان، اوکټاډېنوکسي - پوليټوکسي - اېټانول، ماء منفي

بیمر المشترك لحمض میتاکریلیک - اینیل اکریلات (1:1) (البولیمر المشترك من حمض میتاکریلیک و اکریلات

الأغاث مع وفاة المؤلف سبباً، و: يا أهدى وكسينتوزات البرونيل والممثل.

ويؤثر زونكاس على مادة إيزوميثازول، ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة مثبطات مضخة البروتون، وتؤثر

توماس: مؤلف 20 ملغ كبسولات مقاومة لعصارة المعدة في علاج الأمراض القلبية

جزر المعدي المريئي أي عندما تصعد حموضة المعدة إلى المريء (الأنبوب الذي يربط الحنجرة بالمعدة)

ج. المعدة أو المعى (المعنى الأول) في حالة الإصابة ببكتيريا تسبب (Helicobacter pylori) في هذه الحالة قد يصف الطبيب كذلك مضادات حيوية لعلاج البكتيريا.

علاج و الوقاية من قروح المعدة المرتبطة باستعمال مضادات التهابات غير الستيرويدية. يمكن كذلك

ط الحبوب في المعدة الناجم عن ملاريا روليجير - إيسون.

سبب في ألم والتهاب وحرق.

(*Helicobacter pylori*). في هذه الحالة، قد يصف الطبيب ذلك مضادات حيوية لعلاج المعدة وسحب

بالغون

سبب في ألم التهاب وحروق.

ي المراهقون في سن 12 وما فوق

سبب في ألم التهاب وخروق.

لِإِنَّمَا هَذَا الدَّوَاءُ تَمَامًا حَسَبَ تَعْلِيمَاتِ الطَّبِيبِ أَوْ الصِّيدَلَانِي. أَطْلُبُ الْمَشُورَةَ مِنْ طَبِيبِكَ أَوْ الصِّيدَلَانِي

أ. تناولت هذا الدواء لمدة طويلة (خاصة إذا تناولته لأكثر من سنة)، سيضعف عنى الطبيب من أعبائك.

يحدد لك الطبيب عدد الكسولات اللازم تناولها ومدة العلاج. هذا يتوقف على سنك وحالتك الصحية

الجرعات المنصوص بها مذكورة أسفله.

الحموضة المعوية: الحرقاة والمعدة المريضة

يابع. علاج إضافي لمدة 4 أسابيع قد يكون ضروري لشفاء تام.

في حالة عدم التهاج المزني، الجرعة الموصى بها هي كبسولة زوغاس 20 ملغ في اليوم حسب احتياج المريض.

رَأَيْتُكَ تَعَانِي مِنْ مَشَاكِلِ كَبِدِيَّةٍ حَادَّةٍ، قَدْ يَصِفُ لَكَ الطَّبِيبُ جُرْعَةَ أَقْلٍ.

**DEBRIDAT®**

Granulés pour suspension buvable en Triméthutine

LOT :
PER :
PPV :

31,00

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de :
 • Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 • Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il est réservé à votre usage.
 • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT d'utiliser ce médicament ?
3. COMMENT PRENDRE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine ?**ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE**

Ce médicament est indiqué dans les douleurs spasmodiques de l'intestin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE

avant d'utiliser ce médicament :

1. Ne prenez jamais DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine :

- si vous êtes allergique à la triméthutine ou à l'un des autres composants du médicament.

Ne donnez pas ce médicament à un enfant de moins de 2 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine :

Mises en garde :

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (jaune orangé S (E 110)) et peut provoquer des réactions allergiques.

Pour les enfants entre 2 ans et 5 ans :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Pour les enfants de plus de 5 ans :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 6 g de saccharose par dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Pour les adultes :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient 9 g de saccharose par dose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

Précautions d'emploi :

En cas de diabète, tenir compte de la teneur en sucre : 5 ml contient 3 g de saccharose.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament si vous allaitez.

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine :

Liste des excipients à effet notoire : saccharose, jaune orangé S.

3. COMMENT PRENDRE DEBRIDAT®, granulés pour suspension buvable en triméthutine ?

Posologie :

Adulte :

1 cuillerée à soupe 3 fois par jour.

Exceptionnellement, cette posologie peut être augmentée jusqu'à 6 cuillerées à soupe par jour.

FORTTRANS®

poudre pour solution buvable en sachet

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FORTTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORTTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
3. COMMENT PRENDRE FORTTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FORTTRANS, poudre pour solution buvable en sachet ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. QU'EST-CE QUE FORTTRANS POUVRE POUR SOLUTION BUVALE EN SACHET ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Laxatif osmotique Code ATC : A06AD65

(A : appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament permet le lavage colique assurant la préparation des patients avant une exploration médicale ou une intervention chirurgicale. FORTTRANS appartient à un groupe de médicaments appelés laxatifs osmotiques contenant du macrogol (polyéthylène glycol ou PEG) à poids moléculaire élevé et des sels additionnels. FORTTRANS permet d'augmenter la quantité d'eau dans l'intestin, ce qui augmente la fréquence des selles dont le contenu devient de plus en plus liquide et, à terme, provoque un lavage de l'intestin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FORTTRANS POUVRE POUR SOLUTION BUVALE EN SACHET ?

Ne prenez jamais FORTTRANS :

- Si vous êtes allergique au macrogol 4000 ou au sulfate de sodium anhydre ou au bicarbonate de sodium, ou au chlorure de sodium ou de potassium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament et mentionnés en

l'examen. Pour les médicaments, l'efficacité peut être compromise. Grossesse et allaitement : Si vous êtes enceinte planifiez une grossesse avant de prendre ce médicament.

Excipient à effet noté : FORTTRANS contient

3. COMMENT PRENDRE FORTTRANS POUVRE POUR SOLUTION BUVALE EN SACHET :

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous a conseillé de le faire. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous avez un doute. FORTTRANS doit être administré par voie orale et doit être utilisé chez l'adulte. La dose recommandée est de 1 litre de solution pour 15 à 20 kg de poids corporel, ce qui représente une dose moyenne de 3 à 4 litres de solution reconstituée. Chaque sachet doit être dissout dans 1 litre d'eau. Mélanger jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Une fois la poudre dissoute, la solution doit être absorbée sans délai. Chaque litre de solution doit être ingéré en 1 heure. FORTTRANS peut être ingéré soit en une prise (3 à 4 litres le soir précédant l'examen) soit en prise fractionnée (2 litres le soir avant l'examen, 1 à 2 litres le matin de l'examen ou bien 3 litres le soir et 1 litre le matin de l'examen). Selon la prescription de votre médecin, vous devrez boire un verre de 250 ml de la solution toutes les 10 à 15 minutes. Vous devez avoir fini d'ingérer la solution au moins 3 ou 4 heures avant le début de l'examen.

Si vous avez pris plus de FORTTRANS, poudre pour solution buvable en sachet que vous n'auriez dû :

Si vous pensez que vous avez pris plus de FORTTRANS que vous n'auriez dû, informez votre médecin et buvez suffisamment d'eau ou de liquide pour éviter de vous déshydrater.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas chez tout le monde. Après avoir pris ce médicament, vous aurez des envies fréquentes d'aller à la selle. Ceci est normal et montre que le médicament est en train d'agir. Restez à proximité de toilettes jusqu'à ce que les effets du médicament s'arrêtent. Informez votre médecin immédiatement et arrêtez de prendre FORTTRANS si vous ressentez les effets suivants :

- Une réaction allergique sévère se manifestant par un gonflement de la face, des lèvres, de la langue, ou de la gorge ou une difficulté à respirer ou par un malaise sévère avec chute de la pression artérielle (choc anaphylactique).
- Les effets indésirables incluent :
 - Très fréquent (chez plus d'1 patient sur 10) : Nausées, douleurs abdominales et distension (gonflement) abdominale.
 - Fréquent (jusqu'à 1 patient sur 10) : Vomissements.

maphar
Zi Zanate, Ain Seba, Casablanca, Maroc
FORTTRANS SAC B4
P.P.V. : 142,20 DH



LOT : T03566
Exp : 01/2023

clinique
mers
sultan



مصلحة
مرس
السلطان
08/12/20

Digito FATTOUMA

122,80 - Zogor Zoung

32,10

* Nutria

1 los + 3 1/2m qv

~~Dr. Mohamed Housni~~
Spécialiste des Maladies
de l'Appareil Digestif
70, Bd Zerkouni Appt N°5 - CASABLANCA
Tel: 49 26 93 / 47 25 77

154,90



URGENCES 24H/24H

64, شارع عمر الادريسي (قرب حديقة مردوخ) - الدار البيضاء - الفاكس : 05 22 26 79 42
64, Bd Omar El Idrissi (en face du jardin Murdoch) - Casablanca - Fax : 05 22 26 79 42
الهاتف : 05 22 27 72 72 (L.G) / 05 22 27 02 79 / 05 22 27 80 34 / 05 22 26 73 00 / 05 22 27 53 71 / 05 22 27 32 85
E-mail : cliniquemersultan@gmail.com / www.cliniquemerssultan.ma / ICE : 001728360000010