

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044049

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2874 Société : 62371
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : ABDELF ABDELMAN
Date de naissance :
Adresse : 95, Bd Ibn Tachfine, Apt 5
Tél : 066.689.96 Total des frais engagés : 1348,7 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Chaima SEMAJI
223, Bd Abdelmoumen
Casablanca
Tél : 022 20 50 68

Date de consultation : 3 / 3 / 21
Nom et prénom du malade : ABDEL A.
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☒ Enfant
Nature de la maladie : Goutte - entente
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 8 / 3 / 2021
Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
3/3/21	C.S. + Echographie		500,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

03/03/21
05-03-21

183,10
695,60

ANALYSES RADIOGRAPHIQUES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins

Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H

25533412 21433552

00000000 00000000

D

00000000 00000000

35533411 11433553

B


G

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Oussama SENHAJI

Diplômé de la Faculté de Médecine de Lyon (France)
Spécialiste en Chirurgie hépato-biliaire
Digestif - Proctologie - Thyroïdienne & Gynécologique
Ancien assistant des hôpitaux de France
Ancien chef de service de chirurgie viscérale des
hôpitaux militaires

الدكتور أسامة الصنهاجي

خريج كلية الطب بليون - فرنسا
إختصاصي في جراحة الكبد و المسالك الصفراوية المرارة
جراحة الجهاز الهضمي و البواسر
جراحة الغدة الدرقية و الجهاز التناسلي للمرأة
طبيب مساعد بالمستشفيات الفرنسية
رئيس قسم الجراحة بالمستشفيات العسكرية

Casablanca, le 31/3/21 في الدار البيضاء،

N° ABBADI ANWAR

38,00

- Co-trim fort (S.V.)

Ac x 2/1

19,70

- Apozid (S.V.)

Ac x 3/1

75,00

- INESO 20 (S.V.)

Ac x 1/1

10,40

- Nealgy L 80 (S.V.)

Ac x 2/1

12183,10

19,70
PPV 19DH70
PER 10/23
LOT J2768



CO-TRIM FORT
PPV 38DH00

LOT: M0374
PER: 66/2022
PPV: 75,06DH

50,40
PPV 50DH40
PER 10/23
LOT J2929

223, Bd Abdelmoumen - Casablanca - Tél. : 05 22 20 50 68 : الهاتف - الدار البيضاء - شارع عبد المومن - 223

En cas d'URGENCE GSM : 06 61 15 63 62 : في حالة استعجال المحمول

Docteur Oussama SENHAJI

Diplômé de la Faculté de Médecine de Lyon (France)
Spécialiste en Chirurgie hépato-biliaire
Digestif - Proctologie - Thyroïdienne & Gynécologique
Ancien assistant des hôpitaux de France
Ancien chef de service de chirurgie viscérale des
hôpitaux militaires

الدكتور أسامة الصنهاجي

خريج كلية الطب بليون - فرنسا
إختصاصي في جراحة الكبد و المسالك الصفراوية المرارة
جراحة الجهاز الهضمي و البواسر
جراحة الغدة الدرقية و الجهاز التناسلي للمرأة
طبيب مساعد بالمستشفيات الفرنسية
رئيس قسم الجراحة بالمستشفيات العسكرية

Casablanca, le 5/3/21 في الدار البيضاء،

N° Abbadi ANWAR.

96,80

du 1^{er} au 5^{er} J



- Aximycin

1 cp

AXIMYCINE 24 comprimés dispersibles

PPV 96DH80

LOT 9D010 1
EXP 01/2022

139,00

- INESOL

Agel x 2 J



brale

LOT: M0464
PER: 01/2023
PPV: 139,00 DH

du 6^{er} au 10^{er} J

- Aximycin 1

1 cp

132,00

49,80

- INESOL

Agel x 2 J



- Flagyl 500

1 cp x 2 J



132,00

- C. Boc 500

1 cp x 2 J



Dr. Oussama SENHAJI
223 Bd Abdelmoumen
Casablanca
Tél : 022 20 50 68

223, Bd Abdelmoumen - Casablanca - Tél. : 05 22 20 50 68 : الهاتف - الدار البيضاء - شارع عبد المومن - 223

En cas d'URGENCE GSM : 06 61 15 63 62 : في حالة استعجال المبحول :

139,00 x 2

puis INESORO



Agel x 2, J

pdt 4 mois

12 695,60

Docteur ~~Cherifa~~ SENHAJI
223, Bd. Abdelmoumen
Casablanca
Tel : 022 20 50 68

PHARMACIE FARIDA
Farida EL HAMMOUCH
Pharmacienne Biologiste
79, Bd. Ibn Tachfine - Casablanca
Tél. : 30.01.69 - fax : 30.07.66

FLAGYL® 500 mg

Métronidazole
Comprimé pelliculé.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

- a) Denomination :**
FLAGYL 500 mg, comprimé pelliculé.

- b) Composition :**

500mg.
Excipients : amidon de blé, povidone K 30, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 2000, pour un comprimé pelliculé.

- c) Forme pharmaceutique et présentation :**
Comprimé pelliculé, boîte de 20.

- ## 2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

infections à germes sensibles (bactéries, parasites).

3. ATTENTION !

- (e) Dans pas utiliser ce médicament :
- si le médicament n'a jamais été utilisé dans les cas suivants :
 - allergie aux médicaments de la famille des imidazoles (famille d'antihistaminiques appartenant à la mectrimazole).
 - intolérance au gluten.
 - amidon de blé (gluten).

- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le disulfirame ou l'acool
- (boissons alcoolisées, médicaments contenant de l'alcool).
- EN CAS DE DOULEUR, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- b) Mises en garde spéciales :**

- La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée en raison du risque de réactions à type de rougeur du visage, chaleur, vomissements, accélération du rythme cardiaque.

- Le conseil d'intercompréhension le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.
- Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui volent.
- La prise de ce comprimé est contre-indiquée chez l'enfant avant 12 ans car il peut valoir de travers et s'étouffer.
- Précautions d'emploi :**

c) Précautions d'emploi :

En cas d'antécédents de troubles sanguins, de traitement à forte dose et/ou de traitement prolongé, votre médecin peut être amené à contrôler régulièrement par des examens sanguins votre numération formule sanguine.

Voie orale.

- (g) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- (d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- La prise de ce médicament peut perturber les résultats de certains examens de laboratoire (recherche de tréponèmes) ; le méthionidazole peut en effet faussement positif un test de Nelson.
- (e) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- (f) Conducteurs :**
- L'attention est attirée sur les vertiges, de confusion, attachés à l'emploi des véhicules et les accidents.
- (g) Liste des excipients**
- Pour une utilisation sans risque chez certains patients : Amidon de blé (gluten).
- a) Posologie :**
- Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
- La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique. L'intervalle individuel, la posologie usuelle est :
- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
 - chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.
- Dans certains cas, votre partenaire doit être impéativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.
- MEDICIN
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE
- b) Mode et voie d'administration :**
- Voie orale.
- c) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir tout médicament en cas de surveillance de troubles nerveux (journalièrement), difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- LA PRISE DE CE MEDICAMENT PEUT PERTURBER LES RESULTATS DE CERTAINS EXAMENS DE LABORATOIRE (RECHERCHE DE TRÉPONÈMES) ; LE MÉTHIONIDAZOLE PEUT EN EFFET FAUSEMENT POSITIF UN TEST DE NELSON.
- e) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- f) Conducteurs :**
- L'attention est attirée sur les vertiges, de confusion, attachés à l'emploi des véhicules et les accidents.
- g) Liste des excipients**
- Pour une utilisation sans risque chez certains patients : Amidon de blé (gluten).
- a) Posologie :**
- Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
- La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique. L'intervalle individuel, la posologie usuelle est :
- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
 - chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.
- Dans certains cas, votre partenaire doit être impéativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.
- MEDICIN
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE
- b) Mode et voie d'administration :**
- Voie orale.
- c) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir tout médicament en cas de surveillance de troubles nerveux (journalièrement), difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- LA PRISE DE CE MEDICAMENT PEUT PERTURBER LES RESULTATS DE CERTAINS EXAMENS DE LABORATOIRE (RECHERCHE DE TRÉPONÈMES) ; LE MÉTHIONIDAZOLE PEUT EN EFFET FAUSEMENT POSITIF UN TEST DE NELSON.
- e) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- f) Conducteurs :**
- L'attention est attirée sur les vertiges, de confusion, attachés à l'emploi des véhicules et les accidents.
- g) Liste des excipients**
- Pour une utilisation sans risque chez certains patients : Amidon de blé (gluten).
- a) Posologie :**
- Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
- La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique. L'intervalle individuel, la posologie usuelle est :
- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
 - chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.
- Dans certains cas, votre partenaire doit être impéativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.
- MEDICIN
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE
- b) Mode et voie d'administration :**
- Voie orale.
- c) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir tout médicament en cas de surveillance de troubles nerveux (journalièrement), difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- LA PRISE DE CE MEDICAMENT PEUT PERTURBER LES RESULTATS DE CERTAINS EXAMENS DE LABORATOIRE (RECHERCHE DE TRÉPONÈMES) ; LE MÉTHIONIDAZOLE PEUT EN EFFET FAUSEMENT POSITIF UN TEST DE NELSON.
- e) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- f) Conducteurs :**
- L'attention est attirée sur les vertiges, de confusion, attachés à l'emploi des véhicules et les accidents.
- g) Liste des excipients**
- Pour une utilisation sans risque chez certains patients : Amidon de blé (gluten).
- a) Posologie :**
- Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
- La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique. L'intervalle individuel, la posologie usuelle est :
- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
 - chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.
- Dans certains cas, votre partenaire doit être impéativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.
- MEDICIN
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE
- b) Mode et voie d'administration :**
- Voie orale.
- c) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir tout médicament en cas de surveillance de troubles nerveux (journalièrement), difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- LA PRISE DE CE MEDICAMENT PEUT PERTURBER LES RESULTATS DE CERTAINS EXAMENS DE LABORATOIRE (RECHERCHE DE TRÉPONÈMES) ; LE MÉTHIONIDAZOLE PEUT EN EFFET FAUSEMENT POSITIF UN TEST DE NELSON.
- e) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- f) Conducteurs :**
- L'attention est attirée sur les vertiges, de confusion, attachés à l'emploi des véhicules et les accidents.
- g) Liste des excipients**
- Pour une utilisation sans risque chez certains patients : Amidon de blé (gluten).
- a) Posologie :**
- Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
- La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique. L'intervalle individuel, la posologie usuelle est :
- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
 - chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.
- Dans certains cas, votre partenaire doit être impéativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.
- MEDICIN
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE
- b) Mode et voie d'administration :**
- Voie orale.
- c) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir tout médicament en cas de surveillance de troubles nerveux (journalièrement), difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- LA PRISE DE CE MEDICAMENT PEUT PERTURBER LES RESULTATS DE CERTAINS EXAMENS DE LABORATOIRE (RECHERCHE DE TRÉPONÈMES) ; LE MÉTHIONIDAZOLE PEUT EN EFFET FAUSEMENT POSITIF UN TEST DE NELSON.
- e) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- f) Conducteurs :**
- L'attention est attirée sur les vertiges, de confusion, attachés à l'emploi des véhicules et les accidents.
- g) Liste des excipients**
- Pour une utilisation sans risque chez certains patients : Amidon de blé (gluten).
- a) Posologie :**
- Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de six ans. Chez l'enfant de moins de six ans, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
- La posologie dépend de l'âge et de l'indication thérapeutique. L'intervalle individuel, la posologie usuelle est :
- chez l'adulte : de 0,750 g/jour à 2 g/jour,
 - chez l'enfant : 500 mg/jour à 20 - 40 mg/kg/jour.
- Dans certains cas, votre partenaire doit être impéativement traité, qu'il présente ou non des signes cliniques.
- MEDICIN
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE
- b) Mode et voie d'administration :**
- Voie orale.
- c) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de traitement prolongé, il est important de prévenir tout médicament en cas de surveillance de troubles nerveux (journalièrement), difficulté à coordonner des mouvements, vertiges, convulsions.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :**
- Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, et notamment avec le disulfirame et l'alcool, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- LA PRISE DE CE MEDICAMENT PEUT PERTURBER LES RESULTATS DE CERTAINS EXAMENS DE LABORATOIRE (RECHERCHE DE TRÉPONÈMES) ; LE MÉTHIONIDAZOLE PEUT EN EFFET FAUSEMENT POSITIF UN TEST DE NELSON.
- e) Grossesse - Allaitement :**
- En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Il convient cependant de demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
- Eviter l'allaitement pendant la prise de ce médicament.
- Nelson.
- f) Conducteurs :**
- L'attention est attirée sur les vertiges, de confusion