

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° P19-

049717

64594

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1895

Société : Retailié

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENCHEGOUR Hennia

Date de naissance : 1948

Adresse : Talaat

Tél. : 06.45.12.63.17

Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : BENACHEGOUR Hennia Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

dentiste + diabète + polyarthrite


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



Je garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/03/21	Consultation		5000	

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ALAOUI FDILI Mostafa Pharmacie de Lorraine SARL 52, Bd. Rabah Madani Casablanca Tel.: 0522 235 40 / 0522 22 21 50 Ref.: 00253670100094	26/03/2021	510,60

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. Hafid OUKHLIFT**

EX. MEDECIN CHEF DES F.A.R

MEMBRE AFFILIÉ À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
ET EUROPÉENNE DE CARDIOLOGIE

MEMBRE AFFILIÉ À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

CERTIFICAT DE LA FEDERATION

INTERNATIONAL DU DIABÈTE ET DE U.E.M.S.

ECHOGRAPHE

ECG

الدكتور حفيظ أوخليفت

طبيب رئيس سابق بالقوات المسلحة الملكية

عضو منتب للجمعية الفرنسية

والأوروبية لأمراض القلب

عضو منتب للجمعية الفرنسية لضغط الشريان

شهادة من الجامعة الدولية لداء السكري والازداد

الأوروبي للأطباء الأخصائيين

الكشف بالصدر (ايكوغرافي)

تخطيط القلب

Casablanca, le 24/10/2021

Bien à vous (بسمك)

3x41,70 - prof. 15

un mois

3x49,60 - D.m. 15

un mois

3x13,40 - Dr. 15

un mois

3x6,80

71 mg

Prof. 3x28,00 - Gyn. 15

un mois

Tous mois

=

= 3x30,70 - Cardiog. 15

un mois

510,60

CABINET MEDICAL  
DR. HAFID OU KHLIFT  
58 Bd d'Alsace Casablanca  
Tél.: 05 22 30 26 23

شارع الأزاس، الرقم 58، الطابق الثاني، بنجدة، قرب سوق بنجدة • الدار البيضاء • الهاتف : 05 22 30 26 23

58, Bd d'Alsace, 2ème étage, Benjdia près du Marché • Casablanca • Tél.: 05 22 30 26 23

## NOTICE : INFORMA

# Kardegic<sup>®</sup>

acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P. 1.  
Ain seba Casablanca  
Kardegic 75 mg. sac b 30  
P.P.V. : 30,70 DH



EAN 18000 061847

Veuillez lire attentivement avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que KARDEGIC 75 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre KARDEGIC 75 mg ?
3. Comment prendre KARDEGIC 75 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver KARDEGIC 75 mg ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE Kardegic 75 mg ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :  
ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEUR DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. KARDEGIC 75 mg appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire.

sur solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

### Autres médicaments et KARDEGIC 75 mg

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent.

**Vous ne devez pas prendre en même temps que KARDEGIC 75 mg d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille** (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

**L'association de ces médicaments à KARDEGIC 75 mg pourrait entraîner un surdosage** et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements.

**Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez** afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre KARDEGIC 75 mg en même temps que :

- un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang), sauf dans certaines situations où votre médecin pourra vous prescrire conjointement de l'aspirine et du clopidogrel,
- un autre médicament à base de benzboromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

## NOTICE : INFORMA

# Kardegic<sup>®</sup>

acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P. 1.  
Ain seba Casablanca  
Kardegic 75 mg. sac b 30  
P.P.V. : 30,70 DH



EAN 18000 061847

Veuillez lire attentivement avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que KARDEGIC 75 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre KARDEGIC 75 mg ?
3. Comment prendre KARDEGIC 75 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver KARDEGIC 75 mg ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE Kardegic 75 mg ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :  
ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEUR DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. KARDEGIC 75 mg appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire.

sur solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

### Autres médicaments et KARDEGIC 75 mg

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent.

**Vous ne devez pas prendre en même temps que KARDEGIC 75 mg d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille** (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

**L'association de ces médicaments à KARDEGIC 75 mg pourrait entraîner un surdosage** et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements.

**Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez** afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre KARDEGIC 75 mg en même temps que :

- un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang), sauf dans certaines situations où votre médecin pourra vous prescrire conjointement de l'aspirine et du clopidogrel,
- un autre médicament à base de benzboromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),

## NOTICE : INFORMA

# Kardegic<sup>®</sup>

acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P. 1.  
Ain seba Casablanca  
Kardegic 75 mg. sac b 30  
P.P.V. : 30,70 DH



EAN 18000 061847

Veuillez lire attentivement avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que KARDEGIC 75 mg et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre KARDEGIC 75 mg ?
3. Comment prendre KARDEGIC 75 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver KARDEGIC 75 mg ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE Kardegic 75 mg ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :  
ANTI-THROMBOTIQUE/INHIBITEUR DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

Ce médicament contient de l'aspirine. KARDEGIC 75 mg appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire.

sur solution buvable en sachet-dose

SANOFI

Prévenez votre médecin traitant, votre chirurgien, l'anesthésiste ou votre dentiste de la prise de ce médicament, dans le cas où une opération, même mineure, est envisagée.

### Autres médicaments et KARDEGIC 75 mg

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent.

**Vous ne devez pas prendre en même temps que KARDEGIC 75 mg d'autres médicaments contenant de l'aspirine ou un médicament de la même famille** (les AINS comme par exemple l'ibuprofène) sans en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

**L'association de ces médicaments à KARDEGIC 75 mg pourrait entraîner un surdosage** et augmenter ainsi le risque d'effets indésirables, notamment les saignements.

**Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez** afin de vous assurer que ces médicaments ne contiennent pas d'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien.

Sauf avis contraire de votre médecin, vous ne devez pas prendre KARDEGIC 75 mg en même temps que :

- un anticoagulant oral (médicament utilisé pour fluidifier le sang) si vous avez un antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- un autre médicament à base de ticlopidine ou clopidogrel (médicaments utilisés pour fluidifier le sang), sauf dans certaines situations où votre médecin pourra vous prescrire conjointement de l'aspirine et du clopidogrel,
- un autre médicament à base de benzboromarone ou probénécide (médicaments utilisés pour traiter la goutte),



41,30



Kétoprofène ..... 100 mg.  
Excipients: q.s.p ..... 1 suppositoire.

#### **FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION**

Suppositoires dosés à 100 mg, boîte de 12.

#### **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : ANTI-INFLAMMATOIRES, ANTIRHUMATIQUES NON STÉROÏDIENS**

#### **INDICATIONS**

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le Kétoprofène. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- en traitement de longue durée de :
- certains rhumatismes inflammatoires chroniques,

- certaines arthroses sévères ;
- en traitement de courte durée de :
- certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
- certaines inflammations des articulations dépôt de cristaux, telles que la goutte, oreilles aiguës d'arthrose, oreilles lombaires aiguës, oreilles aiguës liées à l'irritation d'un nerf, que les sciatiques, oreilles et œdèmes liés à un traumatisme.

#### **TRE-INDICATIONS**

médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie au kétoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- à partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse (cf. Grossesse et allaitement),
- antécédent d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- ulcère de l'estomac ou de l'intestin en cours,
- maladie grave du foie,
- maladie grave du rein,
- maladie grave du cœur,
- enfants de moins de 15 ans,
- inflammations ou saignements récents du rectum (contre-indication liée à la voie d'administration).



41,30



Kétoprofène ..... 100 mg.  
Excipients: q.s.p ..... 1 suppositoire.

#### **FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION**

Suppositoires dosés à 100 mg, boîte de 12.

#### **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : ANTI-INFLAMMATOIRES, ANTIRHUMATIQUES NON STÉROÏDIENS**

#### **INDICATIONS**

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le Kétoprofène. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- en traitement de longue durée de :
- certains rhumatismes inflammatoires chroniques,

- certaines arthroses sévères ;
- en traitement de courte durée de :
- certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
- certaines inflammations des articulations dépôt de cristaux, telles que la goutte, oreilles aiguës d'arthrose, oreilles lombaires aiguës, oreilles aiguës liées à l'irritation d'un nerf, que les sciatiques, oreilles et œdèmes liés à un traumatisme.

#### **TRE-INDICATIONS**

médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie au kétoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- à partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse (cf. Grossesse et allaitement),
- antécédent d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- ulcère de l'estomac ou de l'intestin en cours,
- maladie grave du foie,
- maladie grave du rein,
- maladie grave du cœur,
- enfants de moins de 15 ans,
- inflammations ou saignements récents du rectum (contre-indication liée à la voie d'administration).



41,30



Kétoprofène ..... 100 mg.  
Excipients: q.s.p ..... 1 suppositoire.

#### **FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION**

Suppositoires dosés à 100 mg, boîte de 12.

#### **CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : ANTI-INFLAMMATOIRES, ANTIRHUMATIQUES NON STÉROÏDIENS**

#### **INDICATIONS**

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le Kétoprofène. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- en traitement de longue durée de :
- certains rhumatismes inflammatoires chroniques,

- certaines arthroses sévères ;
- en traitement de courte durée de :
- certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë),
- certaines inflammations des articulations dépôt de cristaux, telles que la goutte, oreilles aiguës d'arthrose, oreilles lombaires aiguës, oreilles aiguës liées à l'irritation d'un nerf, que les sciatiques, oreilles et œdèmes liés à un traumatisme.

#### **TRE-INDICATIONS**

médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- antécédent d'allergie au kétoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- à partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse (cf. Grossesse et allaitement),
- antécédent d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- ulcère de l'estomac ou de l'intestin en cours,
- maladie grave du foie,
- maladie grave du rein,
- maladie grave du cœur,
- enfants de moins de 15 ans,
- inflammations ou saignements récents du rectum (contre-indication liée à la voie d'administration).

## ثلووكوفاج 1000 ملخ، قرص مغلف، علبة 30 قرصا كلوريدرات المتفورمين

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها قبل تناول هذا الدواء  
وخاصية المعلومات حول العلاج المحمض اللبناني المذكورة في الفرة  
تحذيرات وأحتياطات الاستعمال.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقرائتها من جديد.

- إذا كانت لديك أي إستهلاك آخر للمعلومات من الطبيب أو الم

- وصف هذا الدواء لك شخص

- لنفس الأعراض التي لديك

- إذا كنت تواجه أثراً جانبياً

- أيضاً على أي من الآثار الجانبية

- انظر الفرة 4.

في هذه النشرة

1- ما هو ثلووكوفاج 1000 م

2- ما هي المعلومات الواجب

مغلف؟

3- ما هي طريقة تناول ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

5- ما هي طرية حفظ ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

6- معلومات إضافية.

### 1- ما ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف العلاجي: يحتوي ثلووكوفاج على متفورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري.

يحتوي إلى فئة الأدوية المسماة بـ ميفاينيد.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها ثلووكوفاج؟

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الثلووكوز (السكر) المتواجد في الدم، يستخدم الجسم الثلووكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً.

عندما تكون مريضاً بالسكر، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكافية أو قد يحصل ليس قادرًا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الثلووكوز في الدم. يساعد ثلووكوفاج على تخفيض معدل الثلووكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول ثلووكوفاج على المدى الطويل ببساطة على العد من احتكار المضاعفات الصالحة

للسكري، يشير ثلووكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

يسعد المرضى البالغون تناول ثلووكوفاج وحدة أو مع أدوية أخرى ضد

يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول ثلووكوفاج

وحدة أو مع الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

لا تتناول أبداً ثلووكوفاج في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من ارتجاع الحساسيّة المفرطة تجاه المتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، انظر "على ماذا يحتوي ثلووكوفاج" في الفراغ 6، معلومات إضافية".

- إذا كنت تعاني من مشاكل عادنة للكلينين أو للبدم. تتفق التصنيف الكببيي أصغر من 45 مللي(القيقية).

- إذا كنت تعاني من سكري غير محكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم

ارتفاع راند ل معدل السكري في الدم، بصورة صارمة، غثيان، تقيّق، احتقاف، فقدان سرير الدم، خصائص كيتوسي، العلاج المحمض الكيتوسي إصابة تكتن في تراكم مواد في الدم تسمى "جسام كيتوئية" والذي من شأنه التسبب بسياسات سكري أو ارتفاع الأعراض التي ينبع خاص الالم في العدة، ت نفس سريري وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

- إذا فكت كمية كبيرة من الـ اجتفاف، مثلاً على إنر إسهال مستمر أو صارم، أو إذا تناولت مرات على الماء، انظر "على ماذا يحتوي ثلووكوفاج" في كلية من شأنها أن تعرضك لخطر العلاج المحمض اللبناني (انظر "يجب الانتباه إلى ثلووكوفاج" أدناه).

- إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القيصيات، التهاب

الكلينين، قد تؤدي إلى إصابة العادة إلى مشاكل في الكلينين من شأنها تعرضك لخطر العلاج المحمض اللبناني (انظر "يجب الانتباه إلى ثلووكوفاج" أدناه).

- إذا كنت تتناول علاجاً ضد المصوّر القلبي أو إذا عانيت من وقت قريب من

نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص دوران الدم مثل

LOT 191907  
EXP 11/2022  
PPV 28.000DH

رسير جداً يسمى  
ويزيد احتمال ظهور العلاج المحمض اللبناني أيضًا في حالة داء السكري الخارج عن السيطرة، أو الصيام الطويل أو استهلاك الكحول، أو فقدان المسوالت العضوية (الجلفاف)، الناجمة عن إسهال حاد أو التقيّق، أو مشاكل في وظيفة الكبد أو إصيارات طيبة تتسبّب في حرمان جزء من الجسم من الأكسجين مثل اضطرابات القلب الحادة الخطيرة، وعن المهم احترام تناول العلاج وقواعد الحمية الغذائية ومارسة نشاط بدني منتظم لأن هذا يقلل احتمال حدوث خصائص لبني.

قد يظهر العلاج المحمض بشكل بطيء، كما أن الماء قد لا تكون مزيرة مثل التقيّق والألم البطن مع تشنجات عضلية وإحساسات بالانزعاج والإعياء الشديد وصعوبة في التنفس، ومن بين الأعراض الأخرى، هناك انتفاخات برجة حرارة الجسم ونبض القلب، إذا وجدت جسلك في هذه الحالة قد تكون وجهاً إلىدخول المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللامع لأن العلاج المحمض اللبناني قد يؤدي إلى السبابات. توقف حالاً عن تناول ثلووكوفاج وقم بمراجعة الطبيب أو المستشفى القريب على الفور.

ثلووكوفاج وحدة لا يسبب انتفاخات معدل السكري في الدم، لكن، إذا تناولت ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي الشديدة وصعوبة في التنفس، ومن بين الأعراض الأخرى، هناك انتفاخات برجة حرارة الجسم ونبض القلب، إذا وجدت جسلك في هذه الحالة قد تؤدي إلى انتفاخات معدل السكري في الدم مثل المضادات المخاضر لعدل السكري في الدم، الإنسولين، المثلثيات، هناك خطأ انتفاخات معدل السكري في الدم، إذا أحست بارتفاع انتفاخات معدل السكري في الدم مثل الشعور بالدهون، الدهون، زيادة تنصيب المرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصريّة، معموق الترتكيز النهفي، فإن شرب أو أكل شيء، مما يحتوي على سكر قد تبيّن أن تساعدك أن تشعر بأن أقلّ.

تناول أو استعمال أدوية أخرى إذا كنت قادماً على قمر وعانياً من مادة مباعدة تحتوي على الاليود في دوائر المدموعة، مثل لقحمن بالأشعة أو بالسكن، عليك إيقاف تناول

ثلووكوفاج لفترة قبل هذه الفحوصات، و48 ساعة على الأقل بعد الفحوصات، انتفاخ قرفة "يجب استعمال الطبيب" ، إذا كنت تتناول ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أحد

الأدوية التالية، تحدثت قد يكون في الصورى التحريم غالباً بمعدل السكري في الدم لديك أو ضيبي جرعة ثلووكوفاج.

درمات الولوں استعمل لإخراج اجزاء من الجسم برفع افزار الولوں، محفزات المستقبلات بیناً 2- الآردنیا مثلاً سالبوتامول أو تیروپوتالین (التي

ستستخدم لعلاج الارج،

كوكستوك سيغيفود استعمل لعلاج عدة أمراض وخاصة التهابات الجلد، الحاجة أو الريء، ومحفظات ودية.

آدوية أخرى أخرى استعمل لعلاج العلاج السكري، إذا كنت تتناول أو تناولت من وقت قريب دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يمكن صرفها من دون وصفة الطبيب، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

الماكولات والمشروبات لا تستهلك المشروبات الكحولية في فترة تناول لها هذا الدواء، قد يزيد الكحول خطر العلاج المحمض اللبناني، خاصة إذا كنت تعاني من قصور كبدك أو من نقص الصوديوم.

الحمل والإرضاع خلال الحمل، أنت بحاجة إلى إنسولين لعلاج السكري الذي تعاني منه، عليك إعلام الطبيب إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنه حامل أو توقيعه.

يوصى بعدم استعمال هذا الدواء إذا كنت تتعرضين طفلك أو إذا كان لديك الولادة الثانية بارضاعه.

الرياضيون غير قادر قيادة السيارات واستخدام الآلات

## ثلووكوفاج 1000 ملخ، قرص مغلف، علبة 30 قرصا كلوريدرات المتفورمين

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها قبل تناول هذا الدواء  
وخاصية المعلومات حول العلاج المحمض اللبناني المذكورة في الفرة  
تحذيرات وأحتياطات الاستعمال.

- احتقان بهذه النشرة، فقد تحتاج لرجاستها من جديد.

- إذا كانت لديك أي إستهلاك آخر

المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

- وصف هذا الدواء لك شخصياً

لدي نفس الأعراض التي أدر

- إذا كنت تواجه أثراً جانبياً

أيضاً على أي من الآثار الم

أنتف الفرة 4.

في هذه النشرة

1- ما هو ثلووكوفاج 1000 م

2- ما هي المعلومات الواجب

مغلف؟

3- ما هي طريقة تناول ثلووكوفاج 1000 ملخ، قرص مغلف؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

5- ما هي طرفة حفظ ثلووكوفاج 1000 ملخ، قرص مغلف؟

6- معلومات إضافية.

### 1- ما ثلووكوفاج 1000 ملخ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف العلاجي: مثبط المتفورمين العلاجي.

يحتوي على مثبط المتفورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها ثلووكوفاج؟

الإنسونين هرمون ينبع من الغدة البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الثلووكوز

(السكر) المتواجد في الدم، يستخدم الجسم الثلووكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً.

عندما تكون مريضاً بالسكر، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكافية أو قد يحصل ليس قادرًا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح.

ويؤدي ذلك إلى انخفاض معدل السكر في الدم مثل المثبطة المحفزة لعمل السكري في الدم، مما يتسبب في خطر انخفاض

معدل السكر في الدم، إذا أحصلت على ارتفاع معدل الثلووكوز في الدم، يساعد ثلووكوفاج على

إذا كنت بالغالى وتعاني من وزن زائد، يسمح بذلك تناول ثلووكوفاج على

المدى الطويل ببساطة على الدخ من احتكار المضاعفات الصاحبة للسكرى، يبشر ثلووكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من

الوزن.

يسعد المرضى البالغون تناول ثلووكوفاج وحدة أو مع أدوية أخرى ضد

السكري (دواء قابلة للبلوغ أو إنسولين).

يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول ثلووكوفاج

وحدة أو مع الإنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ثلووكوفاج 1000 ملخ، قرص مغلف؟

لا تتناول أبداً ثلووكوفاج في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني من ارتجاع الحساسيه المفرطة تجاه المتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء، انظر "على ماذا يحتوي ثلووكوفاج" في

العنوان "معلومات إضافية".

إذا كنت تعاني من مشاكل عادنة للكلينين أو للأبد، تتفق التصفيه الكليني

أصغر من 45 ملليلتر (القيقة).

إذا كنت تعاني من سكري غير محكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم

ارتفاع زائد ل معدل السكر في الدم، بصورة صارمة، غثيان، تقيق، احتقاف،

فقدان سرير الدم، حموض كيتوسي، العلاج المحمض اللبناني إصابة تكتن في

تراكم مواد في الدم تسمى "جسام كيتوئي" والذي من شأنه التسبب بسياسات سكري أو ادراك، الأعراض التي يبني بوعي خاص أيام العدة، ت نفس سريري وعميق،

الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة غير معنادة.

إذا فكت كمية كبيرة من الماء (احتقاف)، مثلاً على إن إسهال مستمر أو

كلوية من شأنها أن تعرضك لخطر العلاج المحمض اللبناني (انظر "يجب الانتباه مع

ثلووكوفاج" أدناه).

إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القيصيات، التهاب

الكلينين، قد يؤدي إلى إصابة العادة إلى مشاكل في الكلينين من شأنها

تعرضك لخطر العلاج المحمض اللبناني (انظر "يجب الانتباه مع

ثلووكوفاج" أدناه).

إذا كنت تتناول علاجاً ضد المصوّر القلبى أو إذا عانيت من وقت قريب من

نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص دوران الدم مثل

LOT 191907  
EXP 11/2022  
PPV 28.000DH

صديدة، أو إذا كنت تعاني من مصوّرات في التقىن، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر العطانى التي انظر "يجب الانتباه مع

ثلووكوفاج" أدناه).

ب أو السكارى  
بريك الدموية

الفحوصات  
إلى علاج

ويزيد احتمال ظور العلاج المحمض اللبناني أيضًا في حالة داء السكري الخارج عن السيطرة، أو الصيام الطويل أو استهلاك الكحول، أو فقدان المواتيل العصبية (الجلفاف) الناجمة عن إسهال حاد أو التقيق، أو مشاكل في وظيفة الكبد أو إصباب طيبة تتسبّب في حرمان جزء من الجسم من الأكسجين مثل اضطراب القلب الحاد الخطير، وعن المهم احترام تناول العلاج وقواعد الحمية الغذائية ومارسة نشاط بدني منتظم لأن هذا يقلل احتمال حدوث حموض اثنين.

قد يظهر العلاج المحمض بشكل بطيء، كما أن الماء قد لا تكون مزيرة مثل التقيّق والألم البطن مع تشنجات عضلية وإحساسات من الاعتزاع والإيماء الشديد وصعوبة في التنفس، ومن بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونبض القلب، إذا وجدت جسلك في هذه الحالة قد تكون بمحاجة إلى دخول المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللاملاع لأن العلاج المحمض اللبناني قد يؤدي إلى السمات، توقف حالي عن تناول ثلووكوفاج وقم بمراجعة الطبيب أو استشارة الطبيب أو القرب على الفور.

ثلووكوفاج وحدة لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم، لكن، إذا تناولت ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي الشديد وصعوبة في التنفس، ومن بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونبض القلب، إذا وجدت جسلك في هذه الحالة قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم مثل المثبطة المحفزة لعمل السكري، لذا يجب انتظار تناول ثلووكوفاج في الدم، مما يتسبب في خطر انخفاض معدل السكر في الدم، الإنسولين، المثبطة المحفزة لعمل السكري، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم، إذا أحصلت على ارتفاع معدل السكر في الدم، مما يتسبب في خطر انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالدهون، الدهون، زيادة تصبب المرق، توارث نظرة القلب، اضطرابات بصرية، مفعول الترتكيز الناهي، فإن شرب أو أكل شيء، مما يحتوي على سكر قد تبيّن أن تساعدك أن تشعر بأن أفضل.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت قادماً على قرآن وعانياً من مادة مباهنة تحتوي على اليدوى في

دورك الدموية، مثل لفحش الأشعة أو بالسكن، عليك إيقاف تناول ثلووكوفاج لفترة قبل هذه الفحوصات، و48 ساعة على الأقل بعد الفحص.

إذا كنت إعاد العلاج، إذا كنت تتناول ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أحد الأدوية التالية، تحدثت قد يكون ذلك بسبب ارتفاع درجة حرارة من الماء، على ذلك الأدوية.

إذا كنت تتناول ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أحد المصوّر القلبى أو تيروباتالين (التي

مخفّرات المثبطة المحفزة لعمل السكري) أو تيروباتالين (التي

ستستخدم لعلاج البرىء)،

وكوكستوك سيغيفود يستعمل لعلاج عدة أمراض وخاصة التهابات الجلد، الحكة أو البرىء، ومحفّات ودية.

إذا كنت تتناول أو استعمل لعلاج العلاج المحمض، إذا كنت تعاني من قصور كبدى أو

التي يمكن صرفها من دون وصفة الطبيب، عليك إعادة العلاج الطبيب أو الصيدلى به.

الماكولات والمشروبات

لا تستهلك المشروبات الكحولية في فترة تناول لها الدواء، قد يزيد

الكتول خطر العلاج المحمض اللبناني، خاصة إذا كنت تعاني من قصور كبدى أو

من نقص التقىن، ينطبق ذلك أيضًا على الأدوية المحتوية على كحول.

الحمل والإرضاخ

خلال فترة الحمل، أنت بمحاجة إلى إنسولين لعلاج السكري الذي تعاني منه، عليك إعادة العلاج الطبيب إذا كنت حاملًا أو تعتقدين أنه حامل أو توقعين

الحمل، الذي يستطع تعيين ملائج.

يوصى بعدم استعمال هذا الدواء إذا كنت تتعرضين طفلك أو إذا كان

لديك الولادة بالرضاعة.

الرياضيون

غير وارد

قيادة السيارات واستخدام الآلات

## ثلووكوفاج 1000 ملخ، قرص مغلف، علبة 30 قرصا كلوريدرات المتفورمين

يجب قراءة هذه النشرة بكمالها قبل تناول هذا الدواء  
وخاصية المعلومات حول العلاج المحمض اللبناني المذكورة في الفرة  
تحذيرات وأحتياطات الاستعمال.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقرائتها من جديد.

- إذا كانت لديك أي إستهلاك آخر للمعلومات من الطبيب أو الم

- وصف هذا الدواء لك شخص

- لنفس الأعراض التي لديك

- إذا كنت تواجه أثراً جانبياً

- أيضاً على أي من الآثار الجانبية

- انظر الفرة 4.

في هذه النشرة

1- ما هو ثلووكوفاج 1000 م

2- ما هي المعلومات الواجب

مغلف؟

3- ما هي طريقة تناول ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

5- ما هي طرية حفظ ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

6- معلومات إضافية.

### 1- ما ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف العلاجي: مثبط المتفورمين العلاجي.

يحتوي على مادة متفورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها ثلووكوفاج؟

الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الثلووكوز

(السكر) المتواجد في الدم، يستخدم الجسم الثلووكوز لإنتاج الطاقة أو

يختزن مريضاً بالسكر، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكافية

الصحيح، يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل الثلووكوز في الدم، يساعد ثلووكوفاج

على إنخفاض معدل الثلووكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن

من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغالى وتعاني من وزن زائد، سيساعد كذلك تناول ثلووكوفاج على

المدى الطويل بالساعة على الدم من احتكار المضاعفات الصاحبة

السكري، يشترك ثلووكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من

الوزن.

يستخدم المرضى البالغون تناول ثلووكوفاج وحدة أو مع أدوية أخرى ضد

السكري (دواء قابله لليل أو إنسولين).

يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول ثلووكوفاج

وحدة أو مع إنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ثلووكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

لا تتناول أبداً ثلووكوفاج في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من ارتجاع حامضي المفرطة تجاه المتفورمين أو أحد

المكونات الأخرى لهذا الدواء، انظر "على ماذا يحتوي ثلووكوفاج" في

الفقرة 6- معلومات إضافية.

- إذا كنت تعاني من مشاكل عادنة للكلينين أو للأبد، تتفق التصفية الكليني

أصغر من 45 مل (القيقة).

- إذا كنت تعاني من سكري غير محكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم

ارتفاع زائد ل معدل السكري في الدم، بصورة صارمة، غثيان، تقيؤ، احتقاف،

فقدان سرير الدم، حموض كيتوسي، العلاج المحمض الكيتوسي إصابة تكتن في

تراكم مواد في الدم تسمى "جسام كيتوئية" والذي من شأنه التسبب بسياسات

سكري أوال، الأعراض التي ينبع خاص اللم في العدة، ت نفس سريري وعميق،

الرغبة في التبول، نفس ذو رائحة فاكهة غير عادة.

- إذا فكت كمية كبيرة من الــ (الجلقا)، مثلاً على إنـ إسهال مستمر أو

صائم، أو إذا تقيأت مرات على الــ، قد يؤدي الاحتفاظ إلى مشاكل

كلوية من شأنها أن تعرضك لخطر العلاج المحمض اللبناني (انظر "يجب الانتباه مع

ثلووكوفاج" أدناه).

- إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القيصيات، التهاب

الكلينين، قد تؤدي إلى إصابة العلاج المحمض اللبناني (انظر "يجب الانتباه مع

ثلووكوفاج" أدناه).

- إذا كنت تتناول علاجاً ضد المصوّر القلبي أو إذا عانيت من وقت قريب من

نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص دوران الدم مثل

LOT 191907  
EXP 11/2022  
PPV 28.000DH

صديدة، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأكسجة بالклينين، مما يعرضك لخطر الحموض التي انظر "يجب الانتباه مع

ثلووكوفاج" أدناه).

ب أو السكار،  
بريك الدموية،  
الفحوصات،  
إلى علاج

ـ رجاءً، إذا كنت تعاني من مشكل في وظيفة الكلينين ويزيد احتمال ظهر العلاج المحمض اللبناني أيضاً في حالة داء السكري الخارج عن السيطرة، أو الصيام الطويل أو استهلاك الكحول، أو فقدان المسوالت العصبية (الجلقا)، الناجمة عن إسهال حاد أو التقيؤ، أو مشاكل في وظيفة الكبد أو إصوات طيبة تتسبّب في حرمان جزء من الجسم من الكلينين مثل القلب، القلب الحاد الخطير، وعن المهم احترام تناول العلاج وقواعد الحمية الغذائية ومارسة نشاط بدني منتظم لأن هذا يقلل احتمال حدوث حموض اثنين.

ـ قد يظهر العلاج المحمض بشكل بطيء، كما أن الماء قد لا تكون مزيرة مثل التقيؤ والألم البطن مع تشنجات عضلية وإحساسات من الاعتزاع والإيماء الشديد وصعوبة في التنفس، ومن بين الأعراض الأخرى، هناك انخفاض درجة حرارة الجسم ونبض القلب، إذا وجدت جسلك في هذه الحالة قد تكون وجهاً إلى دخول المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللامع لأن العلاج المحمض اللبناني قد يؤدي إلى السبابات، توقف حالي عن تناول ثلووكوفاج وقم بمراجعة الطبيب أو المستشفى القريب على الفور.

ـ ثلووكوفاج وحدة لا يسبب انخفاض معدل السكري في الدم، لكن، إذا تناولت ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكري في الدم مثل سلبيات المحفوظات لتعديل السكري في الدم، الإنسولين، الملتقطين، هناك خطأ انتهاز لتعديل السكري في الدم، إذا أحست بارتفاع انخفاض معدل السكري في الدم، إذا أحست بارتفاع انخفاض معدل السكري في الدم مثل الشعور بالدوار، الدهون، البوح، زيادة تصبّب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، معيوبية الترتكز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء، ما يحتوي على سكر قد تبيّن أن تساعدك أن تشعر بأن أفضل.

ـ تناول أو استعمال أدوية أخرى إذا كنت قادماً على قمر وعانياً من مادة مباعدة تحتوي على اليدوكا فيدرووكاف الدموية، مثل لقحمن بالأشعة أو بالسكان، عليك إيقاف تناول

ـ ثلووكوفاج لفترة قبل هذه الفحوصات، و48 ساعة على الأقل بعد الخصم انتظار قرفة "يجب استعمال الطبيب" أعلاه.

ـ عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول ثلووكوفاج في نفس الوقت مع أحد الأدوية الآتية، تحدثت قد يكون ذلك بسبب انتشار المرض في الدم، في نفس الوقت مع أحد

ـ درمات الولوں، تستعمل إخراج الولوں، محفزات المستقبلات بينا 2- الأدرينية مثل سالبوتامول أو تيروبوتالين (التي

ـ تستخدم لعلاج الــ، كوكستوك سيغيفود يستعمل لعلاج عدة أمراض وخاصة التهابات الجلد،

ـ العجاجة أو الــ، ومحفاظات ودية، أدوية أخرى تستعمل لعلاج العلاج المحمض،

ـ إذا كنت تناول أو تناولت من وقت قريب دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يمكن صرفها من دون وصفة الطبيب، عليك إعلام الطبيب أولاً

ـ الصيدلي به.

ـ الماكولات والمشروبات لا تستهلك المشروبات الكحولية في فترة تناول لها هذا الدواء، قد يزيد

ـ الكحول خطر العلاج المحمض اللبناني، خاصة إذا كنت تعاني من قصور كبدية أو من نقص الصنفية، ينطبق ذلك أيضاً على الأدوية المحتوية على كحول.

ـ الحمل والإرضاخ خلال أيام الحمل، أنت بحاجة إلى إنسولين لعلاج السكري الذي تعاني منه، عليك إعلام الطبيب إذا كنت حاماً أو تعتقدين أنه حامل أو توقعين

ـ الحمل، الذي يستطيع تعيين ملائج.

ـ يوصي بعدم استعمال هذا الدواء إذا كنت تتعرضين طفلك أو إذا كان لديك الــ التي يدار بها ضراعة.

ـ الــ، غير قادر على الــ، غير قادر على الــ، قيادة السيارات واستخدام الآلات

ପାତ୍ର ଗୁଣିତା  
ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତି ଏବଂ  
ପାତ୍ରମଧ୍ୟରେ

1-747 በዚህ የሚከተሉትን ንግድ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ ተስፋይ

କୁଣ୍ଡଳ ପାତାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Digitized by srujanika@gmail.com

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇମାତ୍ର ପାଇଁ କାହିଁ ଏକାକିଳି କାହିଁ ଏକାକିଳି

ଶ୍ରୀ କାନ୍ତିମାଳା

**MERCK**

ପ୍ରକାଶିତ ଦେଖିବାରେ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରକାରୀ

1-747 ተዕናጌን የሚከተሉት አገልግሎት ስለመስጠት ይዘሩ ይችላል

Digitized by srujanika@gmail.com

۴۵۰۰ جی ۱۷۰۰ جی ۱۶۰۰ جی ۱۵۰۰ جی ۱۴۰۰ جی ۱۳۰۰ جی ۱۲۰۰ جی ۱۱۰۰ جی ۱۰۰۰ جی ۹۰۰ جی ۸۰۰ جی ۷۰۰ جی ۶۰۰ جی ۵۰۰ جی ۴۰۰ جی ۳۰۰ جی ۲۰۰ جی ۱۰۰ جی ۵۰ جی ۲۰ جی ۱۰ جی ۵ جی ۲ جی ۱ جی

לְעֵינָיו כִּי כַּאֲמָרָה בְּבָשָׂר וְבָשָׂר בְּבָשָׂר וְבָשָׂר בְּבָשָׂר

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ? ତାହାର, ତାଙ୍କ ଦିନମୁଣ୍ଡ ।

କୁଣ୍ଡଳ ପାଇଁ

Digitized by srujanika@gmail.com



ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରକାରୀ

1-747 ተዕናጌን የሚከተሉት አገልግሎት ስለመስጠት ይዘሩ ይችላል

Digitized by srujanika@gmail.com

۴۰۰۰ میلیون دلار است. این میزان بسیار زیاد است و از این نظر این کشور را می‌توان از میان کشورهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، در رتبه اول قرار داد.

לְעֵינָיו כִּי כַּאֲמָרָה בְּבָשָׂר וְבָשָׂר בְּבָשָׂר וְבָשָׂר בְּבָשָׂר

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ? ତାହାର, ତାଙ୍କ ଦିନମୁଣ୍ଡ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ପ୍ରକାଶିତ ଦେଖିବାରେ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



لِيفُوتِرُوكْسٌ<sup>٤</sup> قرص قابل للقطع

لفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

هامات بالنسبة لك



ض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر  
ما عسى ي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

يرجى قراءة هذه النشرة بكمالها قبل استخدامها

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك

- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك،
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صبّاح

انظر الفقرة 4

تحتوى هذه النشرة:

- 1- ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
  - 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
  - 3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
  - 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
  - 5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
  - 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

لِيفُوتِرُوكْسٌ<sup>٤</sup> قرص قابل للقطع

لفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

هامات بالنسبة لك



ض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر  
ما عسى ي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

بحق ائمة هذه النشوة يكاملها بانتهاء قيام استعمال

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك

- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك،
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدلي.

انظر الفقرة 4

تحتوى هذه النشرة:

- 1- ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
  - 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
  - 3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
  - 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
  - 5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع؟
  - 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

لِيفُوتِرُوكس® قرص قابل للقطع

لفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

هامات بالنسبة لك



ض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر  
ما عسى ي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشر

بحق ائمة هذه النشارة كما امروا بانتقام قاتل استعمال

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك

- وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك،
- إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدلي.

انظر الفقرة 4

تحتوى هذه النشرة:

- 1- ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
  - 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
  - 3- ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
  - 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
  - 5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
  - 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى