

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19-0048089

Optique 64431 Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 676 Société :

Actif Pensionné(e) Autre : Yalla mawed

Nom & Prénom : ELOUAR Didihi Date de naissance : 1938

Adresse :

Tél. : 06 38 38 73 60 Total des frais engagés : 120,30 Dhs



Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 16/03/2021

Nom et prénom du malade : Roudali Smail Age : 82

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diphile - as ilme

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CAAS Le : 24.03.2021

Signature de l'adhérent(e) : Elouar

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/08/2021			€ 8500,00	Dr. Nabil Spécialiste en Finance Al Olaq 63, Oum Rabia Télé: 0522 89 70 31

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/02/2021	4000,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU
DEVIS

Dr Khadija CHERKAOUI ZAHOUANI

ENDOCRINOLOGIE - DIABÉTOLOGIE OBÉSITÉ - NUTRITION

Ex Médecin Chef du Centre Régional de Diabétologie

Sur rendez-vous

Casablanca, le :

الدكتورة خديجة الشرقاوى زهوانى

الختصاصية أمراض السكري وأمراض الغدد السمنة - التغدية

بالموعد



١٦ - ٢ - ١٩٦١
بالموعظ

Bovidae; Saadieh

200 Résidence Al Ofok Bd. Oum Rabii - Oulfa - Hay Hassani - Casablanca Sur Rendez-vous

العافية - 100 إقامة الأفق شارع أم البو - الألفة - الدار البيضاء - Tél : 05 22 89 79 34 - GSM : 06 31 89 60 35

الهاتف: ٠٥٢٢٨٩٧٩٣٤ - GSM: ٠٦٣١٨٩٦٠٣٥ - إقامة الأفق سارع أم الربيع - الدار البيضاء - المغرب Tel: 05 22 89 79 34 - GSM: 06 31 89 60 35



G
C

125,00

- Ce médicament vous a-t-il permis de vous sentir mieux ?

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine.
Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
 - Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

EST-IL OVAIRE ?
Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
 - en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER Co-Amarel

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

l'insuline).

- si vous souffrez d'acidocétose diabétique,
si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou
au chlorhydrate de metformine, ou à l'un des autres
composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres
sulfonluryées, aux biguanides,
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement
des reins,
si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un
choc,
si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
si vous consommez de l'alcool de manière excessive
(intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation
de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre
traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant
quelques jours après l'examen.
si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes
affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surrenale.

rendre des précautions particulières avec Co-Amarel :

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel et s'en tenir à l'heure respecter consciencieusement les prescriptions de votre médecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le régime alimentaire et l'activité physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie

au cours des premières semaines de traitement, le risque

G
C

125,00

- Ce médicament vous a-t-il permis de vous sentir mieux ?

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine. Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
 - Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
 - en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER Co-Amarel

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

l'insuline)

- si vous souffrez d'acidocétose diabétique,
si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou
au chlorhydrate de metformine, ou à l'un des autres
composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres
sulfonlurées, aux biguanides,
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement
des reins,
si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un
choc,
si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
si vous consommez de l'alcool de manière excessive
(intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation
de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre
traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant
quelques jours après l'examen.
si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes
affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surrenale

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel :

Prenez des précautions particulières avec Co-Amarel. Veuillez respecter consciencieusement les prescriptions de votre médecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le régime alimentaire et l'activité physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hyperglycémie

au cours des premières semaines de traitement, le risque

6
C

125,00

- Ce médicament vous a-t-il permis de vous sentir mieux ?

Co-Amarel 2mg/500mg, comprimé pelliculé

- Les substances actives sont le glimépiride et le chlorhydrate de metformine.
Un comprimé contient 2 mg de glimépiride et 500 mg de chlorhydrate de metformine.
 - Les autres composants sont : lactose, carboxyméthylamidon, povidone K 30, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylène glycol 6000, dioxyde de titane (E 171), cire de carnauba, eau purifiée.

1. QU'EST-CE QUE Co-Amarel ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

EST-IL OVAIRE ?
Co-Amarel se présente sous forme de comprimés pelliculés blancs de forme ovale. Boîte de 30 comprimés.

Co-Amarel est un antidiabétique oral.

Il est préconisé dans le traitement du diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline (diabète de type 2), en complément d'un régime alimentaire et d'exercice physique :

- lorsqu'un traitement par monothérapie à base de glimépiride ou de metformine n'est pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique,
 - en remplacement de la bithérapie associant glimépiride et metformine.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER Co-Amarel

N'utilisez jamais Co-Amarel dans les cas suivants :

l'insuline).

- si vous souffrez d'acidocétose diabétique,
si vous êtes hypersensible (allergique) au glimépiride ou
au chlorhydrate de metformine, ou à l'un des autres
composants de Co-Amarel, aux sulfamides et autres
sulfonluryées, aux biguanides,
si vous êtes enceinte ou si vous allaitez votre enfant,
si vous avez déjà souffert d'acidose lactique,
si vous souffrez d'une maladie ou d'un dysfonctionnement
des reins,
si vous souffrez d'insuffisance cardiaque,
si vous avez eu récemment un infarctus du myocarde, un
choc,
si vous souffrez d'une atteinte hépatique grave,
si vous consommez de l'alcool de manière excessive
(intoxication alcoolique aiguë, alcoolisme),
si vous souffrez d'une infection sévère, de déshydratation,
en cas d'exploration radiologique nécessitant l'utilisation
de produits de contraste iodés. Vous devrez arrêter votre
traitement Co-Amarel au moment de l'examen et pendant
quelques jours après l'examen.
si vous ne vous alimentez pas correctement, si vous êtes
affaibli ou souffrez d'insuffisance hypophysaire ou surrenale.

rendre des précautions particulières avec Co-Amarel :

Prendre des précautions particulières avec Co-Amarel et s'en tenir à l'heure respecter consciencieusement les prescriptions de votre médecin pour ce qui concerne les doses de Co-Amarel, la surveillance (analyse de sang et d'urine), le régime alimentaire et l'activité physique (travail et exercice physique).

MISES EN GARDE

Hypoglycémie

au cours des premières semaines de traitement, le risque

RYZODEG®
فلكس تاتش®

8-9564-73-260-1

1 x 3 ml
Ryzodeg® FlexTouch®
100 unités/ml
Solution injectable en stylo prérempli
Insuline gladiucide/insuline asparte
PPV : 273,00 DHS

A standard linear barcode is located in the bottom right corner of the page. It consists of vertical black lines of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification purposes.

لایزنسیون^{۱۰}، فلکل^{۱۱} تالیفات^{۱۲}، نووفوین^{۱۳} و نوفوتوپسی^{۱۴} می‌خواهند ملکه^{۱۵} نووفو نورسیلک^{۱۶} را از این‌جا^{۱۷} بگیرند. ملکه^{۱۸} ملکه^{۱۹} نووفو نورسیلک^{۲۰} را از این‌جا^{۲۱} بگیرد.

novo nordisk®

8-9564-73-010-1

The logo for Novo Nordisk, featuring a stylized blue figure of a person standing and holding a circular arrow.



RYZODEC® فلکس تائش ®

三

8-9564-73-260-1

1x3ml
Ryzodeg® FlexTouch®
100 unités/ml
Solution injectable en stylo prérempli
Insuline gladiouc/insuline asparte
PPV : 273,00 DHS

A standard linear barcode is located at the top of the page, consisting of vertical black bars of varying widths on a white background.

لایزرنویز[®]، فائلن[®] تالش[®]، نووفوین[®]
نووفوینریست[®] همی علامات
تجاریه مملوکه للسازه نووفو نورسیلک شرکت[®]
الندرال[®].
نوفر نورسیلک شرکت[®] 2019

novo nordisk®

8-9564-73-010-1

novo nordisk®



RYZODEG®
فلكس تاتش®

8-9564-73-260-1

1 x 3 ml
Ryzodeg® FlexTouch®
100 unités/ml
Solution injectable en stylo prérempli
Insuline gladiucide/insuline asparte
PPV : 273,00 DHS

A standard linear barcode is located in the bottom right corner of the page. It consists of vertical black lines of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification purposes.

لایزنسیون^{۱۰}، فلکل^{۱۱} تالیفات^{۱۲}، نووفوین^{۱۳} و نوفوتوپیس^{۱۴} همی علامات تجاری مملوک است که تأثیر نوفرنسلک شد^{۱۵}، اندیمان^{۱۶}.

novo nordisk®

8-9564-73-010-1

The logo for Novo Nordisk, featuring a stylized blue and white graphic of a person in a dynamic pose, with the company name "novo nordisk" in a blue sans-serif font to the left and a registered trademark symbol (®) to the right.



RYZODEG®
فلكس تاتش®

8-9564-73-260-1

1 x 3 ml
Ryzodeg® FlexTouch®
100 unités/ml
Solution injectable en stylo prérempli
Insuline gladiucide/insuline asparte
PPV : 273,00 DHS

A standard linear barcode is located in the bottom right corner of the page. It consists of vertical black lines of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification purposes.

لایزنسیون^{۱۰}، فلکل^{۱۱} تالیث^{۱۲}، نوفوغین^{۱۳} و نوفوغون^{۱۴} مطابق^{۱۵} با مفهوم^{۱۶} نوفوغ نورسیلک شد^{۱۷}، این نتیجه را می‌توان^{۱۸} مطالعات^{۱۹} نوفوغون^{۲۰} و نوفوغون^{۲۱} می‌داند.

novo nordisk®

8-9564-73-010-1

The logo for Novo Nordisk, featuring a stylized blue figure of a person standing and holding a circular arrow.



RYZODEG®
فلكس تاتش®

8-9564-73-260-1

1 x 3 ml
Ryzodeg® FlexTouch®
100 unités/ml
Solution injectable en stylo prérempli
Insuline gladiucide/insuline asparte
PPV : 273,00 DHS

A standard linear barcode is located in the bottom right corner of the page. It consists of vertical black lines of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification purposes.

لایزنسیون^{۱۰}، فلکل^{۱۱} تالیث^{۱۲}، نوفوغین^{۱۳} و نوفوغون^{۱۴} معمولی ملکیت^{۱۵} هی عالمات^{۱۶} نوفوغ نویسندگ^{۱۷} شد^{۱۸}، اندیمان^{۱۹}.

novo nordisk®

8-9564-73-010-1

The logo for Novo Nordisk, featuring a stylized blue and white graphic of a person in a dynamic pose, with the company name "novo nordisk" in a blue sans-serif font to the left and a registered trademark symbol (®) to the right.



RYZODEG®
فلكس تاتش®

8-9564-73-260-1

1 x 3 ml
Ryzodeg® FlexTouch®
100 unités/ml
Solution injectable en stylo prérempli
Insuline gladiucide/insuline asparte
PPV : 273,00 DHS

A standard linear barcode is located at the bottom of the page, consisting of vertical black lines of varying widths on a white background. The barcode is used for tracking and identification purposes.

لایزنسیون^{۱۰}، فایل تالیف^{۱۱}، نووفوین^{۱۲} و توپ توپسی^{۱۳} همی توانند نویسندگ شرایم^{۱۴} تجزیه و مطابق کنند. این اتفاق ممکن است در این مقاله مذکور شود.

novo nordisk®

8-9564-73-010-1

The logo for Novo Nordisk, featuring a stylized blue and white graphic of a person in a dynamic pose, with the company name "novo nordisk" in a blue sans-serif font to the left and a registered trademark symbol (®) to the right.

