

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie

N° W19-512985

65332

A

Maladie

Dentaire

Optique

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6427 Société : LA KADIA

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : LAMAIZI MOHAMMED

Date de naissance : 18/09/1963

Adresse : Sabkell

Tél. : 0666 10 84 20 Total des frais engagés : 4104,50 DHS

Cadre réservé au Médecin

Docteur KADIANI  
CARDIOLOGUE  
man Center Rue Arrachid Med Etg 7 N°2  
(Angle Av des FAR) - CASABLANCA 20110  
Tél: 05 22 31 53 48

Date de consultation : 01/10/2021

Nom et prénom du malade : LAMAIZI MOHAMMED Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfan

Nature de la maladie : Cardiopathie ischémique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attédocteur conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je  
avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : casab

Signature de l'adhérent(e) : ACCUEIL

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes*	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/02/2021	Gt. ECG		350 Dhs	INP : 091210484 Docteur KARIM ANIS CARDIOLOGUE Imap Doctor Rue Arrahia Med Etg 7 N°2 (Angle Av des FAR) - CASABLANCA 20110 (Tél): 05 22 31 53 48

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Ouled Ziane Dr. ASK INPE : 0522 852 955 Bd El Hida 1260 - Ain Chicha Casablanca - Tél : 0522 852 955 ICE : 0004954000000100	01/02/21	2497,50

### ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES MANDARONA 679, boulevard de l'Industrie 20400 Casablanca Tél: 0522 52 80 88 - Fax: 0522 21 02 41	17/03/21	15920 Dhs	1257,80

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bila

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
<img alt="Diagram of upper and lower dental arches showing numbered teeth from 1 to 8 on each side. Arrows indicate mesial (M), distal (D), buccal (B), and			

# Docteur Kadi Aris CARDIOLOGUE!

Diplômé de la Faculté de Médecine de  
L'université d'état Lomonossov de Moscou



Ex-interne du Centre de Recherche  
Cardiovasculaire Bakulev

الدكتور قاضي أنيس  
أمراض القلب و الشرايين

خريج كلية الطب بجامعة

موسسو الحكومية

و الأوعية الدموية باكولف

خريج مركز أبحاث القلب

## Cabinet d'Explorations Cardio-Vasculaire

Casablanca, Le ..... 01/02/2021 ..... الدار البيضاء في

## ORDONNANCE

Mme / Mr.

MR LAMAIZI MOHAMMED

270,00 X 4

- Coplavix 75mg/100mg  
1 comprimé, matin, pendant 3 mois

34,60 X 2

- Lasilix 40 mg  
1/2 comprimé, matin, pendant 3 mois

50,70 X 2

- Cardensiel 2,5 mg  
1/2 comprimé, matin, soir, pendant 3 mois

Pharmacie : ASRI

Tel: 0522 Tareg 40 mg

Or : ASRI 1 comprimé, matin, pendant 3 mois

82,10 X 1

- Inexium 20 mg  
1 comprimé, midi, pendant 1 mois

- Tardyferon 80 mg  
1 comprimé, matin, midi, pendant 2 mois

79,00 X 5

- Tahor 10 mg  
1 comprimé, soir, pendant 3 mois

89,70 X 2

- Cordarone 200mg  
1 comprimé, matin, arrêt samedi/dimanche

2497,50

Pharmacie Ouled Ziane  
Bd. El Fida 1260 - Tel: 0522 852 959  
ICE: 0032330000015

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2

CASABLANCA 20110

Tel: 0522 213 347

Fax: 0522 213 347

Dr. KADI ARIS

Cardiologue

Arrachid Med 7 N°2



Cardensiel 2,5mg B30  
PPV: 50,70 DH

7863161938



Cardensiel 2,5mg B30 30  
PPV: 50,70 DH

7863161938



611800103032 3  
TAREG 40 mg

28 comprimés pelliculés,  
PPV: 98.40 DH



611800103032 3  
TAREG 40 mg

28 comprimés pelliculés  
PPV: 98.40 DH



611800103032 3  
TAREG 40 mg

28 comprimés pelliculés  
PPV: 98.40 DH



611800103032 3  
TAREG 40 mg

28 comprimés pelliculés  
PPV: 98.40 DH

TAHOR 10MG 28 CPS

P.P.V : 79DH00

6118000250340

Laboratoires Pfizer S.A.  
Emballage scellé.

Ne pas utiliser si la boîte a été ouverte.

PELLICULES  
COMPRIME

TAHOR 10MG 28 CPS

P.P.V : 79DH00

6118000250340

Emballage scellé.  
Ne pas utiliser si la boîte a été ouverte.

SELLÉS

TAHOR 10MG 28 CPS

P.P.V : 79DH00

6118000250340

Emballage scellé.  
Ne pas utiliser si la boîte a été ouverte.

Laboratoires  
Pfizer S.A.

Laboratoires  
Pfizer S.A.

Laboratoires  
Pfizer S.A.



611800103032 3  
TAREG 40 mg

28 comprimés pelliculés  
PPV: 98.40 DH



611800103032 3  
TAREG 40 mg

28 comprimés pelliculés  
PPV: 98.40 DH

UT. AV. : 10 12 P.P.V  
79 00

LOT N° : 1282907  
7900

# Cordarone® 200 mg

Chlorhydrate d'amiodarone



Comprimé sécable

SANOFI

89,70

sé  
•

- Si vous souffrez de thyroïdite (maladie de la glande thyroïde).
- Si vous présentez certains troubles du rythme et/ou de la conduction cardiaque.
- Si votre rythme cardiaque est trop lent.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois.
- Si vous allaitez.
- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec Cordarone n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe « Prise d'autres médicaments »).

Faites attention avec CORDARONE 200 mg, comprimé sécable

#### Avertissements et précautions

N'interrompez jamais ce traitement sans l'avis de votre médecin.

#### Chez l'enfant :

La tolérance et l'efficacité de ce médicament ne sont pas connues.

#### Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou d'un défibrillateur cardiaque implantable :

Vous devrez faire vérifier par votre médecin son bon fonctionnement avant et à plusieurs reprises après le début du traitement, ainsi que lors de toute modification de la posologie.

#### Pendant le traitement :

##### Prévenez votre médecin :

- Si votre rythme cardiaque est à nouveau trop rapide ou anormalement lent,
- Si vous vous sentez anormalement essoufflé,
- Si vous avez des difficultés à respirer,
- Si vous présentez une toux sèche, isolée ou associée à une altération de votre état de santé,
- Si vous avez de la fièvre, ou êtes fatigué, de façon inexpliquée, ou prolongée,
- Si vous avez la diarrhée,

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### ANTIARYTHMIQUE CLASSE III

Ce médicament est indiqué dans la prévention et le traitement de certains troubles du rythme cardiaque.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais CORDARONE 200 mg, comprimé**

# Cordarone® 200 mg

Chlorhydrate d'amiodarone



Comprimé sécable

SANOFI

89,70

sé

:

.

- Si vous souffrez de thyroïdite (maladie de la glande thyroïde).
- Si vous présentez certains troubles du rythme et/ou de la conduction cardiaque.
- Si votre rythme cardiaque est trop lent.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois.
- Si vous allaitez.
- Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec Cordarone n'est pas contre-indiquée (voir le paragraphe « Prise d'autres médicaments »).

Faites attention avec CORDARONE 200 mg, comprimé sécable

#### Avertissements et précautions

N'interrompez jamais ce traitement sans l'avis de votre médecin.

#### Chez l'enfant :

La tolérance et l'efficacité de ce médicament ne sont pas connues.

#### Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou d'un défibrillateur cardiaque implantable :

Vous devrez faire vérifier par votre médecin son bon fonctionnement avant et à plusieurs reprises après le début du traitement, ainsi que lors de toute modification de la posologie.

#### Pendant le traitement :

##### Prévenez votre médecin :

- Si votre rythme cardiaque est à nouveau trop rapide ou anormalement lent,
- Si vous vous sentez anormalement essoufflé,
- Si vous avez des difficultés à respirer,
- Si vous présentez une toux sèche, isolée ou associée à une altération de votre état de santé,
- Si vous avez de la fièvre, ou êtes fatigué, de façon inexpliquée, ou prolongée,
- Si vous avez la diarrhée,

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. QU'EST-CE QUE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### ANTIARYTHMIQUE CLASSE III

Ce médicament est indiqué dans la prévention et le traitement de certains troubles du rythme cardiaque.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORDARONE 200 mg, comprimé sécable ?

Si votre médecin vous a déjà dit que vous présentiez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais CORDARONE 200 mg, comprimé**

# **Lasix® 40 mg**

# **Lasix® 20 mg/2 ml**

Furosemide

SANOFI

L01 :20E017  
PER.:05 2024  
LASILIX 40MG  
20CP SEC  
P.P.V :34DH60  
6 118000 060468

## **Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

## **IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

### **Composition**

#### **LASILIX 40 mg comprimés :**

Furosemide ..... 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

#### **LASILIX 20 mg/2ml :**

Furosemide ..... 20 mg/2 ml.

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

## **Formes pharmaceutiques et présentations**

LASILIX 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

LASILIX 20 mg/2 ml : solution injectable,  
ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

## **DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

### **Voie orale :**

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium,
- de l'hypertension artérielle.

### **Voie injectable :**

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiolologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
- poussées hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (*rétention de sel*),
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

## **ATTENTION !**

### **Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

LOT : 20E021  
PER : 07/2024

LASILIX 40MG  
20CP SEC

P.P.V : 34DH60

6 118000 060468



# **Lasilix® 40 mg**

# **Lasilix® 20 mg/2 ml**

Furosémide

SANOFI

### **Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

### **IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

#### **Composition**

#### **LASILIX 40 mg comprimés :**

Furosémide ..... 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

#### **LASILIX 20 mg/2ml :**

Furosémide ..... 20 mg/2 ml.

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

### **Formes pharmaceutiques et présentations**

LASILIX 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

LASILIX 20 mg/2 ml : solution injectable,

ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

### **DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

#### **Voie orale :**

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium,
- de l'hypertension artérielle.

#### **Voie injectable :**

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardiolologiques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
- poussées hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (*rétention de sel*),
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

### **ATTENTION !**

#### **Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1,

Ain seba Casablanca

Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH

6 118001

082018

SANOFI

ine maladie a  
IX.

z une maladie

el qu'un ulcère

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrégent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérotrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

### Précautions d'emploi ; mises en garde

#### Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous concerne, vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
  - des troubles de la coagulation internes (saignement au sein d'une articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique).
- si vous présentez une maladie de l'appareil digestif.
- si vous avez des antécédents d'allergies, y compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en catalase) qui peut développer une forme particulière de sang en faible quantité.

#### Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale dentaire.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie (appelée thrombotique ou PTT) incluant l'apparition comme des petites taches ou non de fatigue extrême ou de la peau ou des yeux (jaunissement) éventuels".
- Si vous vous coupez ou si vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament pour止血, par exemple au cours du rasage), vous devez en avertir immédiatement votre médecin.
- Votre médecin pourra vous demander de止血.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1,

Ain sebaï Casablanca

Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH

6 118001

082018

SANOFI

ine maladie a  
IX.

z une maladie

el qu'un ulcère

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrégent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérotrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

### Précautions d'emploi ; mises en garde

#### Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous concerne, vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
  - des troubles de la coagulation internes (saignement au sein d'une articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique).
- si vous présentez une maladie de l'appareil digestif.
- si vous avez des antécédents d'allergies, y compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en catalase) qui peut développer une forme particulière de sang en faible quantité.

#### Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale dentaire.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie (appelée thrombotique ou PTT) incluant l'apparition comme des petites taches ou non de fatigue extrême ou de la peau ou des yeux (jaunissement) éventuels".
- Si vous vous coupez ou si vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament pour止血, vous devrez avertir immédiatement votre médecin.
- Votre médecin pourra vous demander de止血.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/

comprimés pelliculés

clopidogrel/acide acétylsalicylique

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat -R.P.1,

Ain sebaï Casablanca

Coplavix 75mg/100mg

b30 cp

P.P.V : 270,00 DH

6 118001

082018

SANOFI

ine maladie a  
IX.

z une maladie

el qu'un ulcère

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrégent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérotrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérotrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

### Précautions d'emploi ; mises en garde

#### Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous concerne, vous devez en avertir votre médecin.

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac.
  - des troubles de la coagulation internes (saignement au sein d'une articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans un vaisseau cérébral (ischémique).
- si vous présentez une maladie de l'appareil digestif.
- si vous avez des antécédents d'allergies, y compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appelée déshydrogénase (ou déficit en catalase) qui peut développer une forme particulière de sang en faible quantité.

#### Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale dentaire.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des selles rouges ou dans l'intestin (selles rouges).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie (appelée thrombotique ou PTT) incluant l'apparition comme des petites taches ou non de fatigue extrême ou de la peau ou des yeux (jaunissement) éventuels".
- Si vous vous coupez ou si vous pouvez demander plus de temps que l'action de votre médicament pour止血, vous devrez avertir immédiatement votre médecin.
- Votre médecin pourra vous demander de止血.

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat -R.P.1,  
Ain sebaâ Casablanca  
CoPlavix 75mg/100mg  
b30 cp  
P.P.V : 270,00 DH



die as

nalad  
ulcère

## 2 : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# CoPlavix® 75 mg/100 r

comprimés pelliculés  
clopidogrel/acide acétylsalicylique

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que CoPlavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CoPlavix
3. Comment prendre CoPlavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CoPlavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE COPLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

CoPlavix contient du clopidogrel et de l'acide acétylsalicylique (AAS) et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrégent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette agrégation dans certains vaisseaux sanguins (appelés artères), les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé athérothrombose).

CoPlavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins dans les artères devenues rigides pouvant conduire à la survenue d'événements athérothrombotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit CoPlavix à la place de deux médicaments, le clopidogrel et l'acide acétylsalicylique pour empêcher la formation de caillots sanguins parce que vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou de crise cardiaque (infarctus du myocarde). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COPLAVIX

### Contre-indications :

#### Ne prenez jamais CoPlavix

- si vous êtes allergique au clopidogrel, à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à d'autres médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens généralement utilisés pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations.

- si vous souffrez d'une maladie
- si vous souffrez d'une maladie
- si vous êtes dans le 3ème trimestre

### Précautions d'emploi ; mises en garde

#### Avertissements et précautions

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous vous devez en avertir votre médecin :

- si vous avez un risque hémorragique :
  - une maladie qui peut provoquer un ulcère de l'estomac).
  - des troubles de la coagulation interne (saignement au niveau d'une articulation).
  - une blessure grave récente.
  - une intervention chirurgicale.
  - une intervention chirurgicale dans les 7 jours à venir.
- si vous avez eu un caillot dans le système circulatoire cérébral ischémique.
- si vous présentez une maladie :
- si vous avez des antécédents compris les allergies à tout médicament.
- si vous avez de la goutte.
- si vous buvez de l'alcool, en raison de lésions gastro-intestinales.
- si vous avez une maladie appartenant à la famille des déshydrogénases (ou déficit en déshydrogénase) qui peuvent développer une forme particulière de la maladie.

Pendant la prise de CoPlavix :

- Vous devez avertir votre médecin :
  - si une intervention chirurgicale est programmée.
  - si vous souffrez de douleurs abdominales, ou si vous avez des douleurs dans l'intestin (selles rouges, diarrhée, etc.).
- Vous devez aussi avertir votre médecin si vous présentez une maladie (athérosclérose, thrombotique ou PTT) incluant une maladie qui peut apparaître comme des petites tumeurs sous-cutanées, ou des lésions de la peau, ou des yeux (jaunissement) (voir rubrique 4).
- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, vous devez demander plus de temps pour la cicatrisation. Dans le cas de coupures ou de brûlures, constater d'anomalies. Cependant, vous devez en avertir immédiatement "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous donner des recommandations supplémentaires.

# Docteur Kadi Anis

## CARDIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de Médecine de  
L'université d'état Lomonossov de Moscou

Ex-interne du Centre de Recherche  
Cardiovasculaire Bakulev



الدكتور قاضي أنيس  
أمراض القلب و الشرايين

خريج كلية الطب بجامعة

موسكو الحكومية

و الأوعية الدموية باكوف

خريج مركز أبحاث القلب

### Cabinet d'Explorations Cardio-Vasculaire

Casablanca, Le ..... الدار البيضاء في

01/03/2021

## ORDONNANCE

Mme / Mr.

**MR LAMAIZI MOHAMMED**

- Bilan
  - Cholestérol Total
  - Cholestérol HDL-LDL
  - Triglycérides
  - NFS+Plaquettes
- Bilan hépatique
  - ALAT : SGPT
  - ASAT : SGOT
  - Gamma GT

Dr KADI ANIS  
Iman Center Rue Arrachid Med Etg 7 N°2  
(Angle Av des FAR) - CASABLANCA 20110  
Tel: 05 22 31 53 48

LABORATOIRE ANALYSES  
MÉDICALES MANDARONA  
679, boulevard Al. Ben Abdellah 20460 - Casablanca  
Tel: 05 22 31 53 48

Dr KADI ANIS  
CARDIOLOGUE  
Iman Center Rue Arrachid Med Etg 7 N°2  
(Angle Av des FAR) - CASABLANCA 20110  
Tel: 05 22 31 53 48

📞 +212 5 22 31 53 48 📞 URGENCIE +212 6 61 41 57 72 📩 cardiokad@gmail.com

IMAN CENTER Rue Arrachid Mohamed, Étage 7<sup>ème</sup>, N°2 (Angle Av. des Forces Armées Royale)  
CASABLANCA 20110 زنقة الرشيد محمد (زاوية شارع الجيش الملكي) الطابق 7، رقم 2، الدار البيضاء  
مركز إيمان



مختبر منظرونا للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE MANDARONA  
D'ANALYSES MEDICALES

Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de  
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de  
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Casablanca le 17 mars 2021

Monsieur LAMAIZI MOHAMMED

FACTURE N° 140330

Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	80	
Bilan lipidique -----	B	190	
Transaminases OT -----	B	50	
Transaminases PT -----	B	50	
Gamma -G.T. -----	B	50	
Thyrostimuline (TSH us) -----	B	250	
Ferritine -----	B	250	Total : B 920

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER 1 257,80 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Deux Cent Cinquante Sept Dirhams et Quatre vingt Centimes

LABORATOIRE ANALYSES  
MÉDICALES MANDARONA  
679, boulevard Al Qods 20460 - Casablanca  
Tél.: 0522 52 83 88 - Fax: 0522 21 92 41

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo\_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347



**مختبر منظرونا للتحاليلات الطبية**  
**LABORATOIRE MANDARONA**  
**D'ANALYSES MEDICALES**

Page : 1/4

**Dr Yahya BENGHALEM**

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de  
Montpellier

**Dr Abderrahmane BOUMZEBRA**

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de  
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 17/03/21

Prélèvement effectué à 09:20

Edition du : 30/03/21

**Monsieur LAMAIZI MOHAMMED**

**Docteur ANIS KADI**

Réf. : 21C1283

Compte Rendu d'Analyses

## HEMATOLOGIE

### NUMERATION FORMULE SANGUINE

(SYSMEX XS-1000i)

Normales	Antériorités
(Homme Adulte)	

13/11/20

#### GLOBULES ROUGES

Hématies -----:	4,46	* M/mm <sup>3</sup>	4,5 - 5,55	4,67
Hémoglobine -----:	14,1	g/100 ml	14 - 17	14,2
Hématocrite -----:	42	%	40 - 50	43
- V.G.M. -----:	94	μ <sup>3</sup>	80 - 95	
- T.C.M.H. -----:	32	pg	28 - 32	
- C.C.M.H. -----:	34	g/100 ml	30 - 35	

#### GLOBULES BLANCS

Numération des leucocytes -----:	7 230	/mm <sup>3</sup>	4000 - 10000	8240
Formule leucocytaire				
Polynucléaires Neutrophiles -----:	56,8	%	50 - 70	
Soit :	4 107	/mm <sup>3</sup>	2000 - 7500	
Polynucléaires Eosinophiles -----:	2,4	%	1 - 3	
Soit :	174	/mm <sup>3</sup>	40 - 300	
Polynucléaires Basophiles -----:	0,3	%	< 1	
Soit :	22	/mm <sup>3</sup>	< 100	
Lymphocytes -----:	31,0	%	20 - 40	
Soit :	2 241	/mm <sup>3</sup>	1500 - 4000	
Monocytes -----:	9,5	%	1 - 14	
Soit :	687	/mm <sup>3</sup>	40 - 1000	

#### PLAQUETTES

Résultat -----:	227 000	/mm <sup>3</sup>	150000 - 400000	210000
-----------------	---------	------------------	-----------------	--------

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo\_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347



Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste  
et de la faculté de Pharmacie de  
Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 17/03/21

Prélèvement effectué à 09:20

Edition du : 30/03/21

## **Monsieur LAMAIZI MOHAMMED**

Docteur ANIS KADI

Réf. : 21C1283

Compte Rendu d'Analyses

## BIOCHIMIE SANGUINE (Cobas Roche C-311)

## BILAN LIPIDIQUE


			Normales	Antériorités
				<u>18/02/20</u>
Cholesterol total----- :	1,25	g/l	< 2	1,14
Soit :	3,22	mmol/l	< 5,15	2,94
Cholesterol HDL----- :	0,28 *	g/l	> 0,4**	0,32
Cholestérol LDL** -----:	0,67	g/l	< 1,6 **	0,71
Soit :	1,73	mmol/l	< 4,12	1,83

**\*\*Valeurs indicatives , à confronter avec le risque cardio- vasculaire du patient**

Triglycérides ----- : 1,98 \* g/l < 1,5 0,53  
 Soit : 2,26 mmol/l < 1,71 0,61

20/03/20

Transaminases - SGOT / ASAT ----- : 23 UI/l < 45 16





**مختبر منظرونا للتحاليلات الطبية**  
**LABORATOIRE MANDARONA**  
**D'ANALYSES MEDICALES**

Page : 3/4

**Dr Yahya BENGHALEM**

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de  
Montpellier

**Dr Abderrahmane BOUMZEBRA**

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de  
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 17/03/21

Prélèvement effectué à 09:20

Edition du : 30/03/21

**Monsieur LAMAIZI MOHAMMED**


**Docteur ANIS KADI**

Réf. : 21C1283

**Compte Rendu d'Analyses**

	Normales	Antériorités
--	----------	--------------

Transaminases - SGPT / ALAT -----: 21 UI/l < 49 14



Dates d'antériorités

Gamma G.T. -----: 61 \* UI/l < 55 26

Variations physiologiques :

- Prise de médicaments (+20 à 100 %)
- Anticonvulsivants (+20 à 300 %)
- Anticancéreux (+150 %)
- Antidépresseurs (+ 100 %)
- Contraceptifs oraux (+ 25 %)

## HORMONOLOGIE

T S H us-----: 2,50 µUI/ml 0,27 - 5  
(Chimiluminescence COBAS ROCHE E411)

*La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien.*

*Une variation minime de T4L provoque une réponse très amplifiée de la TSH.*

*Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence important, au moins 8 semaines pour une réponse complète.*

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo\_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347



مختبر منظرونا للتحاليلات الطبية  
LABORATOIRE MANDARONA  
D'ANALYSES MEDICALES

Page : 4/4

Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de  
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de  
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 17/03/21

Prélèvement effectué à 09:20

Edition du : 30/03/21

Monsieur LAMAIZI MOHAMMED

Docteur ANIS KADI

Réf. : 21C1283

Compte Rendu d'Analyses

### M A R Q U E U R S

Normales	Antériorités
----------	--------------

13/11/20

93

Ferritine ----- : 52 ng/ml

(Chimiluminescence COBAS ROCHE E411)

Valeurs usuelles en ng/ml

Enfants :	A la naissance :	150 à 450	ng/ml
	2 à 3 mois :	80 à 500	ng/ml
	4 mois à 16 ans :	20 à 200	
Femmes cycliques :	:	13 à 150	ng/ml
Femmes ménopausées :	:	30 à 400	ng/ml
Hommes :	:	30 à 400	ng/ml

LABORATOIRE ANALYSES  
MEDICALES MANDARONA  
679, boulevard Al Qods 20460 Casablanca  
Tel. : 0522 52 83 88 - Fax : 0522 21 92 41

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo\_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 0930606

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347

Nom: Lamaizi  
Prénom: Mohammed  
ID: 01952  
DDN: 18-Sep-1963  
Age: 57ans  
Sex: Male  
Taille: 162 PAS: 125  
Poids: 65 PAD: 77

01-Fév-2021 13:33:35

Fréq. Card. 57 BPM  
Int PR 201 ms  
Dur.ORS 85 ms  
QT/QTc 450/443 ms  
Axes P-R-T 1 31 64  
RR moyen 1051 ms  
QTcB 438 ms  
QTcF 442 ms

Docteur KADI ANIS  
CARDIOLOGUE  
Iman Center Rue Attarid Med Err 7 N°2  
(Angle du des Ani - CASABLANCA 20110  
tel: 05 22 31 53 48

