

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19- 064102

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10525 Société : 66225

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ABOU HAYANE Youssef

Date de naissance : 1-1-68

Adresse : bat 5 ns 120 Hadj Fateh oulfa

Tél : 0664869562 Total des frais engagés : 1593,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. HRICHI Rachid
Médecine Générale
95, Av Oued Tansit Cité El Outha
Tél : 05 27 19 43 56
INPE : 091076893

Date de consultation : 26/13/2021

Nom et prénom du malade : FAURHIE FATIHA Age : 52 ans

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète type I + Hypertension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 26/13/2021

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/03/2021	C1		20,00	Dr. HIRCHI Rachid Médecine Générale 95, Av Oued Tansift Cité El Ouffa Jaza - Tel : 05 27 19 43 96

INPE : 091076893

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE EL ANASSER ZEKRI Abdelati Docteur en Pharmacie 270-222-224 Bd Oued Tansift Casablanca - Tel: 0522.90.58.83 ICE: 002291220000074	26/03/2021	1633,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
666 882 938 999 EXOVERT VHA Parapharmacie Tel: 0522 938 999	26/03/2021		360,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
				COEFFICIENT DES TRAVAUX	
				MONTANTS DES SOINS	
				DEBUT D'EXECUTION	
				FIN D'EXECUTION	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX	
				MONTANTS DES SOINS	
				DATE DU DEVIS	
				DATE DE L'EXECUTION	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur HRICHI Rachid

MEDECINE GENERALE

295, Av. Oued Tansift (24, Gpe E)

Cité El Oulfa - CASABLANCA

Tél. : 0666 80 76 66

الدكتور الحريشي رشيد

الطب العام

295، شارع وادي تانسيفت (24، مجموعة E)

حي الألفة - الدار البيضاء

الهاتف: 0666 80 76 66

Casablanca, le : 26/03/2021 : الدار البيضاء، في

Mme FOUQUIR FATIHA:

24,46 x 3

1) Levothyrox 700

6,80 x 3
7cp/j

2) Levothyrox 25
7cp/j

103,30 x 3

3) Prelectal 5mg
7cp/j

27,70 x 3

4) Cardioaspirine 700mg
7cp/j

28,00 x 9

5) Glucophage 700mg
7cp x 3/j à midi

6) Bandellets CodeFree

دكتور الحريشي رشيد
Dr. HRICHI Rachid
Médecine Générale
295, Av Oued Tansift Cité El Ouf
asa - Tél : 05 27 19 43 9

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT	/ LOT NO. :	S0320114
MFG DATE	/ MFG DATE :	2020. 07. 17
EXP DATE	/ EXP DATE :	2022. 07. 16

traitement de 03 mois

PHARMACIE WILLYA MOULOUYA
ZEKRI Abdelati
Docteur en Pharmacie
220-222, Av Oued Tansift Cité El Oulfa
Casablanca - Tél: 0522 90 51 13
ICE: 002291220000071

دكتور الحريشي رشيد
Dr. HRICHI Rachid
Médecine Générale
295, Av Oued Tansift Cité El Ouf
asa - Tél : 05 27 19 43 96

39,20

7). Fucidine

7 appx 2/3

255,00

8). Rosuvastatin

7cp/j pendant 07 mois

T=1033.30

دكتور الحريشي رشيد
Dr. HRICHI Rachid
Médecine Générale
45, Av. Oued Tansift Cité El Oued
352 - Tél : 05 27 19 43 94



DR. ZEKRI ABDELHAKIM
Docteur en Pharmacie
45, Av. Oued Tansift Cité El Oued
352 - Tél : 05 27 19 43 94



FACTURE N° 1

Date d'émission : 26/03/2021

FOUGUIR FATIHA

EXOVERT VITAL

Lot Haj Fateh N°453 Magasin N°4 Hay El Oulfa - Casablanca

20200 CASABLANCA

MAROC

Tél : 0620374387

Email : info@exovert.com

Date d'exécution de la vente ou de la prestation : 26/03/2021

Référence	Désignation	Quantité	Prix U HT	Montant HT	TVA %
Référence	CODEFREE 50U BANDELETTES	2.00	180.00	360.00	0.00
Total HT				360.00	
Total TTC				360.00	
Net à payer (devise MAD)				360.00	

Réglement

TEL WATS / 0620374387

Exovert Vital
Parapharmacie
Tél: 0522 938 999

التي لا يجوز التخلص من الألبان في المجزور المجرى في البلاد القاحلة
أذا لم يكن من الممكن التخلص من بعض الحالات المصابة بالتهور
الغالبية العظمى من المصابين، خاصة من الضحايا.
يجب أن يتم تخفيف هذا الدواء في دواء آخر
ظروف التخزين
من ذلك النوع.
تاريخ انتهاء الصلاحية يتغير إلى الأخير. EXP. التاريخ بعد
لا يستخدم هذا الدواء تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يمكن استخدامه في الأطفال.

[illegible]

التي لا يجوز التخلص من الألبان في المجزور المجرى في البلاد القاحلة
أذا لم يكن من الممكن التخلص من بعض الحالات المصابة بالتهور
الغالبية العظمى من المصابين، خاصة من الضحايا.
يجب أن يتم تخفيف هذا الدواء في دواء آخر
ظروف التخزين
من ذلك النوع.
تاريخ انتهاء الصلاحية يتغير إلى الأخير. EXP. التاريخ بعد
لا يستخدم هذا الدواء تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يمكن استخدامه في الأطفال.

[illegible]

[illegible]

۵-۶: در این کتاب، سوره‌های ۱ تا ۱۱۱ درج شده است.

[illegible]

6 118001 102020
Levothyrox® 100 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 24,40 DH

4- ما هي التأثيرات على النموذجية الحقيقية؟

[illegible]

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDecin OU DE VOTRE PHARMACIEN

9. INTERACTIONS

Autres médicaments et ROSUVAS[®] SUN : certains médicaments peuvent perturber l'efficacité ou augmenter les effets secondaires de ROSUVAS[®] SUN. Par exemple, certains médicaments peuvent augmenter le risque d'hémorragie ou de saignement. Si vous prenez d'autres médicaments, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez les prendre avec ROSUVAS[®] SUN.

Aliments et boissons : ROSUVAS[®] SUN ne doit pas être pris avec de l'alcool. Si vous prenez de l'alcool, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez le prendre avec ROSUVAS[®] SUN.

Autres médicaments et ROSUVAS[®] SUN : certains médicaments peuvent perturber l'efficacité ou augmenter les effets secondaires de ROSUVAS[®] SUN. Par exemple, certains médicaments peuvent augmenter le risque d'hémorragie ou de saignement. Si vous prenez d'autres médicaments, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez les prendre avec ROSUVAS[®] SUN.

10. UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez prendre ROSUVAS[®] SUN. Si vous êtes allaitante, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez allaiter votre bébé avec ROSUVAS[®] SUN.

11. LES EFFETS POSSIBLES DU TRAITEMENT SUR LA CAPACITE A CONDUIRE UN VEHICULE OU A UTILISER CERTAINES MACHINES

Le fait de prendre ROSUVAS[®] SUN peut affecter votre capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines. Si vous devez conduire un véhicule ou utiliser une machine, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez le faire avec ROSUVAS[®] SUN.

12. SYMPTOMES ET CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de ROSUVAS[®] SUN que vous n'avez dû, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous devez prendre des mesures. Si vous avez pris plus de ROSUVAS[®] SUN que vous n'avez dû, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous devez prendre des mesures.

14. RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Si vous avez pris ROSUVAS[®] SUN pendant une longue période, vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage si vous arrêtez de le prendre. Si vous avez pris ROSUVAS[®] SUN pendant une longue période, vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage si vous arrêtez de le prendre.

15. RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Si vous avez pris ROSUVAS[®] SUN pendant une longue période, vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage si vous arrêtez de le prendre. Si vous avez pris ROSUVAS[®] SUN pendant une longue période, vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage si vous arrêtez de le prendre.

Ne prenez pas de ROSUVAS[®] SUN si vous avez des problèmes de foie graves ou si vous avez des problèmes de reins graves. Si vous avez des problèmes de foie graves ou si vous avez des problèmes de reins graves, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez prendre ROSUVAS[®] SUN.

6. CONTRE-INDICATIONS

Mode d'administration
ROSUVAS[®] SUN doit être pris une fois par jour, à jeun, avec un verre d'eau. Si vous avez des problèmes de foie graves ou si vous avez des problèmes de reins graves, consultez votre médecin ou pharmacien pour savoir si vous pouvez prendre ROSUVAS[®] SUN.

7. EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquents sont : maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, douleurs osseuses, douleurs nerveuses, douleurs cutanées, douleurs oculaires, douleurs ORL, douleurs gynécologiques, douleurs urologiques, douleurs digestives, douleurs respiratoires, douleurs cardiovasculaires, douleurs neurologiques, douleurs psychiatriques, douleurs dermatologiques, douleurs ophtalmologiques, douleurs otologiques, douleurs rhinologiques, douleurs stomatologiques, douleurs ORL, douleurs gynécologiques, douleurs urologiques, douleurs digestives, douleurs respiratoires, douleurs cardiovasculaires, douleurs neurologiques, douleurs psychiatriques, douleurs dermatologiques, douleurs ophtalmologiques, douleurs otologiques, douleurs rhinologiques, douleurs stomatologiques.

8. EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquents sont : maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, douleurs osseuses, douleurs nerveuses, douleurs cutanées, douleurs oculaires, douleurs ORL, douleurs gynécologiques, douleurs urologiques, douleurs digestives, douleurs respiratoires, douleurs cardiovasculaires, douleurs neurologiques, douleurs psychiatriques, douleurs dermatologiques, douleurs ophtalmologiques, douleurs otologiques, douleurs rhinologiques, douleurs stomatologiques.

9. EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquents sont : maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, douleurs osseuses, douleurs nerveuses, douleurs cutanées, douleurs oculaires, douleurs ORL, douleurs gynécologiques, douleurs urologiques, douleurs digestives, douleurs respiratoires, douleurs cardiovasculaires, douleurs neurologiques, douleurs psychiatriques, douleurs dermatologiques, douleurs ophtalmologiques, douleurs otologiques, douleurs rhinologiques, douleurs stomatologiques.

10. EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquents sont : maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, douleurs osseuses, douleurs nerveuses, douleurs cutanées, douleurs oculaires, douleurs ORL, douleurs gynécologiques, douleurs urologiques, douleurs digestives, douleurs respiratoires, douleurs cardiovasculaires, douleurs neurologiques, douleurs psychiatriques, douleurs dermatologiques, douleurs ophtalmologiques, douleurs otologiques, douleurs rhinologiques, douleurs stomatologiques.

11. EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables les plus fréquents sont : maux de tête, fatigue, douleurs musculaires, douleurs articulaires, douleurs osseuses, douleurs nerveuses, douleurs cutanées, douleurs oculaires, douleurs ORL, douleurs gynécologiques, douleurs urologiques, douleurs digestives, douleurs respiratoires, douleurs cardiovasculaires, douleurs neurologiques, douleurs psychiatriques, douleurs dermatologiques, douleurs ophtalmologiques, douleurs otologiques, douleurs rhinologiques, douleurs stomatologiques.

بريكال 10^٥ ملغ / 2,5 ملغ

بئر التوريريل أر جنتين / إنديا ميديا
جنتين مانيستا

بريكال 5^٥ ملغ / 1,25 ملغ

بئر التوريريل أر جنتين / إنديا ميديا
جنتين مانيستا

يرجى قراءة هذا الإعلان بعناية قبل اتخاذ هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.
- إنفي هذه اللشرة: قد تحتاج لقرائنها مرة أخرى.
- اسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أسئلة أخرى.
- قد وصف هذا الدواء لك فلا تعطله للأخزين. قد يفرضهم حتى لو أقرائهم هي نفس أقرائهم.
- تحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا أصبحت قلقا جانية. وهذا ينطبق أيضا على أي آثار جانية محتملة غير المدرجة في هذه اللشرة.

٣- كيف تستخدم بريكال ١٠^٥

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

LOT N°:
EXP:
PPV:

103,30

٦- معلومات بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ
٥- معلومات بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ

١- على طريقة

- ١- على طريقة بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ
- ٢- على طريقة بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ
- ٣- على طريقة بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ
- ٤- على طريقة بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ
- ٥- على طريقة بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ
- ٦- على طريقة بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

الجرعة المعتدلة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
يجب أخذ اللشرة بعناية مع وجبات الطعام. ولا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.
لا تأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام. وتأخذ دواء بريكال ١٠^٥ مع وجبات الطعام.

٦- معلومات بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ
٥- معلومات بريكال ١٠^٥ / ٢,٥ ملغ

Fucidine® 2% pommade



Veuillez lire attentivement la notice qui accompagne ce médicament. Si vous avez des questions, ne le donnez à personne.

Médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, elle présente les mêmes symptômes que vous.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT
DENOMINATION
FUCIDINE® 2%, pommade
COMPOSITION QUALITATIVE

COMPOSITION

Fusidate de sodium
Excipients q.s.p.

Par tube de 15 g

300 mg
15 g

Excipients : alcool cétylique, laur.

FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade, Tube de 15 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-INFECTIEUX

Antibiotiques-antibactériens / antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines

(D : Dermatologie).

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est un antibiotique

Ce médicament est préconisé dans les infections cutanées dues à des germes staphylocoques et streptocoques.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants

• allergie à l'acide fusidique ou à l'un des excipients,

• infections mammaires lors de l'allaitement en raison du risque d'absorption du produit par le nouveau-né.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• La pommade ne doit pas être appliquée sur l'œil.

• Ne pas utiliser la pommade sur de trop grandes surfaces, en particulier chez le nourrisson.

• Ne pas utiliser la pommade sur les lésions suintantes macérées, ni dans les plis, ni sur les ulcères de jambe.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SUSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

En cas d'allaitement, ne pas appliquer sur le sein

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lanoline.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée, application locale avec ou sans pansement. Éviter l'application en couche épaisse.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Une ou deux applications par jour après nettoyage de la surface infectée.

DURÉE DU TRAITEMENT

Limiter le traitement à une semaine, à titre indicatif.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINS PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNÉRANTS.

Dans certains cas, il est possible que survienne un eczéma allergique avec parfois des lésions éloignées du lieu de traitement :

il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

En fonction de l'absorption du produit à travers la peau, en particulier chez le nourrisson, la possibilité d'effets non souhaités au niveau du foie ne peut être exclue, signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à température ambiante.

CONDITION DE DÉLIVRANCE :

CE MÉDICAMENT EST INSCRIT EN LISTE 1

VOTRE PHARMACIEN NE POURRA VOUS EN DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CE MÉDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS

- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL

- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

Fabriqué sous licence par **POLYMÉDIC**

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsalane- Maroc

Dr. M. HOUBACHI : Pharmacien Responsable

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®
100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®
100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à cela, le risque de formation de caillots sanguins est réduit.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRINE®
100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

**No
Coding**

BLOOD GLUCOSE TEST STRIP
BANDELETTE-TEST DE GLYCÉMIE



GOLD ELECTRODE

 SD BIOSENSOR