

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Tél : 05 22 22 15 45 (L.G.) Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0005881

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7155 Société : 66573

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : GOTNI AHMED

Date de naissance : 09-07-1962

Adresse : HABITUELLE

Tél : 0635738080 Total des frais engagés : 517,7 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 07/04/2021

Nom et prénom du malade : COSTAN ALVES Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection longue durée

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 08/04/2021

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/01/2011			30000	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	24.12.11	21770

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohamed ACHIBA

- Spécialiste des maladies de l'appareil digestif.
Foie, Vésicule biliaire, estomac, intestins, hémorroïdes.
- Echographie-endoscopie digestive-proctologie.
- Ex Chef de Service de Gastro-entérologie
Hôpital Mly Youssef à Casablanca.
- Membre de la société française de Gastro-entérologie.



الدكتور محمد عشيبة

- أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي.
الكبد، المرارة، المعدة، الأمعاء، البواسير.
- الفحص بالأمواج فوق الصوتية، الفحص بالمنظار الداخلي.
- تشخيص و جراحة أمراض المخرج.
- رئيس مصلحة الجهاز الهضمي سابقا بمستشفى مولاي يوسف الدار البيضاء.
- عضو الجمعية الفرنسية لأمراض الجهاز الهضمي.

Casablanca, le : 07 AVR 2021

GASTRO-ALIMENTAIRE

3710

Pen. sup. h. m. p.

5280 2 w ca 3/ 1 h 4

0712 p. l. 2

45.90 1 jul - mi 12 4 w

Tribouline

5040 1 w 2 3/

Mentyl 80 1 h 4 201

3150 2 w 2 3/

Lynox 10 12 3/ 4

HAZAKIACE NOUZZA
DIOURI AYADI Nouzza
Diplômée de l'Université de Bruxelles
502, Bd. M. Rabia - El Oulfa
Casablanca - El Oulfa
Tél: 0522 90 17 15 - Cas.
0522 90 17 15

Docteur Mohamed ACHIBA
GASTRO-ENTÉROLOGUE
PROCTOLOGUE Médical et Chirurgie
10 Lotissement Moulay Thami El Oulfa
Casablanca - Tél: 0522 89 62 69

مدار جورج 10، تجزئة مولاي التهامي، الطابق الأول، الشقة رقم 1 - الولفة - الدار البيضاء

10, Lotissement Moulay Thami (Rond point George) 1^{er} étage, N° 1 - Quartier Oulfa - Casablanca

الهاتف: 0522 89 62 69

21770

بيريديس

دوسيدو
مستعلق للشرب

1 ملغ/مل

بأكمله كما ينبغي (مرض يسمى قصور قلبي)؛
• إذا كنت تعاني من مشكلة تؤدي إلى انخفاض نسبة البوتاسيوم أو
المغنيسيوم أو ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم؛

• إذا كنت تتناول بعض الأدوية (انظر "تناول أو استعمال أدوية أخرى
وبيريديس 1 ملغ/مل، محلول للشرب")؛

• يجب عدم استعمال بيريديس لدى المولودين الجدد، الرضع، الأطفال
والمراهقين دون 12 سنة أو أقل من 35 كغم.

في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات واحتياطات

ينصح بعدم استعمال هذا الدواء لدى المرضى الذين لا يتحملون فركتوز

(مرض وراثي نادر).

يحتوي هذا الدواء على الصوديوم. نقل نسبة الصوديوم عن 1 mmol

جرعة مستعملة، أي خالي من "الصوديوم".

يحتوي هذا الدواء على باراهيدروكسيبنزوات ميثيل (E218) و

باراهيدروكسيبنزوات بروتينيل (E216). وقد يتسبب في تفاعلات حساسات

يحتوي هذا الدواء على 8.5 ميكروغرام من كحول بنزيليك لكل جرعة

10 ملل، ما يعطى 0.85 ميكروغرام/ملل من المحلول للشرب. قد يتسبب

كحول بنزيليك في تفاعلات حساسية.

اقصد الطبيب قبل تناول بيريديس 1 ملغ/مل، محلول للشرب:

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد (اختلال وظائف الكبد أو قصور

كبدي) (انظر "لا تتناول أبدا بيريديس 1 ملغ/مل، محلول للشرب")؛

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى (اختلال وظائف الكلى أو قصور

كلوي). استشر الطبيب في حالة علاج مطول، حيث قد يستوجب عليك

تناول جرعة أصغر أو استعمال الدواء بوتيرة أقل. وقد يتعين على الطبي

فحصك بانتظام.

قد يقرن دوسيدو بخطر متزايد لاضطراب النظم القلبي وسكة ق

وقد يترافق هذا الخطر لدى المرضى فوق 60 سنة أو الذين يتناولون

جرعات تفوق 30 ملغ في اليوم. كما يزداد الخطر عندما يستعمل

دوسيدو مع بعض الأدوية. أخبر الطبيب أو الصيدلي أنك تتناول

لـعلاج التشنجات (تشنجات فطرية أو بكتيرية) و/أو تعاني من مشاكل في

القلب أو من متلازمة نقص المناعة المكتسب (انظر "أدوية أخرى

وبيريديس 1 ملغ/مل، محلول للشرب").

يجب استعمال دوسيدو بـأصغر جرعة فعالة لدى البالغين والمراهقة

ابتداء من 12 سنة و35 كغم.

خلال العلاج بواسطة دوسيدو، اتصل بالطبيب إذا كنت تعاني من

اضطرابات النظم القلبي، مثل خفقان القلب، صعوبات في التنفس،

الوعى. عندئذ يجب وقف العلاج بواسطة دوسيدو.

في حالة الشك، لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يخضع هذا الدواء لمراقبة إضافية يمكن من التعرف بسرعة على
المعلومات الجديدة المرتبطة بالسلامة. يمكنك المساهمة فيها بالإبلاغ
عن أي تأثير غير مرغوب فيه ملاحظته. انظر نهاية الفقرة 4 كيف يتم
التصريح بالتأثيرات غير المرغوب فيها.
يرجى الاطلاع بالتأني على هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء. لأنها
تقدم معلومات هامة من أجلها.

LOT : 20E010

PER. : 10 2022

PERIODS 1MG/ML
SUSP. UV F200ML
P.P.V. : 37DH10



• الدواء لا يشكل خطراً. لا تقم بإعطائه لشخص
وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تتسبب الضرر له.
التأثيرات غير المرغوب فيها: أخبر الطبيب أو
ذلك على أي تأثير غير مرغوب فيها لم يذكر في هذه
النشرة.
• ملغ/مل، محلول للشرب وفي أية حالات يستعمل؟
• محطرات الحركة المعوية - رمز : A03FA03
• وهو مادة تنتمي إلى فئة مناهضات دوبامين.
• يؤثر على الحركة المعوية.
• يستعمل هذا الدواء لدى البالغين والمراهقين ابتداء من 12 سنة و35 كغم
• لعلاج التشنج أو القيء.
• ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بيريديس 1 ملغ/مل،
محلول للشرب؟
• إذا أخبرك الطبيب بعدم تحملك لبعض السكريات، اتصل به قبل تناول هذا
الدواء.
• لا تتناول بيريديس 1 ملغ/مل، محلول للشرب:
• إذا كانت لديك حساسية لدوسيدو أو لأحد مكونات هذا الدواء
الأخرى الموفرة في هذا الدواء والمذكورة في الفقرة 6؛
• إذا كنت تعاني من نزيف في المعدة أو المعى أو انسداد ميكانيكي أو ثقب
هضمي؛
• إذا كنت تعاني من ورم بروتاكتيني في الغدة (مرض الغدة الخامية)؛
• إذا كنت تعاني من مرض معتدل أو حاد في الكبد؛
• إذا كان لديك حساسية قلبية تسمى "امتداد الفاصل
الربوبي QT المصحح".
• إذا كنت تعاني من عانيت من مشكلة تجمع القلب من ضخ الدم في الجسم



بيروزكس

معق للشراب

العينات الصوديوم - بيكاربونات الصوديوم

الشكل و التقدير :

معق للشراب - القنينة تحتوي على 250 مل.

التكوين :

بيروزكس الصوديوم الامائي : 5,000 غ
بيكاربونات الصوديوم : 2,670 غ
السواغات بما فيكي : 100 ملل

السواغات ذات تأثير معلوم : الصوديوم - باراهيدروكسيبيانات ميثيل و باراهيدروكسيبيانات البروبيل.

الخصائص :

بيروزكس⁽¹⁾ عارس تأثيرا مضادا للحموضة و مضادا للإنحسار.

- تكوينه القلوي يسمح برفع المعامل المميز للحموضة و القاعدة (PH) في الجزء الأعلى للمعدة، و هكذا يحصل تأثير مسكن.

- يتموقعه فوق المحتوى المعدي و بفضل تحويله إلى هلام لزج و كثيف، ينشئ مانعا آليا للانحسار و الارتفاع الحمضي المعدي.

الاستطبابات :

بيروزكس⁽²⁾ يوصف لعلاج أعراض الانحسار المعدي البلعومي الجرة، ارتفاع الحمض.

الحمل و الرضاعة :

بيروزكس⁽³⁾ يمكن أن يجرع للمرأة الحامل أو المرضع، عند الحاجة.

استشروا طبيكم أو الصيدلاني قبل الإستعمال.

المقادير و طريقة الإستعمال :

المقادير :

لمعتقنين حجم ملعقة القهوة (أي 10 ملل) 3 مرات في اليوم بعد الثلاث وجبات الرئيسية، و عند الإقضاء في المساء قبل النوم.

هذه المقادير يمكن مضاعفتها في حالة الإنحسار أو التهاب البلعوم القاسي.

طريقة التجرع :

بيروزكس⁽⁴⁾ يجرع عن طريق الفم.

ترج القنينة جيدا قبل الإستعمال.

تأثير التجرع :

يجزع بيروزكس⁽⁵⁾ بعد الوجبات.

ضد الإستطبابات :

فرط الحساسية للمواد النشطة أو لأحد السواغات.

التحذيرات و الإحتياطات عند الإستعمال :

بيروزكس⁽⁶⁾ يحتوي على الصوديوم، عند المصابين الذين يتبعون الحمية الخالية من الصوديوم أو حمية صارمة دون ملح : الأخذ في الحسبان مقدار الصوديوم الموجود بالمستحضر.

بيروزكس⁽⁷⁾ يحتوي على باراهيدروكسيبيانات البروبيل و باراهيدروكسيبيانات ميثيل و باستطاعة ذلك أن تحدث تفاعلات حساسية (إحتماليا متأخر).

لا يستعمل بيروزكس⁽⁸⁾ إذا كان تاريخ الإلصاحبة الظاهر على التعبئة الخارجية قد إنتقض.

في حالة الإرتباب استشروا طبيكم أو الصيدلاني .

بيروزكس⁽⁹⁾ هو دواء لا يترك في متناول الأطفال .

التأثيرات غير المرغوب فيها :

مثل جميع الأدوية، بيروزكس⁽¹⁰⁾، معق الشراب يحتمل أن يكون له تأثيرات غير مرغوب فيها، بحيث لن يكون الجميع عرضة لذلك :

• إمساك محتمل الوقوع، الذي يبقى استثنائيا، سببه تواجد الألبينات ؛

• باستعمال طويل المدة، يمكن حدوث ارتفاع الكالسيوم في الدم مع خطر التعرض لحصى الكلى و القصور الكلوي.

• تفاعلات حساسية (الشرى، مصوبة في التنفس).

التدخل الدوائي :

بيروزكس⁽¹¹⁾ يتكثل مع أدوية عديدة و يمكنه تغيير امتصاصها.

مضادات الأحماض له تكل متبادل لبعض الأدوية الأخرى التي تجرع عن طريق الفم ما يمنع الإمتصاص.

ما تتطلبه الإحتياطات عند الإستعمال :

نلاحظ إنتقاص في الإمتصاص الهضمي للأدوية المجرعة في آن واحد، على سبيل الإحتياط، من المناسب أخذ مضادات الأحماض تباعدا عن الأدوية الأخرى.

بيروزكس⁽¹²⁾ تناوله يجب أن يكون تباعده ساعتين على الأقل مع :

• المضادات البكتيرية، مضادات السل (إيطامبوتول، إيزونيازيد)، عن طريق الفم؛

• المضادات البكتيرية - سبكيل (عن طريق الفم)؛

• المضادات البكتيرية و لانكوزايد (عن طريق الفم)؛

• مضادات الهيستامين H2 (عن طريق الفم)؛

• أتينولول، ميتوبرولول، بروبرانولول (عن طريق الفم)؛

• الكوروكين (عن طريق الفم)؛

• ديكوكسين (عن طريق الفم)؛

• ثنائي الفوسفونات (عن طريق الفم)؛

• فلوريد الصوديوم؛

• الهرمونات الدرقية؛

• الغليكوكورتيكويد (عن طريق الفم؛ يوصف خاصة بريدنيسولون و ديكساميثازون)؛

• اندوميثاسين (عن طريق الفم)؛

• كالسيلات (عن طريق الفم)؛

• الكيتوكونازول (عن طريق الفم)؛

• لانسوبرازول؛

• مهدئ الأعصاب فنيوتازينيك (عن طريق الفم)؛

• بينيسيلامين (عن طريق الفم)؛

• ملح الحديد (عن طريق الفم)؛

تتبعاد جرعات البيروزكس⁽¹³⁾ لأكثر من 4 ساعات إذا كان ذلك ممكنا مع :

• مضادات البكتيرية - فلوريونكيتولون (عن طريق الفم).

الأخذ في الحسبان :

الحمض الصفصافي : (عن طريق الفم) إرتفاع الإفراز الكلوي للحمض الصفصافي بالبول الألكالي.

فرط الجرعة :

لم يشر إلى أي حالة فرط الجرعة، مع ذلك الإستعمال المفرط بإمكانه أن يسبب إحتداد التأثيرات غير المرغوب فيها.

شروط الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مائوية، لا يحفظ بالمبردة.

بعد أول ما تفتح القنينة، لا تحفظ لأكثر من 3 أشهر.

المصرف : حر.



مختبرات جالينيكام - م.ص. أولاد صالح - الدار البيضاء - المغرب
Laboratoires GALENICA - Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

Ozil plus

Oméprazole

14 Gélules



6 118000 331247

LOT: 200378

PER: 06/2025

PPV: 52,80 DH

حامل أو تخططين
بسبب الادي للجنين
أوزيل پليس[®] في
طبييك يجب أن ت
أوزيل پليس[®] يج
عن افضل طريقة
تحتوي كل كسولة

أوزيل پليس[®] 20 ملغ

كيسولات

أوميزول

يجب قراءة هذه النشرة كاملة قبل تناول هذا الدواء.

• يرجى الاحتفاظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة ثانية.
• إذا كان لديك أي سؤال أو شك، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

• لقد تم وصف هذا الدواء لك شخصياً ولا يجوز إعطائه لشخص آخر وإن تشابهت الأعراض، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار غير محسوبة.
• في حالة وجود آثار جانبية حادة، أو آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

قد يؤدي للإصابة بقلادة جهازية.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى :

تناول أو استعمال أدوية أخرى :

أخير طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية، قد يؤثر أوزيل پليس[®] على فاعلية الأدوية الأخرى و قد تؤثر أدوية معينة على فاعليته.

تجنب تناول أوزيل پليس[®] إذا كنت تتناول دواء يحتوي على نيفينافير (يستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)). يجب عليك إخبار طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية :

• كيتوكونازول، إتراكونازول أو فوريكونازول (تستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية) • ديجوكسين (يستخدم لعلاج مشاكل القلب) • ديازيبام (يستخدم لعلاج القلق، الحصر أو يستعمل كمخدر للعضلات) • فينيتوين (يستخدم في مرض الصرع)، إذا كنت تتناول فينيتوين من الضروري أن يقوم الطبيب بمراقبة حالتك عند البدء بتناول أوزيل پليس[®] أو عند التوقف عن تناوله • الأدوية المضادة لتجلط الدم مثل الوارفارين أو مضادات فيتامين ك، من الضروري أن يقوم الطبيب بمراقبة حالتك عند البدء بتناول أوزيل پليس[®] أو عند التوقف عن تناوله • سيكلوسبورين • مضاد حيوي يحتوي على أمبيسلين • ريفاميسين (لعلاج مرض السل) • أتانافانير (لعلاج التهاب فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)).

تاكروليموس (في حالة زرع الأعضاء) • أدوية تحتوي على الحديد • دواء يحتوي على بنزوديازيبين • عشبة سانت جونز (هايريكيم بيفرواثم) (تستخدم لعلاج حالات الاكتئاب المعتدلة) • ساكوتافير (يستخدم لعلاج التهاب فيروس نقص المناعة المكتسبة) • كلوبيدوجريل (يستخدم للوقاية من جلطات الدم (تجلط)) • مكملات الكالسيوم أو الحديد الكامل • كلاريثروميسين

الاستعمال خلال فترة الحمل والإرضاع

إذا كنت حامل أو تخططين لذلك، يجب إخبار الطبيب قبل تناول أوزيل پليس[®]. سيقرر طبيبك إذا كان من الممكن تناول أوزيل پليس[®] خلال هذه الفترة.

سيخبرك الطبيب إذا كان من الممكن تناول أوزيل پليس[®] خلال فترة الإرضاع.

التأثير على القدرة على قيادة المركبات أو استخدام الآلات

بدون

رياضيون

بدون

1 - ما هو أوزيل پليس[®]، كيسولات و ما هي دواعي الاستعمال ؟

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال أوزيل پليس[®]، كيسولات ؟

3 - كيف يستعمل أوزيل پليس[®]، كيسولات ؟

4 - ما هي الآثار الجانبية المحتملة ؟

5 - كيف يحفظ أوزيل پليس[®]، كيسولات ؟

6 - معلومات إضافية

1 - ما هو أوزيل پليس[®]، كيسولات و ما هي دواعي الاستعمال ؟

اللقطة الدوائية و العلاجية :

يحتوي أوزيل پليس[®] على مادة تسمى أوميزول. التي تنتمي إلى المجموعة الدوائية مثبطات مضخة البروتون. التي تقلل إفراز الحمض في المعدة.

(ATC code: A02BC01).

دواعي الاستعمال العلاجية :

يستخدم هذا الدواء عند البالغين لعلاج الحالات التالية :

العلاج قصير الأمد لقرحة الاثني عشر النشطة.

علاج الارتداد المعدي المريئي.

الحفاظة على الشفاء من التهاب المريء المتأكل.

الحد من مخاطر نزيف الجهاز الهضمي عند المرضى ذوي الحالات الحرجة.

من غير المعروف إذا كان أوزيل پليس[®] آمناً وفعالاً عند استعماله للأطفال الأقل من 18 عاماً.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال أوزيل پليس[®]، كيسولات ؟

موانع الاستعمال :

لا تتناول أوزيل پليس[®]، كيسولات في الحالات التالية :

إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) لأوميزول أو لأي مكونات أخرى في أوزيل پليس[®].

إذا كنت تعاني من الحساسية لأي مثبط آخر من مثبطات مضخة البروتون.

إذا كان لديك شك من الضروري سؤال طبيبك أو الصيدلاني.

الاحتياطات و المحاذير الخاصة :

الاحتياطات عند تناول أوزيل پليس[®]، كيسولات :

• إذا أخبرتك تعاني من انخفاض مستويات المغنيزيوم، الكالسيوم أو البوتاسيوم في الدم • إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد • إذا كنت تعاني من قصور في عضلة القلب • إذا كنت تعاني من متلازمة بارتر (اضطراب نادر في الكلى) • إذا كنت تعاني من أي نوع من

LOT : 9914
U.T. AV : 04-25
P.P.V : 45 DH 90



تريبوتين

ترميوتين

المرجو قراءة كامل هذه النشرة الدوائية بنتمعن قبل استخدام هذا الدواء.

المرجو الاحتفاظ بهذه النشرة الدوائية في حال دعت الحاجة إلى إعادة قراءتها.
إن كان لديكم أي أسئلة أو انتباكات مع الطبيب أو الصيدلي قصد الحصول على المزيد من المعلومات.

تم وصف هذا الدواء لكم شخصيا. لذا يتوجب عدم منح هذا الدواء لأي شخص آخر حتى في حال تطابق الأعراض لأن من شأن ذلك إلحاق الضرر به.
في حال زادت شدة الآثار غير المستحبة أو برز أثر غير مستحب لم يتم الإشارة إليه بهذه النشرة الدوائية، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي بذلك.

التقديم :

ترميوتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب. قارورة من فئة 250 ملل.

ترميوتين® 150 ملغ أكياس، غلبة من فئة 20.

ترميوتين® 150 ملغ كبسولة، غلبة من فئة 20.

التركيبية :

اسم الدواء	المادة الحيوية	السواغات
ترميوتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب	ترميوتين قاعدة.....0,787g	الكمية الكافية من أجل 100 غرام
ترميوتين® 150 ملغ أكياس	ترميوتين قاعدة.....150 ملغ	الكمية الكافية من أجل كيس واحد
ترميوتين® 150 ملغ كبسولة	ترميوتين مائيات.....150 ملغ	الكمية الكافية من أجل كبسولة واحدة

تصنيف الدواء :

دواء مضاد للتشنج الموجه للععضلات.

دواعي الاستعمال :

ينصح باستعمال هذا الدواء في علاج أعراض الآلام، اضطرابات العبور المعوي وعدم الاتياع المعوي المرتبطة بالاضطرابات الوظيفية المعوية.

موانع استعمال الدواء :

لا تتناول تريميتين أبدا في الحالات التالية :

- عند الأطفال الأقل من سنتين.

- في حالة الحساسية ضد ترميوتين أو أحد مكونات الدواء.

- في حالة الشلل، يتعين طلب مشورة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة واحتياطات الاستعمال :

تحذيرات خاصة

ترميوتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب و تريميتين® 150 ملغ أكياس

لا ينصح باستعمال هذا الدواء. نظرا لاحتوائه على السكروز وذلك في حالة عدم تحمل الفركتوز وفي ظاهرة عدم امتصاص الكليكتوز والكليكتوز (مرض وراثي نادر).

يحتوي تريميتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب. قارورة من فئة 250 ملل. على برايدوكسينيكينوات المثلل ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاعلات الحساسية (على الأرجح متأخرة).

احتياطات الاستعمال :

ترميوتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب و تريميتين® 150 ملغ أكياس

يحتوي كل كيس من تريميتين® 150 ملغ أكياس على 2,7 غرام من السكروز.

يحتوي كل 5 ملل من الشراب المعلق على 3 غرام من السكروز.

يجب اخذ بعين الاعتبار في الجرعة اليومية في حالة اتباع حمية خالية من السكر أو في حالة الإصابة بداء السكري.

هذا الدواء لا ينصح باستعماله من طرف المرضى الذين يعانون من عدم تحمل السكروز (مرض وراثي).

في حالة الشلل، يتعين طلب مشورة الطبيب أو الصيدلي.

التفاعلات مع أدوية أخرى :

الرجاء إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أي أدوية أخرى من أي نوع، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

التفاعلات مع الأطعمة والأشربة :

لا يوجد أي موضوع

التفاعلات مع منتجات الأعشاب أو الطب البديل :

لا يوجد أي موضوع

الحمل والإرضاع

الحمل

لا ينبغي تناول هذا الدواء في فترة الحمل إلا بناء على نصيحة طبيبك. وإذا اكتشفت بذلك حامل أثناء العلاج، فاستشيري طبيبك فهو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ضرورة مواصلة العلاج.

الإرضاع

لا يمكن الإرضاع أثناء العلاج بهذا الدواء

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الرياضة :

لا يوجد أي موضوع

الجرعة، طريقة و/أو موضع تناول الدواء :

الجرعة :

في جميع الحالات، يتعين الالتزام بوصفة الطبيب.

ترميوتين® 150 ملغ، كبسولة و أكياس

عند البالغين الجرعة الاعتيادية هي كيس واحد أو كبسولة واحدة، 2 مرات في اليوم.

وعلى وجه الاستثناء، يمكن الزيادة في هذه الجرعة إلى 600 ملغ في اليوم.

يجب أن يكون العلاج قصير المدة.

ترميوتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب :

البالغين :

1 ملعقة كبيرة، 3 مرات في اليوم، أثناء الوجبات الرئيسية.

على وجه الاستثناء، يمكن الزيادة في هذه الجرعة تدريجيا إلى غاية 6 ملاعق كبيرة.

الأطفال :

من سنتين إلى 5 سنوات : 1 ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم

أكثر من 5 سنوات : 2 ملاعق صغيرة 3 مرات في اليوم

طريقة تناول الدواء :

ترميوتين® 150 ملغ، كبسولة و أكياس

عن طريق الفم.

يتعين إذابة محتوى الأكياس في كوب من الماء.

تبلغ الكبسولات مع كوب من الماء.

ترميوتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب :

عن طريق الفم.

طريقة تحضير المزيج المعلق للشرب

إذخال الماء المعدني غير الغازي أو المثلل عبر مراحل إلى غاية عنق القارورة.

تغلق القارورة وتحرك تدريجيا إلى غاية الحصول على خليط متجانس.

يصبح المحلول جاهزا للاستعمال.

من المناسب تحريك القارورة جيدا قبل الاستعمال.

جرعة زائدة :

إذا تناولت كمية من تريميتين® أكثر مما ينبغي، استشر طبيبك.

تعليمات في حال نسيان تناول جرعة واحدة أو عدة جرعات :

لا يوجد أي موضوع.

خطر الإصابة بمتلازمة الانسحاب :

لا يوجد أي موضوع.

آثار غير مستحبة :

كباري الأدوية، يمكن لتريميتين® التسبب في ظهور أعراض غير مستحبة لا يعاني منها كل المرضى الذين يتناولون هذا الدواء.

تفاعلات جلدية نادرة.

إن شعرت بأي أثر غير مستحب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي. ينطبق ذلك كذلك على أي أثر غير مستحب لم يرد ذكره بهذه النشرة.

الإبلاغ عن الآثار غير مستحبة

إن شعرت بأي أثر غير مستحب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي.

ينطبق ذلك كذلك على أي أثر غير مستحب لم يرد ذكره بهذه النشرة. يمكنك الإبلاغ عن الآثار غير مستحبة مباشرة أو من خلال المركز المغربي للبيظة الدوائية بالمغرب.

من خلال الإبلاغ عن الآثار غير المستحبة، فانت تساعد على توفير مزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

التخزين :

ترميوتين® 150 ملغ كبسولة

ليست هناك احتياطات خاصة للتخزين.

ترميوتين® 150 ملغ أكياس

يحفظ بهذا الدواء بعيدا عن الحرارة.

ترميوتين® 0,787 % حبيبات للمزيج المعلق للشرب. قارورة من فئة 250 ملل

قبل التحضير : ليست هناك احتياطات خاصة للتخزين.

بعد التحضير : لا يجب الاحتفاظ بالمحلول أكثر من أربعة أسابيع في درجة حرارة الغرفة.

يرجى إبعاد الدواء عن متناول الأطفال.

شروط التسليم :

القائمة رقم 2

التهوية :

يرجى عدم استعمال تريميتين® بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المرح على ظهر العبوة.

تاريخ مراجعة النشرة :

غشت 2017

اسم وعنوان الجهة المصرح لها بتسويق الدواء

مختبرات الصيدلة فارميد

21، زقاق البرجي الدار البيضاء المغرب

موقع التصنيع : المنطقة الصناعية اولاد صالح - بوسكورة - المغرب

NEALGYL® 80 mg

Phloroglucinol

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition :
Phloroglucinol hydraté 80,00 mg quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à 62,25 mg pour un comprimé orodispersible
Excipients : Aspartam, lactose

Forme pharmaceutique

Comprimé orodispersible par voie orale
Existe en boîte de 10, 20 et 30 comprimés orodispersibles

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE
(à effet métabolisme)
(à effet métabolisme)
(à effet métabolisme)

À UTILISER CE MEDICAMENT

Indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques les biliaires, de la vessie et de l'utérus.

ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)
- DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des
- IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
- IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
- IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
- IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
OTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi et autres interactions

VENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS
FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT A VOTRE
T EN COURS A VOTRE MEDICIN OU A VOTRE

Grossesse - Allaitement
L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire. L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

D'UNE FACON GENERALE IL COMIENT AU COURS DE LA
GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUTOURS DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MEDICIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT
D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Excipient(s) qui ont un effet notoire :
Aspartam, lactose

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie
Chez l'adulte : la posologie usuelle est de 2 comprimés orodispersibles par jour, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.
Chez l'enfant : 1 comprimé orodispersible 2 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale
Chez l'adulte : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sur la langue pour obtenir un effet rapide.
Chez l'enfant : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Quelques très rares réactions cutanées allergiques.
- En raison de la présence du lactose, les patients atteints de maladies héréditaires rares telles qu'intolérance au galactose, déficit en lactase ou malabsorption du glucose ou du galactose ne doivent pas prendre ce médicament.
- Les comprimés orodispersibles contiennent de l'aspartam, qui se métabolise en phénylalanine, pouvant être nocif chez les personnes présentant une phénylcétonurie.

SIGNALEZ A VOTRE MEDICIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Précautions particulières de conservation

Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 30°C et à l'abri de l'humidité.

NEALGYL® 80 mg

Phloroglucinol

30 comprimés orodispersibles



6 118000 041528

PPV 500 100 100 100
PMR 100 100 100 100
LOT 100 100 100 100

50,40

b

82, Allée des Cassegrains - Ain Seckla - Casablanca
S. Bachouch - Pharmacien Responsable

bottu s.a