

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie, orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## ptique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



## Déclaration de Maladie

Nº M21- 0004753

66832

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 89521 Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HAJJAMI Hassan

Date de naissance : 18/02/1964

Adresse : HAJJAMI Hassan, Rue 14 Noghty Hassan, Casablanca

Casablanca

Tél. : 0660792667 Total des frais engagés : 66.12 DH Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Dr. Mohamed EL AMRANI  
Néphrologie Diplômé de l'ULB  
Ancien interne Hôpital Necker  
PARIS  
252, Bd Ibn Sina, Casablanca  
Tél. 05 22 39 13 12

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cachet du médecin :

Date de consultation : 08/04/2021

Nom et prénom du malade : HAJJAMI Hassan Age :

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : IRCC modéré + Gouttes

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 09/04/2021

Signature de l'adhérent(e) :

Hassan

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
08/04/2024	C2	20010		 <b>Dr. Amien Interne</b> <b>Néphrologue</b> <b>Amien Interne</b> <b>Hôpital Necker</b> <b>PARIS</b> <b>06 22 39 13 12</b> <b>06 22 39 13 12</b>

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE POLYCLINIC Dr. TIR Abdellatif 88, ROUTE MY Thami Tel: 0522 90 2</i>	8/04/81	416610

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# CENTRE DE DIALYSE KHEIR

Dr. Mohamed ELAMRANI

Néphrologue diplômé de l'ULB

Ancien interne hôpital Necker - Paris  
Membre société française de néphrologie et  
De la société européenne de transplantation rénale

الدكتور محمد العمراني  
اختصاصي في أمراض الغللي من بروكسيل  
ممب داخلي سابق بمستشفى نكير بباريس  
عضو بالجمعية الفرنسية ل أمراض الكلى  
وعضو بالجمعية الأوروبية ل أمراض الكلى



090001116

CASABLANCA, LE

03 / 04 / 2021

① R HASSANI HASSANI

939.00

313.00x3

(3 بوكس)

210.00 200 - 1

351.00x9

(9 بوكس)

180.00 100 - 1

115.00

315.00

PHARMACIE POLYCLINIQUE

Dr. TIR Abdelaziz

58, Route Mly Thami Hay Hassan,  
Tél: 0522 90 21 67 Casa

63.00

466.10

Dr. Mohamed EL AMRANI  
Néphrologie Diplômé de l'ULB  
Ancien Interne Hôpital Necker  
PARIS  
252, Bd Ibn Sina, Casablanca  
Tél: 05 22 39 13 12

05 22 39 13 12 - 252 شارع ابن سينا - الدار البيضاء - الهاتف :

Centre de Néphrologie et d'Hémodialyse KHEIR- 252 Bd Ibnou Sina, Casablanca - Tél.: 05 22 39 13 12

Fax : 05 22 36 72 69 - E-mail : mohamed.elamrani1964@gmail.com -INP : 7195094 -INPE : 091047431

PPV: 56,30 DH  
LOT: 20K26D  
EXP: 11/2022

LOT 202597  
EXP 10 2024  
PPV 31.30

31,30



LOT 202597  
EXP 10 2024  
PPV 31.30

31,30



LOT 202597  
EXP 10 2024  
PPV 31.30

31,30



# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

## EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

## LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

## SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

## NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

## EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

## LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

## SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

## NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

### EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

### LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

### COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

### SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

### EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

### CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

### NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

### EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

### LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

### COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

### SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

### EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

### CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

### NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

## EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

## LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

## SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

## NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

## EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

## LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

## SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

## NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

## EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

## LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

## SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

## NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

## EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

## LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

## SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

## EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

## NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2

# Bécidouze®

(Complexe vitaminique B1 - B6 - B12)

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Comprimés dragéifiés : Boîte de 20

## COMPOSITION :

Thiamine mononitrate (vit. B <sub>1</sub> )	250 mg
Pyridoxine chlorhydrate (vit. B <sub>6</sub> )	250 mg
Cyanocobalamine (vit. B <sub>12</sub> )	1,8 mg
Excipients q.s.p.	1 comprimé dragéifié

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Vitamines du groupe B.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité avérée à la Vitamine B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub> ou B<sub>12</sub> ou à l'un des excipients.
- Lévodopa.
- Tumeur maligne : en raison de l'action de la vitamine B<sub>12</sub> sur la croissance des tissus à taux de multiplication cellulaire élevé, le risque de poussée évolutive doit être pris en compte.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne peut être administré en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

saccharose : 366,67 mg, en tenir compte chez les patients diabétiques.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Association contre-indiquée

Vitamine B<sub>6</sub>

- Lévodopa

Inhibition de l'activité de la lévodopa lorsqu'elle est utilisée sans inhibiteur de la dopadécarboxylase périphérique.

Eviter tout apport de pyridoxine en l'absence d'inhibiteur de la dopadécarboxylase.

### Association à prendre en compte

Vitamine B<sub>12</sub>

- Antisécrétaires antihistaminiques H2

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

- Antisécrétaires inhibiteurs de la pompe à protons

Risque de carence en cyanocobalamine après traitement prolongé (quelques années), la réduction de l'acidité gastrique par ces médicaments pouvant diminuer l'absorption digestive de la vitamine B<sub>12</sub>.

## GROSSESSE ET

### Grossesse

Par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

### Allaitement

En l'absence de données, il est recommandé de ne pas prendre ce médicament pendant l'allaitement.

### EFFETS SUR L'APPAREIL MACHINES :

Sans objet.

### LISTE DES EXCIPIENTS

Saccharose.

### COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

2 à 3 comprimés dragéifiés par jour à avaler sans croquer au milieu des repas.

### SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSE

Des manifestations neurologiques à type de somnolence et/ou de paresthésie ont été signalées à fortes doses et/ou en cures prolongées de chlorhydrate de pyridoxine. Ces manifestations sont réversibles à l'arrêt du traitement. Le traitement est symptomatique.

### EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Vitamine B<sub>12</sub>

Réactions allergiques : prurit, urticaire, eczéma, érythème, œdème pouvant être sévère : choc anaphylactique, ou œdème de Quincke.

Risque d'acné.

Coloration rouge des urines (correspondant à l'élimination urinaire de la vitamine B<sub>12</sub>).

- Vitamine B<sub>6</sub>

Des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement ont été signalées après de fortes doses et/ou en cures prolongées de vitamine B<sub>6</sub>.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A LEUR SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

### CONSERVATION

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quel sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

### NE LAISSEZ PAS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord  
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

101000F56051P021213

BECIDOUZE

PPV 35DH10

EXP 01/2024

LOT 00005 2