

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M20- 0000876

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

67 53

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8482 Société : RAM

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : MOULGOUMRI Mustafa

Date de naissance : 04.03.58

Adresse : maw

Tél. : 0661928624 Total des frais engagés : 668 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☒ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : aff ORL

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa

Le : 01.04.2021

Signature de l'adhérent(e) :



[illegible][illegible][illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'occlusion.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th>D</th> <th>G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'occlusion.

[illegible]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXEC

Casablanca, le

22.03.2021

M. Kandil Ring

78.00
1) Betaseric



2) 134.80 - 1 - 1 - 1 / r (1 mois)
Tan gavit



1 - 1 - 1 / r (10 j)

368,80

ALAOUT MOHAMMED
PHARMACIE MV ABDELLAH
Rue 300, N° 88 - Ain Chock
Hôpital Med Sekkat - Casablanca
Tél: 05.22.21.73.64



Angle boulevard Nador et Atlantide, quartier POLO - Casablanca

Tél.: 0522 79 33 00 / 0522 21 80 31 - Fax : 0522 21 32 95

E-mail : avicenne.clinic1@gmail.com

بيتاسرك

24 ملغ ديكلورهيدرات البيتاهاستين

أقراص

تحذير
تحذير
اخبر
تعاني
بواسطة

78,00

خطر حدوث تقلص القصات.

لدى المرضى المعانين من سوابق القرحة الاثنا عشرية، يتطلب استعمال بيتاهاستين مراقبة خاصة طويلة مدة العلاج.

لا يعتبر بيتاسرك علاجاً مناسباً لأشكال الدوار التالية:

• نوبات الدوار الانتيابي الحميد،

• دوار مرتبط بإصابة للجهاز العصبي المركزي.

احتياطات الاستعمال

تناول الأقراص وسط الوجبات لتفادي آلام المعدة.

اقصد الطبيب أو الصيدلي قبل تناول بيتاسرك 24 ملغ،

أقراص.

أدوية أخرى وبيتاسرك 24 ملغ، أقراص

اخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد

تتناول أي دواء آخر.

الحمل والرضاعة

من المستحب عدم استعمال هذا الدواء خلال الحمل أو الرضاعة.

إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج، استشري الطبيب لأنه الوحيد

القادر على تحديد ضرورة متابعته.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا اعتقدت أنك حامل أو تنوين الحمل،

استشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

ليس لدواء بيتاسرك 24 ملغ، أقراص تأثيراً أو لديه تأثيراً ضئيلاً من شأنه

تغيير القدرة على قيادة سيارة أو استعمال آلات.

3. كيف يجب استعمال بيتاسرك 24 ملغ، أقراص؟

احرص دائماً على تناول هذا الدواء بالاحترام التام لتعليمات الطبيب.

تحقق لدى الطبيب أو الصيدلي في حالة الشك.

الجرعات

الجرعة الاعتيادية هي 1 قرص، 2 مرات في اليوم.

يستعمل هذا الشكل من الدواء عندما تحتاج إلى جرعة 48 ملغ في

اليوم من بيتاهاستين. في الحالات الأخرى، سيصف لك الطبيب جرعة أقل.

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء،

لأنها تضم معلومات هامة من أجلك.

• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسئلة أخرى، استفسر لدى الطبيب أو الصيدلي.

• لا تأخذ تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه

لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسبب

الضرر له.

• إذا شعرت بأحد التأثيرات غير المرغوب فيها، اخبر الطبيب أو

الصيدلي. وينطبق ذلك على أي تأثير غير مرغوب فيها لم يذكر في

هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

1. ما هو بيتاسرك 24 ملغ، أقراص وما هي الحالات التي يجب

استعماله فيها؟

المنصف الصيدلي العلاجي-مزمع-ATC:

يحتوي هذا الدواء على مادة فعالة تسمى بيتاهاستين. وينتمي إلى فئة

الأدوية المسماة مضادات الدوار. يقاوم الدوار.

يوصف في بعض أشكال الدوار.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بيتاسرك 24 ملغ،

أقراص؟

لا تستعمل أبداً بيتاسرك 24 ملغ، أقراص:

• إذا كنت تعاني من حساسية للمادة الفعالة أو لأحد مكونات هذا

الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من زائدة غير عادية للغدة الكظرية التي قد تسبب

ارتفاعاً حاداً للضغط (ورم خلايا الكروماتين القائمة).

لا تتناول بيتاسرك أبداً إذا كنت معنياً بإحدى الحالات أعلاه. في حالة

الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

بييتاسرك

24 ملغ ديكلورهيدرات البيتاهايستين

أقراص

تحذير
تحذير
اخبر
تعاني
بواسطة

78,00

خطر حدوث تقلص القصات.

لدى المرضى المعانين من سوابق القرحة الاثنا عشرية، يتطلب استعمال بيتاهايستين مراقبة خاصة طيلة مدة العلاج.

لا يعتبر بيتاسرك علاجاً مناسباً لأشكال الدوار التالية:

• نوبات الدوار الانتيابي الحميد،

• دوار مرتبط بإصابة للجهاز العصبي المركزي.

احتياطات الاستعمال

تناول الأقراص وسط الوجبات لتفادي آلام المعدة.

اقصد الطبيب أو الصيدلي قبل تناول بيتاسرك 24 ملغ،

أقراص.

أدوية أخرى وبيتاسرك 24 ملغ، أقراص

اخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد

تتناول أي دواء آخر.

الحمل والرضاعة

من المستحب عدم استعمال هذا الدواء خلال الحمل أو الرضاعة.

إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج، استشري الطبيب لأنه الوحيد

القادر على تحديد ضرورة متابعته.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا اعتقدت أنك حامل أو تنوين الحمل،

استشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

ليس لدواء بيتاسرك 24 ملغ، أقراص تأثيراً أو لديه تأثيراً ضئيلاً من شأنه

تغيير القدرة على قيادة سيارة أو استعمال آلات.

3. كيف يجب استعمال بيتاسرك 24 ملغ، أقراص؟

احرص دائماً على تناول هذا الدواء بالاحترام التام لتعليمات الطبيب.

تحقق لدى الطبيب أو الصيدلي في حالة الشك.

الجرعات

الجرعة الاعتيادية هي 1 قرص، 2 مرات في اليوم.

يستعمل هذا الشكل من الدواء عندما تحتاج إلى جرعة 48 ملغ في

اليوم من بيتاهايستين. في الحالات الأخرى، سيصف لك الطبيب جرعة

أقل.

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء،

لأنها تضم معلومات هامة من أجلك.

• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسئلة أخرى، استفسر لدى الطبيب أو الصيدلي.

• لا تأخذ تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه

لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسبب

الضرر له.

• إذا شعرت بأحد التأثيرات غير المرغوب فيها، اخبر الطبيب أو

الصيدلي. وينطبق ذلك على أي تأثير غير مرغوب فيها لم يذكر في

هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

1. ما هو بيتاسرك 24 ملغ، أقراص وما هي الحالات التي يجب

استعماله فيها؟

المنصف الصيدلي العلاجي-ATC:

يحتوي هذا الدواء على مادة فعالة تسمى بيتاهايستين. وينتمي إلى فئة

الأدوية المسماة مضادات الدوار. يقاوم الدوار.

يوصف في بعض أشكال الدوار.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بيتاسرك 24 ملغ،

أقراص؟

لا تستعمل أبداً بيتاسرك 24 ملغ، أقراص:

• إذا كنت تعاني من حساسية للمادة الفعالة أو لأحد مكونات هذا

الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من زائدة غير عادية للغدة الكظرية التي قد تسبب

ارتفاعاً حاداً للضغط (ورم خلايا الكروماتين القائمة).

لا تتناول بيتاسرك أبداً إذا كنت معنياً بإحدى الحالات أعلاه. في حالة

الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

بيتاسرك

24 ملغ ديكلورهيدرات البيتا هستين

أقراص

تحذير
تحذير
اخبر
تعاني
بواسطة

78,00

خطر حدوث تقلص القصات.

لدى المرضى المعانين من سوابق القرحة الاثنا عشرية،
يتطلب استعمال بيتا هستين مراقبة خاصة طيلة مدة
العلاج.

لا يعتبر بيتاسرك علاجاً مناسباً لأشكال الدوار التالية:

• نوبات الدوار الانتيابي الحميد،

• دوار مرتبط بإصابة للجهاز العصبي المركزي.

احتياطات الاستعمال

تناول الأقراص وسط الوجبات لتفادي آلام المعدة.

اقصد الطبيب أو الصيدلي قبل تناول بيتاسرك 24 ملغ،

أقراص.

أدوية أخرى وبيتاسرك 24 ملغ، أقراص

اخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد

تتناول أي دواء آخر.

الحمل والرضاعة

من المستحب عدم استعمال هذا الدواء خلال الحمل أو الرضاعة.

إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج، استشري الطبيب لأنه الوحيد

القادر على تحديد ضرورة متابعته.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا اعتقدت أنك حامل أو تنوين الحمل،

استشري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

ليس لدواء بيتاسرك 24 ملغ، أقراص تأثيراً أو لديه تأثيراً ضئيلاً من شأنه

تغيير القدرة على قيادة سيارة أو استعمال آلات.

3. كيف يجب استعمال بيتاسرك 24 ملغ، أقراص؟

احرص دائماً على تناول هذا الدواء بالاحترام التام لتعليمات الطبيب.

تحقق لدى الطبيب أو الصيدلي في حالة الشك.

الجرعات

الجرعة الاعتيادية هي 1 قرص، 2 مرات في اليوم.

يستعمل هذا الشكل من الدواء عندما تحتاج إلى جرعة 48 ملغ في

اليوم من بيتا هستين. في الحالات الأخرى، سيصف لك الطبيب جرعة

أقل.

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء،

لأنها تضم معلومات هامة من أجلك.

• احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.

• إذا كانت لديك أسئلة أخرى، استفسر لدى الطبيب أو الصيدلي.

• لا تأخذ تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه

لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسبب

الضرر له.

• إذا شعرت بأحد التأثيرات غير المرغوب فيها، اخبر الطبيب أو

الصيدلي. وينطبق ذلك على أي تأثير غير مرغوب فيها لم يذكر في

هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

1. ما هو بيتاسرك 24 ملغ، أقراص وما هي الحالات التي يجب

استعماله فيها؟

المنصف الصيدلي العلاجي - ATC:

يحتوي هذا الدواء على مادة فعالة تسمى بيتا هستين. وينتمي إلى فئة

الأدوية المسماة مضادات الدوار. يقاوم الدوار.

يوصف في بعض أشكال الدوار.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول بيتاسرك 24 ملغ،

أقراص؟

لا تستعمل أبداً بيتاسرك 24 ملغ، أقراص:

• إذا كنت تعاني من حساسية للمادة الفعالة أو لأحد مكونات هذا

الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من زائدة غير عادية للغدة الكظرية التي قد تسبب

ارتفاعاً حاداً للضغط (ورم خلايا الكروماتين القائمة).

لا تتناول بيتاسرك أبداً إذا كنت معنياً بإحدى الحالات أعلاه. في حالة

الشك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

134,80

LOT
EXP
PPV202360
10 2024
134.80

نوتروبييل 800 ملغ

علبة من فئة 1
بيراسيتاه

- إذا كنت ستخضع لعملية
- إذا كنت تعاني من اضطراب

احتياطات الاستعمال
- في حالات القصور الكلوي
حتى يتمكن من ضبط الجرعة

استعمال أدوية أخرى
إذا كنت تتناول أو تناولت
أحصل عليها دون وصفة
الصيدلاني الخاص بك.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.
احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
إذا كان لديك أسئلة أخرى أو إذا لم تكن متأكدًا، اطلب
المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.
لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم
بإعطائه لشخص آخر حتى في حال وجود أعراض
مشابهة، لأنك قد تسبب الضرر له.
إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيرًا أو إذا لاحظت أي آثار
غير مذكورة في هذه النشرة، يرجى إخبار طبيبك أو
الصيدلاني الخاص بك.

في هذه النشرة :

1. ما هو نوتروبييل 800 ملغ، أقراص مغلفة، وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال نوتروبييل 800 ملغ، أقراص مغلفة؟
3. كيف يجب استعمال نوتروبييل 800 ملغ، أقراص مغلفة؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يجب حفظ نوتروبييل 800 ملغ، أقراص مغلفة؟
6. معلومات إضافية

3. كيف يجب استعمال
مغلفة؟

1. ما هو نوتروبييل 800 ملغ، أقراص مغلفة، وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

الجرعة
يتم تحديد الجرعة من قبل
على سبيل الاستدلال.
الاضطرابات الطفيفة
الاضطرابات الحسية الع
وفي حالات الدوخة هي
مساء، أي 3 أقراص في الي
تعتبر قطرات الشرب ال
للأطفال.
في كل الحالات، امثل بدق

منبهات نفسية أخرى و منشطات دهنية.

يوصف هذا الدواء في الحالات التالية:

لدى البالغين :

- العلاج التكميلي لعلاجات الاضطرابات الطفيفة
الزمنية (نقص الادراك أو الاضطرابات الحسية العصبية)
المتعلقة بالشيخوخة (باستثناء مرض الزهايمر و أمراض
الخرف الأخرى).
- علاج أعراض الدوخة.

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم.
قم ببلع القرص مع القليل

لدى الأطفال الذين تتجاوز أوزانهم 30 كلغم (أي ابتداءً من
حوالي 9 سنوات) :
- عسر القراءة.

وتيرة الاستعمال

في كل الحالات، امثل بدق

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال نوتروبييل 800 ملغ، أقراص مغلفة؟

لا تستعمل أبدا نوتروبييل 800 ملغ، أقراص مغلفة في
الحالات التالية :

إذا استعملت نوتروبييل 800
يجب :
استشر فوراً الطبيب أو الصيدلاني

- حساسية معروفة لمادة بيراسيتام، لأحد مشتقات
بيروليدون أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- خلل خطير في وظائف الكلى.
- نزيف دماغي.
- مرض هنتنغتون (تفاقم الأعراض).

إذا نسيت أخذ نوتروبييل
لا تتناول جرعة مضاعفة
تناولها.