

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie et la validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- Dentiste praticien est exigé pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignette une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (soin(s) plus confidentiel(s) doivent être joints à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement).
- Un(s) confidentiel(s) du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin prescripteur à la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin opticien et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- Contente préalable renseigné par le médecin prescripteur est exigé avant le début des séances de rééducation.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins à l'éditeur avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les ans.

Adresses Mails utiles :

- Réclamation : contact@mupras.com
 Personne en charge : personne@mupras.com
 Activation et entretien de statut : activation@mupras.com

La MUPRAS décline toute responsabilité en cas de non-respect des recommandations énoncées ci-dessus. Elle adhère à la protection de la vie privée dans le respect des réglementations en vigueur.

MUPRAS


Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-478773

6883U

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : 509			
Société : Veuve de Khattabi Ibrahim			
<input type="checkbox"/> Actif <input type="checkbox"/> Pensionné(e) <input type="checkbox"/> Autre			
Nom & Prénom : Moumen Khaddouj			
Date de naissance : 01/01/1963			
Adresse : Habous Tchami, impasse E N°15 Oulfa			
Téléphone : 784,60			
Total des frais engagés : Dhs			
Cadre réservé au médecin			
Cachet du médecin : MUPRAS - ACCUEIL H. HAKANI - AVR. 2021			
Dr. Mohamed Mehdi ALAOUI Spécialiste des Maladies du Coeur et des Vaisseaux			
Barcode : 091171926			
Date de consultation : 01/04/2021			
Nom et prénom du malade : Moumen Khaddouj			
Lien de parenté : Lui-même			
Nature de la maladie : Bronchite			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances : malaise			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements au médecin conseil de la Mutuelle.			
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus et je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection de la vie privée de la Mutuelle.			
Fait à : DR. MOHAMED MEHDI ALAOUI			
Signature de l'adhérent(e) : [Signature]			



RELEVE DES FRAIS ET DES CHARGES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Désignation des Honoraires	Cachet et signature du Fournisseur
-----------------	------------------	--------------------------------------	------------------------------------

14-01-2021 Ces + 300,00

DR. Mohamed Mehd ALAOUI
Spécialiste des Maladies du Coeur
et des Viscères

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

17-04-2021 12460

DR. Mohamed Mehd ALAOUI
Spécialiste des Maladies du Coeur
et des Viscères

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien

Date des Soins

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

	AM	PC	TM	VI

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

DES TRAVAUX	
MONTANT DES SOINS	
DEBUT DE L'EXÉCUTION	
FIN DE L'EXÉCUTION	
DÉFINITION DES TRAVAUX	
MONTANT DES SOINS	
DATE DE LA REVISITE	
DATE DE L'EXÉCUTION	
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION	

Moumen
Khaddouj
245 E
--
17.04.2021
13:06:13

Né le : 01.01.1963
Sexe : Féminin
Taille : -- cm
Poids : -- kg
PA : -- / -- mmHg
Origine : Non défini


FC :	53 /min	RR :	1129 ms
Axe P :	41 °	P :	125 ms
Axe QRS :	-48 °	PQ :	173 ms
Axe T :	44 °	QRS :	149 ms
		QT :	484 ms
		QTc :	456 ms

Validé par :
Rythme sinusal
Position hypergauche
Bloc de branche droit
Hémibloc antérieur gauche
Bloc de branche bifasciculaire
ECG anormal

Dr. Mohamed Mehdi ALAOUI
Spécialiste des Maladies du Coeur
et des Vaisseaux

Lot Moulay Thami, N° 141 Bd. HH24 Elg 1/Appt 6.
(Rond Point George) El Oued - Casablanca
Tel. : 06 22 01 34 34 - Gam : 06 16 50 82 74

Émetteur de la



V1

V2

V3

V4

V5

V6

FPB 25 Hz, CA 50Hz

10 mm/mV, 25 mm/s

تشخيص أمراض القلب والشرايين

CABINET DE CONSULTATION & EXPLORATIONS CARDIO-VASCULAIRES

- تحضيط القلب • فحص القلب بالصدى • فحص الضغط الدموي • تحضيط القلب بالهولتير • فحص اختبار الجهد
- Electrocardiogramme • Echocardiographie Doppler • MAPA • Holter-ECG • Epreuve d'effort

Dr. MOHAMED MEHDI ALAOUI

SPÉIALISTE DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX

د. محمد المهدى العلوي

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

Casablanca, le : 17 AVR 2021 الدار البيضاء، في :

Moulay Thami
Rond Point George

141

39.80

52.90



PPV	97DH80
PER	04/22
LOT	J3618-4

PPV:39DH80
PER:12/23
LOT: J3624

Lot. Moulay Thami, N° 141 Bd HH24 - Appt 6 -1er étage (Rond point George) El Oulfa - Casablanca

مولاي التهامي، الرقم 141 ، شقة 6 الطابق الأول (مدار جورج) الولفة - الدار البيضاء

05 22 01 34 34 - Urgences : 06 16 50 82 74



كوفرسيل® ٥ ملغ

بيراندوبيريل أرجينين ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر

١٩١٨٠

بروكابين تيد (العلاج [اضطرابات ضربات القلب] ، او في علاج الروماتيزم، او نورايتريات، او ادينات)، او

الاملاح الذهنية و خاصة المقوية غير الوريد (المستعملة في علاج اعراض التهاب المفاصل الروماتويدي).

كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر مع الطعام والشراب ستحسن اخذ كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر قبلوجة الطعام.

اعمل والضاعة إذا كنت حامل او مرضاها، او تعقددين بذلك حامل او تحظين للإعماق، عليك باستشارة الطبيب او الصيدلاني قبل اخذ الدواء.

اعمل من المفترض ان تعملي طبيك إن كنت تعذبين بذلك حامل (او إن كنت تعذبين الحمل).

فقط يطلب منك طبيك التوقف عن اخذ كوفرسيل ٥ ملغ حبات ملتبسة قابلة للنكسر قبل وقوع الحمل او مجرد ظهوره، كما يصف لك دواء آخر بدلاً عن كوفرسيل ٥ ملغ حبات ملتبسة قابلة للنكسر.

لا ينصح بالأخذ كوفرسيل ٥ ملغ حبات ملتبسة قابلة للنكسر في بداية الحمل، كما ينصح اخذ قطعية بعد الشهر الثالث من الحمل، حيث أنه يشكل خطراً على الجنين.

اعمل طبيك إن كنت تعذبين (أو على وشك الإرضاع).

لا يجوز استعمال كوفرسيل ٥ ملغ حبات ملتبسة قابلة للنكسر في بداية حالة المرض. فإن كنت مصراً على الإرضاع، فسوس بختار ذلك طبيك علاجاً آخر، وخاصة إن كان مفعلك حدثت الولادة او إن كانت ولادته مبكراً.

قيادة السيارات واستعمال الآلات إن كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر لا يؤثر على البقاءة، لكن قد يظهر إحساس بالدور او بالتعب لدى بعض المرضى نتيجة لانخفاض الضغط الشرياني. لذا فقد تخفى القدرة على قيادة السيارات او العمل على الآلات.

يمحوكي كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر على سكري الحلبي (لاكتوز) في حالة اهمالك طبيك بآن جسمك لا ينتهي بعض النوع السكر، عليك براجعته قبل اخذ الدواء.

3. كيف يأخذ كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر؟ علىك دائم الالتزام بتناول هذا الدواء بالطريقة التي وصفها لك طبيك. فإن لم تكن متاكداً، عليك استشارة طبيك.

تلعّل المغة مع كأس من الماء، وستحسن اخذها يومياً في نفس الميعاد اي في الصباح قبل وجة الأطفار.

إن طبيك هو الذي يقرر مقدار المرة اليومية لوضعك.

بتراويخ مقدار المرة اليومية لها كالتالي:

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

اححفظ بهذه النشرة، فقد تحتاجها لستند إليها من جديد.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني او الممرض (ة).

لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. فلا يجوز إطلاقاً اعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تلحق بهضر.

إذا شعرت بماي آثار جانبية تكلم مع الطبيب او الصيدلاني او الممرض (ة). هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المنسلي بها في هذه النشرة (انظر إلى مقطع 4 : ما هي الآثار الجانبية المحسنة؟)

في هذه النشرة:

1. ما هو كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر وفي أي حالة يستعمل؟

2. ما هي المعلومات المرفوعة معها كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر؟

3. كيف يأخذ كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر؟

4. ما هي الآثار الجانبية المحسنة؟

5. كيف ينحفظ كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر؟

6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية.

1. ما هو كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر وفي أي حالة يستعمل؟

الآفة العلاجية الصيدلانية: مثبتات حميرة التحويل (IEC)

C09AA04 ATC: IEC

كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر، هو عامل القلب في ضخ الدم عبرها.

على توسيع الأوعية الدموية سهلاً بهذا عامل القلب في ضخ الدم عبرها.

يستخدم كوفرسيل ٥ ملغ، حبات ملتبسة قابلة للنكسر:

في علاج ارتفاع الضغط الشرياني.

في حالة تضيق القولون العصبي.



KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

LOT : 21E002
PER.: 09/2022
KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

surve

CONT

Gross:

6 118000 061847

P.P.V : 30DH70



e d'aspirine est
rossette (cf.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique,
- En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j),
- En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT pas être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j) (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservez à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j).



KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI

LOT : 21E002
PER.: 09/2022
KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

surve

CONT

Gross:

6 118000 061847

P.P.V : 30DH70



e d'aspirine est
rossette (cf.

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION

PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament :

(Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique,
- En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j),
- En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT pas être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j) (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservez à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce médicament ne contenant pas de sodium (sel), il peut être administré en cas de régime désodé ou hyposodé.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN notamment si vous prenez des anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou de l'héparine, des uricosuriques ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j).

97.60

Siwak 80



3 10 1.80 X2 - 0 - 1

Gras 1



30.10

Leau 1

ALAOUI HEIKEL
Docteur en Pharmacie
FRANCE
Lot MY Thami
Bd. HH24 - El Oufita - CASABLANCA
Tél. : 05 22 01 34 34 - Gym : 06 15 30 82 74

Dr. Mohamed Mehdi ALAOUI
Spécialiste des Maladies du Coeur
et des Vaisseaux

Lot Moulay Thami, N° 141 Bd. HH24 Elg 1 Appt 6,
(Rond Point George) El Oufita - Casablanca
Tél. : 05 22 01 34 34 - Gym : 06 15 30 82 74

T - 1424.60

سيارات سماحة

مغنيسيوم

فطريات الخميرة

٣٢١٩٥

30 أمبولة للشرب من فئة ١٥ مل