

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **ditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **armacie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **diologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **optique :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **éducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **entaire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Réclamation	: contact@mupras.com
Prise en charge	: pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

**Maladie**

**Dentaire**

**Cadre réservé à l'adhérent (e)**

Matricule : 2335

Société : RAM

**Actif**

**Pensionné(e)**

Nom & Prénom :

KAISSE

**Autre :**

Mohamed

Date de naissance :

1er 07 1951

Adresse :

LOT N° 60 Résidence EL FELLAH  
DAR OULD Zi DOU H.

Tél. :

06 61 93 98 77 Total des frais engagés : 439,60 Dhs

**Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :



Date de consultation :

26 AVR 2021

Nom et prénom du malade :

Mr KAISSE

Lien de parenté :

**Lui-même**

**Conjoint**

**Enfant**

Nature de la maladie :

Affet

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Dar Ould Zi Douh

Le : 26.10.2021

Signature de l'adhérent(e) :



Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
6 AVR 2021			120 Dhs	

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. MOUDRI Lakbir Dar Ouled Zidouh 22080880 Pharmacie Populaire Dr. MOUDRI Lakbir Dar Ouled Zidouh Tel : 0523465479	26/12/2021	25.50 Dhs Pharmacie Populaire Dar Ouled Zidouh Tel : 0523465479
IMP 22080880	03/05/2021	36.20 Dhs Pharmacie Populaire Dar Ouled Zidouh Tel : 0523465479

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS
	D 00000000	G 00000000		DATE DU DEVIS
	B 35533411			DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BENNIS M. Mekki

Expert Assermenté

Elément L.N Médecine de Travail

Elément L.N Médecine de Sport

Spécialiste Coloposcopie

Echographie

Diététique et Nutrition

Maladie du Sein



INPE : 121026587

الدكتور بنيس محمد المكي

خبير ملحق

عضو ج.م. لطب الشغل

عضو ج.م. لطب الرياضة

الشخص بالصدى



Dar Ouled Zidouh, le

26 AVR 2021

121026587


KAISSE Mekki

— Diagnosis SV  
By  
— Brief of 15 SV  
140 x 293 Per

140.00

— Order by SV

= 253,40.



شارع الحسن الأول - دار ولد زيدوح - الهاتف: 05.23.46.50.62



# OEDES® 40mg

Microgranules gastro-résistants en gélules  
(Oméprazole)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la re lire.

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT:

Forme pharmaceutique et présentation :  
OEDES® 40mg, Microgranules gastro-résistants en boîtes de 7, 14, 28 et 56.

## 2. COMPOSITION DU MEDICAMENT :

Principe actif:

Oméprazole ..... 40 mg

EXCIPIENTS : q.s.p une gélule.

Liste des Excipients à effet notable : Saccharose.

3. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE :  
OEDES contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

## 4. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Chez les adultes :

• Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

• Les ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Oedes 40mg peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

• Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

### Chez les enfants :

• Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (RGO) tels que brûlures et régurgitations acides :

- Enfants âgés d'un an ou plus et avec un poids corporel entre 10 et 20 Kg : OEDES 40 mg n'est pas adapté à cette tranche d'âge.

- Enfants âgés de 2 ans ou plus et avec un poids corporel de plus de 20 Kg : OEDES 40 mg peut être prescrit chez cette tranche d'âge.

• Traitement des ulcères provoqués par une infection par Helicobacter pylori chez les adolescents et enfants de plus de 4 ans : OEDES 40 mg n'est pas adapté à cette tranche d'âge.

## 5. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL NE PEUT ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS,

- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance du médecin.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

### Adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide :

• Si votre médecin constate que votre œsophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4-8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore cicatrisé.

• La dose recommandée une fois que votre œsophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

• Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

Traitement des ulcères dans la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) :

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

• Si l'ulcère n'a pas été complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

## Traitement des ulcères de l'estomac (ulcère gastrique) :

• La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre la même dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas été cicatrisé.

• Si l'ulcère n'est pas complètement cicatrisé, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prévention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

### Prevention de la récidive de l'ulcère duodénal ou gastrique

La dose recommandée est de 10 mg ou 20 mg une fois par jour pendant 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

# DISPAINOL® 80mg

Phloroglucinol dihydraté

comprimés dispersibles et orodispersibles

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir une question.
- Si vous avez toute autre question, consultez votre pharmacien ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit pour une maladie ou un état. Si vous avez des symptômes identiques, cela peut être une autre maladie.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

EXP 05/2023

PPV 34.40DH

dicament.

s d'informations à votre

quelqu'un d'autre, même

## COMPOSITION :

Principe actif :

Chaque comprimé dispersible et orodispersible contient 80 mg de substance active, le Phloroglucinol dihydraté.

Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre 62,25 mg.

Excipients :

Aspartam, Lactose monohydraté, Povidone (PVP K90), Crospovidone (Polyplasdone XL 10), Cellulose microcristalline (type PH 102), Stéarate de magnésium.

Excipients à effet notoire : Aspartam, Lactose monohydraté.

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS :

Comprimés dispersibles et orodispersibles dosés à 80 mg, sous plaquettes thermoformées Aluminium/PVC/PVDC.

DISPAINOL 80 mg : disponible en boîte de 10 et 20.

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antispasmodique musculotrope (A: appareil digestif et métabolisme ; G : système génito-urinaire).

## DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

## DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais DISPAINOL 80 mg comprimés en cas d'allergie au Phloroglucinol ou à l'un des composants.

En raison de la présence d'aspartam, ce médicament est contre-indiqué en cas de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre pharmacien avant de prendre ce médicament, en raison de la présence de lactose.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladie héréditaire rare).

L'association de Phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

L'utilisation de ce médicament ne doit pas être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Docteur BENNIS M. Mekki

Expert Assermentation

Elément L.N Médecine de Travail

Elément L.N Médecine de Sport

Spécialiste Coloposcopie

Echographie

Diététique et Nutrition

Maladie du Sein



INPE : 121026587

Dar Ouled Zidouh, le : ..... 03 MAI 2021



121026587

الدكتور بنيس محمد المكي

خبير محلق

عضو ج.م. لطب الشغل


عضو ج.م. لطب الرياضة

الفحص بالصدى

36.20

Staged (S)

24



Pharmacie POPUL'AR  
Dr. MOURI Lakbir  
Dar Ouled Zidouh  
Tél : 05.23.46.54.79

# STAGID 700 mg, comprimé sécable

Embonate de metformine

Veuillez lire attentivement  
l'intégralité de cette notice avant

de prendre ce médicament

• Gardez cette notice, vous  
avoir besoin de la relire.

• Si vous avez toute autre  
question, ou si vous avez un doute, demandez  
plus d'informations à votre  
médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été  
personnellement prescrit. Ne le  
donnez jamais à quelqu'un  
d'autre, même en cas de  
symptômes identiques, cela  
pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables  
devient grave ou si vous  
remarquez un effet indésirable  
non mentionné dans cette notice,  
parlez-en à votre médecin ou à  
votre pharmacien.

EXP  
PPV

10 2023

36.20

700  
lans

36.20

36.20

• si vous êtes allergique (hypersensible)  
à la metformine ou à l'un des  
autres composants contenus  
dans ce médicament

• si vous avez des problèmes liés  
à vos reins ou votre foie,

• si vous avez un diabète non  
contrôlé, s'accompagnant par  
exemple d'une hyperglycémie  
sévère (taux de sucre trop élevé  
dans le sang), de nausées, de  
vomissements, d'une déshydratation,  
d'une perte de poids rapide  
ou d'une acidocétose. L'acidocé-  
tose est une affection qui

consiste en une accumulation  
dans le sang de substances  
appelées « corps cétoniques » et  
qui peut provoquer un précoma  
diabétique. Les symptômes sont  
plus particulièrement une douleur  
à l'estomac, une respiration  
rapide et profonde, une envie de  
dormir ou une haleine ayant une  
odeur fruitée inhabituelle,

• si vous avez perdu trop d'eau  
(déshydratation), par exemple  
suite à une diarrhée persistante  
ou sévère, ou si vous avez vomi  
plusieurs fois d'affilée. La  
déshydratation peut entraîner  
des problèmes de reins, qui  
peuvent vous mettre en danger  
d'acidose lactique (voir « Faites  
attention avec STAGID 700 mg,  
comprimé sécable »).

• si vous avez une infection grave,  
par exemple une infection des  
poumons ou des bronches, ou  
une infection des reins. Des  
infections sévères peuvent  
entraîner des problèmes de reins  
qui peuvent vous mettre en  
danger d'acidose lactique  
(voir « Faites attention avec  
STAGID 700 mg, comprimé  
sécable » ci-dessous).

• si vous prenez un traitement contre

l'insuffisance cardiaque, si  
avez récemment  
cardiaque, si  
graves problèmes  
sanguine (tel que  
avez des difficultés  
Ceci peut entraîner  
d'apport en oxygène  
qui peut vous faire  
d'acidose lactique.  
attention avec  
comprimé sécable

• si vous consommez de l'alcool.

Si l'un des cas ci-dessous  
vous concerne, parlez-en à  
vous, parlez-en à votre  
médecin ou à votre pharmacien.

• Faites attention avec STAGID 700 mg, comprimé sécable

Veuillez noter les situations  
particulierement à risque  
lactique:

STAGID peut entraîner une  
complication très rare  
appelée acidose lactique.  
particulier si les reins  
fonctionnent mal.  
Le risque d'acidose lactique  
également avec un diabète non  
contrôlé, ou si le diabète  
prolongé ou si vous  
consommez de l'alcool. Les  
symptômes de l'acidose lactique  
sont des nausées, des  
vomissements, une douleur  
ventre (douleur dans le  
ventre avec crampes), une  
sensation de faiblesse, une  
fatigue et des difficultés à  
vous trouver une  
situation, voire une  
besoin d'assistance  
immédiatement. Un  
traitement contre l'acidose  
lactique peut entraîner un  
précoma. Arrêtez de prendre  
STAGID immédiatement et  
l'hôpital le plus proche.

STAGID à la fois  
pas d'hypoglycémie  
sucre dans le sang.  
Cependant,  
STAGID en  
d'autres médicaments

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

3. COMMENT PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER STAGID 700 mg, comprimé sécable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antidiabétique oral (biguanide). Il est destiné au traitement du diabète associé à un régime alimentaire adéquat. Il peut parfois être prescrit en association à l'insuline.