

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR VER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4589

Société : R-A-19

Actif

Pensionné(e)

Autre:

Nom & Prénom : D.RIFI - Abdellatif

Date de naissance : 24.11.59

Adresse : LOT TAKIA N° 32 Rue EL Qadissia Bérr  
Bécharia

Tél. : 06.67.01.20.96

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : MESNAÏD FICHA

Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

*Méningo-encéphalitis*

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 11/05/2021

Signature de l'adhérent(e) :



11 MAI 2021

ACCUEIL

KH. HIMMI

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26.03.81	CH		25000	<i>DR. MED. J. L. BONALD</i>
09.04.81	CH		67	<i>DR. MED. J. L. BONALD</i>

## EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie EL AYAKI TRANC Dr. YOUSSEF EL BERRECHI 67, Rue Dr. EL BERRECHI 1010 22 32 23 45	26.03.21	153,30
Pharmacie EL AYAKI TRANC Dr. YOUSSEF EL BERRECHI 67, Rue Dr. EL BERRECHI 1010 22 32 23 45	09.04.21	757,80

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution

O.D.F  
PROTHÉSES DENTAIRE

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

## **(Création, remont, adjonction)**

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		C <sup>O</sup> EFFICIENT DES TRAVAUX
H	G	
25533412 00000000	21433552 00000000	
D	G	
00000000 35533411	00000000 11433553	
B		
		MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS
<p><b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		

**Dr Mohammed El hejjam**  
**Spécialiste gynécologue accoucheur**  
**Maladie du sein , infertilité du couple**  
**Echographie , hysteroscopie , colposcopie**

الدكتور محمد الحجام

اختصاصي امراض النساء و التوليد

أمراض النساء ، مسحوقية الانجاب عند الزوجين

الشخص بالصدري ، منشار الرحم و عنق الرحم

NOM : MESNAOUI  
PRENOM AICHA

DATE : 09 / 04 / 2021

PPV: 99DH40  
Lot n°: 206410/2  
EXP: 09/2022

1 CEROXIM 250 mg

1 Cp x 2/j (10 j)

120,0 2 F pur

1 Cas / j

3 NOVEX 0.4

1 Inj SC / j (6 j)

111,0 4 PARANTAL 1g

1 Cp x 3 / j

92,0 5 EUCARBON

2 Cp x 3 / j

2,0 7 SPARADRAP

2,0 8 BETADINE

9,0 9 COMPRESSES STERILES

PPC : 120.00 Dhs

N° d'enregistrement  
DA20191904427DMP/20UCAv1

PPV: 99DH40  
Lot n°: 206410/2  
EXP: 09/2022

signé : DR M.EL HEJJAM

46 lot Al Amal

Prenez RDV s'il vous plaît

06 64 52 84 40

بيكس

انوكسابارين صوديك

LOT 202831 T  
EXP 11 2022  
PPV 347.00 DH

Lot: 3808A  
EXP: 05.2025  
PPV: 32.00 DHS  
32.00

**Dr Mohammed El hejjam**

**Spécialiste gynécologue  
accoucheur**

**Maladie du sein , infertilité du couple**

**Echographie , hysteroscopie , colposcopie**

**الدكتور محمد الحجام**

**اختصاصي امراض النساء و التوليد**

أمراض الثدي ، صعوبة الانجاب عند الزوجين

الفحص بالصدى ، منضار الرحم و عنق الرحم

NOM :	<i>Mesyaoui</i>	Date :	<i>26/03/21</i>
PRENOM	<i>Aicha</i>	Age :	

*46,000 - D - Prise en charge N° 5  
13,20*

*2 cycles 10,000  
per cycle 6000 (2 cycles)*

*13,20 D - Al Srik*

*14,000 x 3,11*

*163,20*

*العربي PHARMACIE AL IRAKI  
Dr. YOUSSEF AL IRAKI  
Distributor: S. S. MEDICAL  
46 lot EL AMAL  
Tel: 0522455000*

*143*

**46 lot Al Amal**

**Prenez RDV s'il vous plaît**

**06 64 52 84 40**



## Primolut-Nor® 10 mg

Comprimés

Acétate de Nortéthistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut-Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor
- Comment utiliser Primolut-Nor
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver les comprimés Primolut-Nor
- Contenu de l'emballage et autres informations
- Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisée pour le traitement de différentes hémorragies dysfunctionalles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour déclencher la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de nortéthistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
- N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la nortéthistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)

- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte

- si vous allez

- si vous avez ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

- si vous avez ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

- si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

- si vous avez ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes dits neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

- si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

- si vous avez ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor.

L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en œstrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés. Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue
- si vous avez une valvulopathie du cœur ou un certain type d'arythmie (fibrillation auriculaire)
- si vous avez eu une thrombose
- si un proche parent a eu une thrombose (une thromboembolie veineuse chez un frère ou une sœur ou un parent à un âge relativement jeune), une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral dans sa jeunesse
- si vous avez une thrombophilie superficielle
- si vous avez des varices
- si vous ou un proche parent avez eu un cancer du sein
- si vous avez ou si vous avez eu un masque de grossesse (des taches pigmentaires brunes jaunâtres surtout sur la peau du visage) : évitez alors une exposition excessive au soleil ou aux rayons ultraviolets
- si vous avez été dépressive
- si vous avez des migraines
- si vous êtes épileptique (voir rubrique « Autres médicaments et Primolut-Nor »)
- si vous ou un proche parent avez eu une concentration sanguine élevée de cholestérol ou de triglycérides (lipides sanguins)
- si vous avez une maladie du foie ou de la vésicule biliaire
- si vous avez la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique (une inflammation chronique du côlon)
- si vous avez un LED (lupus érythémateux disséminé, maladie du système immunitaire)
- si vous avez un SHU (syndrome hémolytique et urémique, trouble de la coagulation sanguine entraînant une insuffisance rénale)
- si vous avez une drépanocytose
- si vous avez une maladie qui est apparue pour la première fois ou qui s'est aggravée pendant la grossesse ou pendant une utilisation antérieure d'hormones sexuelles, par exemple perte auditive, porphyrie (maladie métabolique), herpes gestationis (maladie cutanée) ou chorée de Sydenham (maladie neurologique)
- si vous avez un ango-œdème héréditaire. Discutez immédiatement avec votre médecin si vous développez des symptômes d'ango-œdème, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'œstrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'ango-œdème.

Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

### Primolut-Nor et thrombose

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux et d'œstrogénostatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poumon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits œstrogénostatifs combinés (faible dose d'œstrogène, moins de 50 microgrammes d'éthynodiol) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

Thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose

46,80



## Primolut-Nor® 10 mg

Comprimés

Acétate de Nortéthistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut-Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor
- Comment utiliser Primolut-Nor
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver les comprimés Primolut-Nor
- Contenu de l'emballage et autres informations
- Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisée pour le traitement de différentes hémorragies dysfunctionalles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour déclencher la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de nortéthistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
- N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la nortéthistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)

- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte

- si vous allez

- si vous avez ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

- si vous avez ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

- si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

- si vous avez ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes dits neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

- si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

- si vous avez ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor.

L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en œstrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés. Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue
- si vous avez une valvulopathie du cœur ou un certain type d'arythmie (fibrillation auriculaire)
- si vous avez eu une thrombose
- si un proche parent a eu une thrombose (une thromboembolie veineuse chez un frère ou une sœur ou un parent à un âge relativement jeune), une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral dans sa jeunesse
- si vous avez une thrombophilie superficielle
- si vous avez des varices
- si vous ou un proche parent avez eu un cancer du sein
- si vous avez ou si vous avez eu un masque de grossesse (des taches pigmentaires brunes jaunâtres surtout sur la peau du visage) : évitez alors une exposition excessive au soleil ou aux rayons ultraviolets
- si vous avez été dépressive
- si vous avez des migraines
- si vous êtes épileptique (voir rubrique « Autres médicaments et Primolut-Nor »)
- si vous ou un proche parent avez eu une concentration sanguine élevée de cholestérol ou de triglycérides (lipides sanguins)
- si vous avez une maladie du foie ou de la vésicule biliaire
- si vous avez la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique (une inflammation chronique du côlon)
- si vous avez un LED (lupus érythémateux disséminé, maladie du système immunitaire)
- si vous avez un SHU (syndrome hémolytique et urémique, trouble de la coagulation sanguine entraînant une insuffisance rénale)
- si vous avez une drépanocytose
- si vous avez une maladie qui est apparue pour la première fois ou qui s'est aggravée pendant la grossesse ou pendant une utilisation antérieure d'hormones sexuelles, par exemple perte auditive, porphyrie (maladie métabolique), herpes gestationis (maladie cutanée) ou chorée de Sydenham (maladie neurologique)
- si vous avez un ango-œdème héréditaire. Discutez immédiatement avec votre médecin si vous développez des symptômes d'ango-œdème, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnées de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'œstrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'ango-œdème.

Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

### Primolut-Nor et thrombose

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux et d'œstrogénostatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poumon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits œstrogénostatifs combinés (faible dose d'œstrogène, moins de 50 microgrammes d'éthynodiol) est 2-3 fois plus élevé que que les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

Thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose

46,80



## Primolut-Nor® 10 mg

Comprimés

Acétate de Nortéthistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut-Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la re lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

### Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor
- Comment utiliser Primolut-Nor
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver les comprimés Primolut-Nor
- Contenu de l'emballage et autres informations
- Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisée pour le traitement de différentes hémorragies dysfunctionalles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour déclencher la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de nortéthistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
- N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la nortéthistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)

- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte

- si vous allez

- si vous avez ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

- si vous avez ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

- si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

- si vous avez ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes dits neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

- si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

- si vous avez ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

- si vous avez ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor.

L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en œstrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés. Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue
- si vous avez une valvulopathie du cœur ou un certain type d'arythmie (fibrillation auriculaire)
- si vous avez eu une thrombose
- si un proche parent a eu une thrombose (une thromboembolie veineuse chez un frère ou une sœur ou un parent à un âge relativement jeune), une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral dans sa jeunesse
- si vous avez une thrombophilie superficielle
- si vous avez des varices
- si vous ou un proche parent avez eu un cancer du sein
- si vous avez ou si vous avez eu un masque de grossesse (des taches pigmentaires brunes jaunâtres surtout sur la peau du visage) : évitez alors une exposition excessive au soleil ou aux rayons ultraviolets
- si vous avez été dépressive
- si vous avez des migraines
- si vous êtes épileptique (voir rubrique « Autres médicaments et Primolut-Nor »)
- si vous ou un proche parent avez eu une concentration sanguine élevée de cholestérol ou de triglycérides (lipides sanguins)
- si vous avez une maladie du foie ou de la vésicule biliaire
- si vous avez la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique (une inflammation chronique du côlon)
- si vous avez un LED (lupus érythémateux disséminé, maladie du système immunitaire)
- si vous avez un SHU (syndrome hémolytique et urémique, trouble de la coagulation sanguine entraînant une insuffisance rénale)
- si vous avez une drépanocytose
- si vous avez une maladie qui est apparue pour la première fois ou qui s'est aggravée pendant la grossesse ou pendant une utilisation antérieure d'hormones sexuelles, par exemple perte auditive, porphyrie (maladie métabolique), herpes gestationis (maladie cutanée) ou chorée de Sydenham (maladie neurologique)
- si vous avez un ango-œdème héréditaire. Discutez immédiatement avec votre médecin si vous développez des symptômes d'ango-œdème, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'œstrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'ango-œdème.

Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

### Primolut-Nor et thrombose

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux et d'œstrogénostatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poumon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits œstrogénostatifs combinés (faible dose d'œstrogène, moins de 50 microgrammes d'éthynodiol) est 2-3 fois plus élevé que que les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

Thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose

46,80

# PARANTAL®

(Paracétamol)

## ORME(S) PHARMACEUTIQUE (S) ET PRESENTATION (S)

Comprimés effervescents adultes et enfants (à partir de 50 kg) dosés à 1 g, boîte de 8 suppositoires adultes et enfants (à partir de 50 kg) dosés à 1 g, boîte de 10 suppositoires.

## COMPOSITION

Comprimés effervescents adultes et enfants (à partir de 50 kg) à 1 g

paracétamol..... 1 g

excipient ..... qsp 1 comprimé effervescent

Suppositoires adultes et enfants (à partir de 50 kg) à 1 g

paracétamol..... 1 g

excipient ..... qsp 1 suppositoire

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Ce médicament est un antalgique, antipyrrétique.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses, chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg (à partir d'environ 15 ans).

Les présentations sont réservées à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg (à partir de 15 ans).

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 50 kg, il existe d'autres présentations de PARANTAL®. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Comprimé effervescent :

peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne utilisez jamais PARANTAL® 1 g dans les cas suivants :

Allergie connue au paracétamol ou aux autres constituants,

Enfant de moins de 15 ans.

Maladie grave du foie,

Inflammation récente anale ou rectale ou saignement récent du rectum (suppositoire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

### Mises en garde spéciales :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

Avec les suppositoires, il y a un risque d'irritation locale, d'autant plus fréquent et intense que la durée du traitement est prolongée, le rythme d'administration est élevé et la posologie est forte.

En cas de diarrhée, la forme suppositoire n'est pas adaptée.

### Précautions d'emploi :

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue d'un autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

### Comprimé effervescent :

Ce médicament contient 401 mg de sodium par comprimé effervescent. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament, si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS

SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE

PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament.

PORTIFS

ans objet.

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES OU A UTILISER DES MÉTIERS

ans objet.

## LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Le comprimé effervescent contient du sodium.

## COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

osologie

Attention : Ces présentations contiennent 1 g de paracétamol par unité : Ne prenez pas plus de 3 comprimés effervescents à la fois.

Il est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg (à partir d'environ 15 ans).

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 3 comprimés effervescents par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la dose peut être augmentée.

PARANTAL® 1g

PPV 15DH00  
EXP 12/2023  
LOT 00050 4