

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9/11/2021	S	3000	3000	Dr. Noureddine AMRI
16/11/2021	S	6000	6000	G. AMRI

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
STEPHARMATICA CASABLANCA	2021/10/21	396,30
STEPHARMATICA CASABLANCA	2021/10/21	401,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. Noureddine AMRI Chirurgie Orthopédique et Traumatologique Anglo-Arab Hospital 3ème étage B. Abdelrahmane, 3ème étage B. Sidi Tél. : 0524 69 62 09 - Casablanca	2021/11/21	700	200

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	00000000	11433553
G		

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

Dr Noureddine AMRI
Spécialiste en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique
Diplômé de la faculté de médecine
de Montpellier

ARTHROSCOPIE
CHIRURGIE PROTHÉTIQUE
CHIRURGIE DE LA MAIN
CHIRURGIE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
MICROCHIRURGIE
CHIRURGIE DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES
CHIRURGIE DU SPORTIF



الدكتور نور الدين العماري
اختصاصي في جراحة
العظام والمفاصل
خريج كلية الطب بمونبولي
طبيب سابق بمستشفيات فرنسا
جراحة أمراض الروماتيزم
جراحة المفاصل بالمنظار
جراحة اليد
الجراحة التقويمية

Le : 24/02/2024

Mr Naeir Sinam.



60.00 x 2

M -

Meloxan 15

mg

1S

20

37.00 x 2

y -

Duloxetin

mg

1S1S

10x

120.40

3 -

Folam 30

mg

1S1S

20

79.80

-

Menopha gel chif

mg + 3

396.30

STE PHARMACIE HAMZA
Casablanca - Tél. 0522 93 10 28
Site : www.pharmaciehamza.com
Maj : 2024-02-24 09:30:00
ANCA

Dr. Noureddine AMRI
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Angle Rte Azemmour et Bd Sidi Abderrahmane
Abou Inaya - Casablanca - Etage N°6
Tél. : 0522 89 62 89 - Casablanca



Gélule
Voie orale

RESODYL®
Confort Articulaire

Formes et Préparation :

Boîte de 2 blister

LOT : 0001
PER : 03-23
PPC : 78.00 DH

Composition :

Extrait sec d'Harpagophytum, Extrait sec de Curcuma,
Extrait sec de Gingembre, Excipients : Talc.

Propriétés :

Il s'agit d'un mélange homogène d'extraits de plantes mis en gélules dont la fonction principale est de :

**Lutter contre l'inflammation

**Soulager les douleurs articulaires.

Grâce à une formule prometteuse et efficace d'actifs naturels, de l'Harpagophytum, La Curcuma et Le Gingembre, qui sont très reconnus par leur effet anti-inflammatoire, RESODYL gélules vous apporte confort et vous permet une meilleure mobilité articulaire.

Précaution d'emploi :

Il n'est pas conseillé de dépasser la dose recommandée.

À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.

Tenir hors de portée des enfants.

CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule 3 fois par jours, de préférence avant les repas.

Ne pas laisser à la portée des enfants .

À conserver au sec et à l'abri de la lumière .



Gélule
Voie orale

RESODYL®
Confort Articulaire

Formes et Prés.

Boîte de 2 blisters,

LOT : 0001
PER : 03-23
PPC : 78.00 DH

Composition :

Extrait sec d'Harpagophytum, Extrait sec de Curcuma,
Extrait sec de Gingembre, Excipients : Talc.

Propriétés :

Il s'agit d'un mélange homogène d'extraits de plantes mis en gélules dont la fonction principale est de :

**Lutter contre l'inflammation

**Soulager les douleurs articulaires.

Grâce à une formule prometteuse et efficace d'actifs naturels, de l'Harpagophytum, La Curcuma et Le Gingembre, qui sont très reconnus par leur effet anti-inflammatoire, RESODYL gélules vous apporte confort et vous permet une meilleure mobilité articulaire.

Précaution d'emploi :

Il n'est pas conseillé de dépasser la dose recommandée.

À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.

Tenir hors de portée des enfants.

CONSEILS D'UTILISATION :

1 gélule 3 fois par jours, de préférence avant les repas.

Ne pas laisser à la portée des enfants .

À conserver au sec et à l'abri de la lumière .

Produit des laboratoires PMP Biopharmed
73-74, Rue n°2, Zone Industrielle My Rachid Casablanca.
www.pmpbiopharmed.com



Léro
LABORATOIRE

EXPERT EN NUTRITION-SANTÉ

LEADER

Importateur Exclusif
BIOCODEX MAROC
B.P 126 Nouaceur
www.biocodex.ma

P.P.C.: 245,00 DH

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament
CE N° DA201805080070/WW/Z000CA/MA v4

#jechoisisdêtre bien

LABORATOIRE
Léro

naturellement élevée.

Tous ces éléments ainsi que le choix de la capsule molle, assurent à nos compléments alimentaires une facilité de prise, une tolérance (capacité à être acceptés par notre organisme) et une biodisponibilité (pourcentage de ce qui est absorbé par rapport à la quantité administrée) optimales.

**Nous sommes heureux de vous faire partager
notre approche de la nutrition-santé.**

*Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits
ou suivre notre actualité, retrouvez-nous sur:*

www.lero.ma
 facebook
 twitter
 instagram

BAT 06.17 502692

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Léro
LABORATOIRE

EXPERT EN NUTRITION-SANTÉ

LEADER

Importateur Exclusif
BIOCODEX MAROC
B.P 126 Nouaceur
www.biocodex.ma

P.P.C.: 245,00 DH

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament
CE N° DA201805080070/WW/Z000CA/MA v4

#jechoisisdêtre bien

LABORATOIRE
Léro

Sen fonction de l'avancée

faité qualité, sécurité et
oratoires et équipes de

ementation européenne,
les extraites de poissons
5 gras poly-insaturés est

naturellement élevée.

Tous ces éléments ainsi que le choix de la capsule molle, assurent à nos compléments alimentaires une facilité de prise, une tolérance (capacité à être acceptés par notre organisme) et une biodisponibilité (pourcentage de ce qui est absorbé par rapport à la quantité administrée) optimales.

**Nous sommes heureux de vous faire partager
notre approche de la nutrition-santé.**

*Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits
ou suivre notre actualité, retrouvez-nous sur:*

www.lero.ma
 facebook
 twitter
 instagram

BAT 06.17 502692

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

DULASTAN®

Comprimé

Boîte de 20

Paracétamol - Thiocol

DULASTAN® 500 mg / 2 mg

Boîte de 20 comprimés

دوستان
دۇلەستان
دۇلەستان قىرىپا

دۇلەستان قىرىپا

37,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Paracétamol.....	500 mg
Thiocolchicoside.....	2 mg
Excipients :	q.s.p..... 1 comprimé
Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.	

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismaux ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgie.
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse.
- d'allaitement;
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

DULASTAN®

Comprimé

Boîte de 20

Paracétamol - Thiocol

DULASTAN® 500 mg / 2 mg

Boîte de 20 comprimés

دوستان
دۇلەستان
دۇلەستان قىرىپا

دۇلەستان قىرىپا

37,00

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Paracétamol.....	500 mg
Thiocolchicoside.....	2 mg
Excipients :	q.s.p..... 1 comprimé
Excipients à effet notoire : Amidon de blé, lactose.	

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans :

- Traitement symptomatique de la douleur d'origine rhumatismaux ou musculaire en traumatologie et gynécologie.
- Traitement d'appoint des contractures douloureuses au cours :
 - des affections vertébrales dégénératives et des troubles statiques vertébraux : torticolis, dorsalgies, lombalgie.
 - des affections traumatologiques et neurologiques (avec spasticité).

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside ou au paracétamol,
- de grossesse.
- d'allaitement;
- d'insuffisance hépatocellulaire,
- d'hypersensibilité à l'un des excipients du produit,
- chez l'enfant de moins de 15 ans.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique et/ou rénale, d'affections cardiaques ou pulmonaires, éviter les traitements prolongés.
- Pour éviter le risque de surdosage au paracétamol, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.
- Le thiocolchicoside doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.
- Eventuellement, ingérer les comprimés avec un pansement gastrique.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.
- Il est conseillé de consulter un médecin pour des traitements excédant 7 jours.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose, ou de déficit en lactose.

L'amidon de blé peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques au blé ainsi que des intolérances chez les personnes souffrant de maladies coeliaques.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

DULASTAN® peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.


En cas de traitement avec des anticoagulants oraux, on peut l'administrer occasionnellement comme analgésique d'élection.

Examens paracliniques :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose oxydase-peroxydase.

Dr Noureddine AMRI
Spécialiste en Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique
Diplômé de la faculté de médecine
de Montpellier

ARTHROSCOPIE
CHIRURGIE PROTHÉTIQUE
CHIRURGIE DE LA MAIN
CHIRURGIE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
MICROCHIRURGIE
CHIRURGIE DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES
CHIRURGIE DU SPORTIF



الدكتور نور الدين العامري
إختصاصي في جراحة
العظام و المفاصل
خريج كلية الطب بمونبولي
طبيب سابق بمستشفيات فرنسا
جراحة أمراض الروماتيزم
جراحة المفاصل بالمنظار
جراحة اليد
الجراحة التقويمية

Le :

01/04/16

Mr Nader Sbitan

ISOPHAR
NEW EX CHAIKA
79.80 DH

STE PHARMACIE HANZA
Lotto 64 Casablanca - Tél: 0522 93 10 28
C. Haj fatih Rue 6 N° 3 Lot. 64
Casablanca - Tél: 0522 93 10 28

STE PHARMACIE HANZA
Lotto Haj fatih Rue 6 N° 3 Lot. 64
Casablanca - Tél: 0522 93 10 28

24500
201100
20000

SV

d'S

Dr Noureddine AMRI

Spécialiste en Chirurgie

Orthopédique et Traumatologique

Diplômé de la Faculté de Médecine

de Montpellier

ARTHROSCOPIE

CHIRURGIE PROTHÉTIQUE

CHIRURGIE DE LA MAIN

CHIRURGIE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

MICROCHIRURGIE

CHIRURGIE DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES

CHIRURGIE DU SPORTIF



الدكتور نور الدين العامري

إخلاصي في جراحة

العظام والمفاصل

خريج كلية الطب بمونبولي

طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

جراحة أمراض الروماتيزم

جراحة المفاصل بالمنظار

جراحة اليد

الجراحة التقويمية

Le :

24/02/2021

Mme NACIR SIHAM

Radiographie du coude droit F+P.

- Pas de lésions ostéoarticulaires visibles.

Dr. Noureddine AMRI
Chirurgie Orthopédique ET Traumatologique
Angle Rte Azemmour - Et Ed. Sidi
Abderrahmane, 3^{me} Etage N°6
Tél. : 0522 89 62 89 - Casablanca

Dr Noureddine AMRI

Spécialiste en Chirurgie

Orthopédique et Traumatologique

Diplômé de la Faculté de Médecine
de Montpellier

ARTHROSCOPIE

CHIRURGIE PROTHÉTIQUE

CHIRURGIE DE LA MAIN

CHIRURGIE DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

MICROCHIRURGIE

CHIRURGIE DES NERFS PÉRIPHÉRIQUES

CHIRURGIE DU SPORTIF



الدكتور نور الدين العامري

اختصاصي في جراحة

العظام والمفاصل

خريج كلية الطب بمونبولي

طبيب سابق بمستشفيات فرنسا

جراحة أمراض الروماتيزم

جراحة المفاصل بالمنظار

جراحة اليد

الجراحة التقويمية

24/02/2021

Le :

NOTE D'HONORAIRES

J'ai l'honneur présenter mes salutations à:

MME NACIR SIHAM

Et vous adresser selon l'usage:

Consultation 300,00 DH

Radiographie 200,00 DH

Arrêtée la somme à Cinq cent dirhams (500,00).

Dr. Noureddine AMRI
Chirurgie Orthopédique Et Traumatologique
Angle Rte Azemmour Et Bd. Sidi
Abderrahmane, 3^{ème} Etage N°6
Tél. : 0522 89 62 89 Casablanca

CABINÉT Dr. AMRI NOURÉDDINE
Mme NACIR SIHAM
24/02/2021 14:16:33

CABINET Dr. AMRI NOUREDDINE
Mme NACIR SIHAM
24/02/2021 14:16:33



CR



DT/F+P

CR