

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

itions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie. La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

macie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données caractére personnel.

**MUPRAS** : Centre Allai Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allai Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

Nº M21- 0059952

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Société :


Autre :

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 01/06/2021

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

RELEVE DES TRAITS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1/6/2021	C	100		PENADDI OUR PERMIS DE CASUAL 101 Bd Alibas El Ghadhaa Casablanca 23 27 f.s

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	01/06/2021	578,40 DH + 283,00 DH = 861,40 DH

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important:**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXAMEN

Docteur BENNAOUDI Hassan  
Diplome de la faculté de médecine de Lille

**MEDECINE GENERALE**

Diplome d'Echographie de la Faculté  
de Médecine de Paris

Agrée pour la Visite Medicale  
de Permis de Conduire  
Suivi de Diabète

Casablanca Le : ..... 1 / 6 / 2021 الدار البيضاء في :

د بنعدي حسن

كلية الطب بليل

طب العام

دبلوم الفحص بالصدى

لية الطب بباريس

للقحص الطبي لأجل

رخصة السيارة

مراقبة مرض السكري



+ 3 my

1) Go Au gru 6

225.00 + 3



2) Sti- lewt +

56.60 - 50 M x 5

3) Hmelet 1 CP 6 2 x 3 my



4) Vaydine 1 CP a 70g 17 my 3.20

22.50

5) VN Hmelet 3 my

60.00



Bloc Farid 101 , Avenue Abbas Ghaddaoui N° 3 Sidi Bernoussi Casablanca

AGENCE POUR PERMIS DE CONDUITE  
SIDI BOUNOUSSI 10 hours Casablanca

العنوان: الغداوي رقم 3 سيدى البرنوصي - الدار البيضاء

الهاتف: 05 22 73 27 09 - 06 15 27 53 50



6)

# METFORMINE

29.90

1 x 3

1/2 cp

1/2

Wu 1000

— al  
le 70



L = 515 400 D4

+ 213.05

~~Dr. BENADDI HASSAN~~  
AGREE POUR PERMIS DE CONDUIRE.  
3 Bloc Farid 101 Bd Babas El Ghaïdaou.  
Sidi Bernoussi Casablanca  
Tel 03 22 73 27 69



= 802.45 D11

# Co-anginib® 50mg/12,5mg

Boîte de 30 ou 60 comprimés pelliculés



Veuillez lire attentivement les informations importantes pour vous.

- Garez cette notice, vous aurez toujours une copie à portée de main.
- Si vous avez d'autres questions, contactez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé, même si les signes de leur maladie sont différents des vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice vous préoccupe, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il est important de lire cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Si vous prenez ce médicament sans le conseil d'un professionnel de la santé, il pourrait lui être nocif.

Si vous prenez ce médicament avec d'autres médicaments, il peut y avoir des interactions.

Si vous prenez ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement, il peut y avoir des effets indésirables sur votre bébé.

Que doivent faire les patients qui prennent ce médicament :

1. Qu'est ce que Co-anginib® ?
2. Quelles sont les informations importantes pour vous ?
3. Comment prendre Co-anginib® ?
4. Quels sont les effets indésirables possibles ?
5. Comment conserver Co-anginib® ?
6. Informations supplémentaires

LOT : 250  
PER : FEV 2022  
PPV : 125 DH 00

enfants

adolescents

## 1. QU'EST CE QUE CO-ANGINIB ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par une monothérapie.

**Co-anginib®** est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

## 2. QU'ELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ANGINIB® ?

Ne prenez jamais Co-anginib® en cas de :

Hypersensibilité au losartan, aux dérivés sulfamidés (tels que l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des excipients.

Hypokaliémie ou hypercalcémie résistante au traitement.

Insuffisance hépatique sévère, cholestase et troubles obstructifs biliaires.

Hyponatrémie réfractaire.

Hyperuricémie symptomatique (goutte).

2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

Insuffisance rénale sévère (c'est-à-dire clairance de la créatinine < 30 ml/min).

Anurie.

**Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Co-anginib®**

Une attention particulière est requise chez les patients présentant :

Angio-oedème : Une surveillance étroite est recommandée.

Hypotension et hypovolémie : Il est recommandé de traiter ces pathologies avant l'administration de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. Les électrolytes sériques doivent être contrôlés à intervalles réguliers en cas de diarrhée ou de vomissements intermittents.

Déséquilibres électrolytiques : les concentrations plasmatiques de potassium ainsi que la clairance de la créatinine devront être étroitement surveillées. Cette surveillance doit être renforcée en particulier chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et ayant une clairance de la créatinine comprise entre 30 et 50 ml/min.

Insuffisance hépatique : Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant des antécédents d'insuffisance hépatique légère à modérée ou une maladie hépatique évolutive.

Insuffisance rénale : La prudence est recommandée lors de l'utilisation de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé chez les patients présentant une insuffisance cardiaque sévère ou une dysfonction rénale préexistante. Hyperaldostéronisme primaire : Les patients présentant un hyperaldostéronisme primaire ne sont généralement pas répondeurs aux traitements antihypertenseurs agissant par inhibition du système rénine-angiotensine. Les comprimés de Co-anginib® ne devront donc pas être utilisés.

Cardiopathie ischémique et maladie vasculaire cérébrale : Comme avec d'autres traitements antihypertenseurs, une baisse trop importante de la pression artérielle chez ces patients pourrait entraîner un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral.

Insuffisance cardiaque, sténose des valves aortique et mitrale, cardiomyopathie hypertrophique obstructive.

Diabète sucré : Les diurétiques thiazidiques peuvent altérer la tolérance au glucose. Il peut être nécessaire d'adapter la posologie des antidiabétiques.

Antécédents d'allergies ou d'asthme bronchique ou d'un lupus érythémateux aigu disséminé.

Si vous avez eu un cancer de la peau ou si vous développez une lésion cutanée suspecte pendant le traitement. Le traitement par l'hydrochlorothiazide, en particulier l'utilisation à long terme avec des doses élevées, peut augmenter le risque de certains types de cancer de la peau non mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde). Protégez votre peau des rayons du soleil et des rayons UV lorsque vous prenez Co-anginib®.

**Utilisation chez les enfants « et adolescents »**

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de Co-anginib® chez les enfants. Par conséquent, Co-anginib® ne doit pas être donné aux enfants.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.**

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément avec Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sans contrôle étroit de votre médecin. Des précautions particulières (telles que contrôles sanguins) peuvent être appropriées si vous prenez des suppléments potassiques, substituts de sel contenant du potassium, des médicaments épargeurs de potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, des médicaments pour le traitement de la goutte, des médicaments pour contrôler le rythme cardiaque ou pour le diabète (antidiabétiques oraux ou insuline).

Il est aussi important pour votre médecin de savoir si vous prenez d'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine, des stéroïdes, des médicaments pour le traitement du cancer, des antalgiques, des médicaments pour le traitement d'infections fongiques, des médicaments contre l'arthrose, des résines utilisées pour lutter contre un taux important de cholestérol telles que cholestyramine, des médicaments myorelaxants, des somnifères, des opioïdes tels que la morphine, des amines pressives telles que l'adrénaline ou d'autres médicaments de la même classe.

Informez aussi votre médecin si vous devez recevoir des produits de contraste iodés.

**Co-anginib® avec des aliments et boissons**

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en prenant Co-anginib® 50 mg/12,5 mg.

Des quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent neutraliser l'effet de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé pendant les 12 premières semaines de la grossesse et

# Co-anginib® 50mg/12,5mg

Boîte de 30 ou 60 comprimés pelliculés



Veuillez lire attentivement les informations importantes pour vous.

- Garez cette notice, vous aurez toujours une copie à portée de main.
- Si vous avez d'autres questions, contactez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé, même si les signes de leur maladie sont différents des vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice vous préoccupe, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il est important de lire cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Si vous prenez ce médicament sans le conseil d'un professionnel de la santé, il pourrait lui être nocif.

Si vous prenez ce médicament avec d'autres médicaments, il peut y avoir des interactions.

Si vous prenez ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement, il peut y avoir des effets indésirables sur votre bébé.

Que doivent faire les patients qui prennent ce médicament :

1. Qu'est ce que Co-anginib® ?
2. Quelles sont les informations importantes pour vous ?
3. Comment prendre Co-anginib® ?
4. Quels sont les effets indésirables possibles ?
5. Comment conserver Co-anginib® ?
6. Informations supplémentaires

LOT : 250  
PER : FEV 2022  
PPV : 125 DH 00

enfants

adolescents

## 1. QU'EST CE QUE CO-ANGINIB ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par une monothérapie.

**Co-anginib®** est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

## 2. QU'ELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ANGINIB® ?

Ne prenez jamais Co-anginib® en cas de :

Hypersensibilité au losartan, aux dérivés sulfamidés (tels que l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des excipients.

Hypokaliémie ou hypercalcémie résistante au traitement.

Insuffisance hépatique sévère, cholestase et troubles obstructifs biliaires.

Hyponatrémie réfractaire.

Hyperuricémie symptomatique (goutte).

2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

Insuffisance rénale sévère (c'est-à-dire clairance de la créatinine < 30 ml/min).

Anurie.

**Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Co-anginib®**

Une attention particulière est requise chez les patients présentant :

Angio-oedème : Une surveillance étroite est recommandée.

Hypotension et hypovolémie : Il est recommandé de traiter ces pathologies avant l'administration de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. Les électrolytes sériques doivent être contrôlés à intervalles réguliers en cas de diarrhée ou de vomissements intermittents.

Déséquilibres électrolytiques : les concentrations plasmatiques de potassium ainsi que la clairance de la créatinine devront être étroitement surveillées. Cette surveillance doit être renforcée en particulier chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et ayant une clairance de la créatinine comprise entre 30 et 50 ml/min.

Insuffisance hépatique : Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant des antécédents d'insuffisance hépatique légère à modérée ou une maladie hépatique évolutive.

Insuffisance rénale : La prudence est recommandée lors de l'utilisation de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé chez les patients présentant une insuffisance cardiaque sévère ou une dysfonction rénale préexistante. Hyperaldostéronisme primaire : Les patients présentant un hyperaldostéronisme primaire ne sont généralement pas répondeurs aux traitements antihypertenseurs agissant par inhibition du système rénine-angiotensine. Les comprimés de Co-anginib® ne devront donc pas être utilisés.

Cardiopathie ischémique et maladie vasculaire cérébrale : Comme avec d'autres traitements antihypertenseurs, une baisse trop importante de la pression artérielle chez ces patients pourrait entraîner un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral.

Insuffisance cardiaque, sténose des valves aortique et mitrale, cardiomyopathie hypertrophique obstructive.

Diabète sucré : Les diurétiques thiazidiques peuvent altérer la tolérance au glucose. Il peut être nécessaire d'adapter la posologie des antidiabétiques.

Antécédents d'allergies ou d'asthme bronchique ou d'un lupus érythémateux aigu disséminé.

Si vous avez eu un cancer de la peau ou si vous développez une lésion cutanée suspecte pendant le traitement. Le traitement par l'hydrochlorothiazide, en particulier l'utilisation à long terme avec des doses élevées, peut augmenter le risque de certains types de cancer de la peau non mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde). Protégez votre peau des rayons du soleil et des rayons UV lorsque vous prenez Co-anginib®.

**Utilisation chez les enfants « et adolescents »**

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de Co-anginib® chez les enfants. Par conséquent, Co-anginib® ne doit pas être donné aux enfants.

**Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.**

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément avec Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sans contrôle étroit de votre médecin. Des précautions particulières (telles que contrôles sanguins) peuvent être appropriées si vous prenez des suppléments potassiques, substituts de sel contenant du potassium, des médicaments épargeurs de potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, des médicaments pour le traitement de la goutte, des médicaments pour contrôler le rythme cardiaque ou pour le diabète (antidiabétiques oraux ou insuline).

Il est aussi important pour votre médecin de savoir si vous prenez d'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine, des stéroïdes, des médicaments pour le traitement du cancer, des antalgiques, des médicaments pour le traitement d'infections fongiques, des médicaments contre l'arthrose, des résines utilisées pour lutter contre un taux important de cholestérol telles que cholestyramine, des médicaments myorelaxants, des somnifères, des opioïdes tels que la morphine, des amines pressives telles que l'adrénaline ou d'autres médicaments de la même classe.

Informez aussi votre médecin si vous devez recevoir des produits de contraste iodés.

**Co-anginib® avec des aliments et boissons**

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en prenant Co-anginib® 50 mg/12,5 mg.

Des quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent neutraliser l'effet de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé pendant les 12 premières semaines de la grossesse et

# Co-anginib® 50mg/12,5mg

Boîte de 30 ou 60 comprimés pelliculés



Veuillez lire attentivement les informations importantes pour vous.

- Garez cette notice, vous aurez toujours une copie à portée de main.
- Si vous avez d'autres questions, contactez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par un professionnel de la santé, même si les signes de leur maladie sont différents des vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice vous préoccupe, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il est important de lire cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Si vous prenez ce médicament sans le conseil d'un professionnel de la santé, il pourrait lui être nocif.

Si vous prenez ce médicament avec d'autres médicaments, il peut y avoir des interactions.

Si vous prenez ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement, il peut y avoir des effets indésirables sur votre bébé.

Que doivent faire les patients qui prennent ce médicament :

1. Qu'est ce que Co-anginib® ?
2. Quelles sont les informations importantes pour vous ?
3. Comment prendre Co-anginib® ?
4. Quels sont les effets indésirables possibles ?
5. Comment conserver Co-anginib® ?
6. Informations supplémentaires

LOT : 250  
PER : FEV 2022  
PPV : 125 DH 00

enfants

adolescents

## 1. QU'EST CE QUE CO-ANGINIB ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par une monothérapie.

**Co-anginib®** est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

## 2. QU'ELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CO-ANGINIB® ?

Ne prenez jamais Co-anginib® en cas de :

Hypersensibilité au losartan, aux dérivés sulfamidés (tels que l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des excipients.

Hypokaliémie ou hypercalcémie résistante au traitement.

Insuffisance hépatique sévère, cholestase et troubles obstructifs biliaires.

Hyponatrémie réfractaire.

Hyperuricémie symptomatique (goutte).

2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

Insuffisance rénale sévère (c'est-à-dire clairance de la créatinine < 30 ml/min).

Anurie.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Co-anginib®.

Une attention particulière est requise chez les patients présentant :

Angio-oedème : Une surveillance étroite est recommandée.

Hypotension et hypovolémie : Il est recommandé de traiter ces pathologies avant l'administration de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé. Les électrolytes sériques doivent être contrôlés à intervalles réguliers en cas de diarrhée ou de vomissements intermittents.

Déséquilibres électrolytiques : les concentrations plasmatiques de potassium ainsi que la clairance de la créatinine devront être étroitement surveillées. Cette surveillance doit être renforcée en particulier chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et ayant une clairance de la créatinine comprise entre 30 et 50 ml/min.

Insuffisance hépatique : Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant des antécédents d'insuffisance hépatique légère à modérée ou une maladie hépatique évolutive.

Insuffisance rénale : La prudence est recommandée lors de l'utilisation de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé chez les patients présentant une insuffisance cardiaque sévère ou une dysfonction rénale préexistante. Hyperaldostéronisme primaire : Les patients présentant un hyperaldostéronisme primaire ne sont généralement pas répondeurs aux traitements antihypertenseurs agissant par inhibition du système rénine-angiotensine. Les comprimés de Co-anginib® ne devront donc pas être utilisés.

Cardiopathie ischémique et maladie vasculaire cérébrale : Comme avec d'autres traitements antihypertenseurs, une baisse trop importante de la pression artérielle chez ces patients pourrait entraîner un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral.

Insuffisance cardiaque, sténose des valves aortique et mitrale, cardiomyopathie hypertrophique obstructive.

Diabète sucré : Les diurétiques thiazidiques peuvent altérer la tolérance au glucose. Il peut être nécessaire d'adapter la posologie des antidiabétiques.

Antécédents d'allergies ou d'asthme bronchique ou d'un lupus érythémateux aigu disséminé.

Si vous avez eu un cancer de la peau ou si vous développez une lésion cutanée suspecte pendant le traitement. Le traitement par l'hydrochlorothiazide, en particulier l'utilisation à long terme avec des doses élevées, peut augmenter le risque de certains types de cancer de la peau non mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde). Protégez votre peau des rayons du soleil et des rayons UV lorsque vous prenez Co-anginib®.

Utilisation chez les enfants « et adolescents »

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de Co-anginib® chez les enfants. Par conséquent, Co-anginib® ne doit pas être donné aux enfants.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément avec Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sans contrôle étroit de votre médecin. Des précautions particulières (telles que contrôles sanguins) peuvent être appropriées si vous prenez des suppléments potassiques, substituts de sel contenant du potassium, des médicaments épargeurs de potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, des médicaments pour le traitement de la goutte, des médicaments pour contrôler le rythme cardiaque ou pour le diabète (antidiabétiques oraux ou insuline).

Il est aussi important pour votre médecin de savoir si vous prenez d'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine, des stéroïdes, des médicaments pour le traitement du cancer, des antalgiques, des médicaments pour le traitement d'infections fongiques, des médicaments contre l'arthrose, des résines utilisées pour lutter contre un taux important de cholestérol telles que cholestyramine, des médicaments myorelaxants, des somnifères, des opioïdes tels que la morphine, des amines pressives telles que l'adrénaline ou d'autres médicaments de la même classe.

Informez aussi votre médecin si vous devez recevoir des produits de contraste iodés.

Co-anginib® avec des aliments et boissons

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en prenant Co-anginib® 50 mg/12,5 mg.

Des quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent neutraliser l'effet de Co-anginib® 50 mg/12,5 mg.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Co-anginib® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé pendant les 12 premières semaines de la grossesse et

# ميتفورمين وين®

كلوريدات الميتفورمين

قرص ملبيس

ملغ 500 ملغ 1000 ملغ

عن طريق الفم

مذا الدواء

طلبوا مزيداً

، وإن ظهرت

ر إذا لاحظتم

هذه النشرة.

في هذه النشرة :  
1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبيس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

2. ما المعلومات الضرورية قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

3. كيف يمكن تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

5. كيف يحفظ ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

6. معلومات إضافية  
1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبيس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصنف الصيدلي العلاجي :

ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ كواتوند.

الإرشادات العلاجية

بالاقتران مع حمية غذائية مناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم، مخصص لمعالجة داء السكري من صنف 2.

\* عند البالغين، يمكن وصفة لوجنه أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.

\* عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والراهقين: يمكن وصفة لوجنه أو مع الأنسولين.

يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملغ بدل قرصين من ميتفورمين 500 ملغ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

مضادات الاستعمال

يجب عدم تناول ميتفورمين وين :

\* إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر «ما المكونات التي



- يحتوي عليها ميتفورمين وين» في فقرة 6 «معلومات إضافية»)
- إذا كانت لديك مشاكل مقتربة بالكلينين أو الكبد.
- إذا كان لديك داء سكري غير منضبط مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لـ الـ (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غليان، قيء، بقاف، فقدان سريري للوزن أو ارتفاع المجموعة السيتوبلازمية ارتفاع المجموعة السيتوبلازمية هو مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى « أجسام السيتوبلازم» التي يمكن أن تتسبب في ميسق غيبوبة السكري. الأعراض هي بالخصوص ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في النوم أو تنفس مع واحدة فواكه غير عادي.
- إذا كنت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بسبب إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي، البقاف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الكلى التي يمكن أن تضعف في خطير الإصابة بالتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وين» أدناه).
- إذا كانت لديك إصابة حادة، مثلًا إصابة الرئتين أو القصبات الهوائية أو إصابة الكلى، إصابات وخيمة يمكن أن تتسبب في مشاكل في الكلى قد تضعف في خطير الإصابة بالتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وين» أدناه).

- إذا كنت تلتقي علاجاً ضد تضور القلب أو مؤخراً أصبت بتنوية قلبية.

- إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في الدورة الدموية (مثل الصدمة) أو إذا كانت لديك مشعوبات في التنفس. يمكن أن يؤدي هذا إلى اتفقار في إمداد الأوكسجين إلى الأنفحة، الذي يمكن أن يضعف في خطير الإصابة بالتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وين» أدناه).

- إذا كانت تتماطل الكثير من الكحول.

- إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تطبق عليك، تحدث عن ذلك إلى طبيبك قبل بدء تناول هذا الدواء.

- يرجى استشارة طبيبك إذا :

- ج. على كلٍّ القيام بفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكانير الذي قد يتطلب حقن مادة تباين محتوية على الـ يود في دورتك الدموية.

- ج. وجّب علىك الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

- يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقوم طبيبك بتحديد ما إذا كنت بحاجة أو لا إلى استبدال العلاج خلال هذه الفترة. من الضروري أن تبقي بذكرة تعليمات طبيبك.

- احتياطات الاستعمال: تحذيرات خاصة

- يجب الانتباه قبل تناول ميتفورمين وين :

- الرجو الأخذ بعين الاعتبار الخطير الخاص التالي للتحمّس اللاكتوني يمكن أن يتسبب الميتفورمين وين في مضاعفة ناردة جداً لكنها

- خطيرة تسمى التحمّس اللاكتوني، خطير التحمّس اللاكتوني يمكن أن يزيد في

- حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض التحمّس اللاكتوني هي «قيء»، الالم البطن مع تشنجات ضلائية، شعور

- بعياد عام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك

- في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الاستشارة على الفور لتلقي العلاج لأن التحمّس اللاكتوني يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.

# ميتفورمين وين®

كلوريدات الميتفورمين

قرص ملبيس

ملغ 500 ملخ 1000 ملخ

عن طريق الفم

مذا الدواء

طلبوا مزيداً

، وإن ظهرت

ر إذا لاحظتم

هذه النشرة.

في هذه النشرة :  
1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبيس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

2. ما المعلومات الضرورية قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

3. كيف يمكن تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

5. كيف يحافظ ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

6. معلومات إضافية  
1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبيس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصنف الصيدلي العلاجي :

ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ كواتوند.

الإرشادات العلاجية

بالاقتران مع حمية غذائية مناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم، مخصص لمعالجة داء السكري من صنف 2.

\* عند البالغين، يمكن وصفة لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.

\* عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والراهقين: يمكن وصفة لوحده أو مع الأنسولين.

يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملخ بدل قرصين من ميتفورمين 500 ملخ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

مضادات الاستعمال

يجب عدم تناول ميتفورمين وين :

\* إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر «ما المكونات التي

(

يحتوي عليها ميتفورمين وين» في فقرة 6 «معلومات إضافية»)

\* إذا كانت لديك مشاكل مقتربة بالكلينين أو الكبد.

\* إذا كان لديك داء سكري غير منضبط مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لـ

الدم (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غليان، قيء، بقاف، فقدان سر

للوزن أو ارتفاع المجموعة السيتوبلازمية ارتفاع المجموعة السيتوبلازمية هو

مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى « أجسام السيتوبلازم التي يمكن

أن تتسبب في ميسق غيبوبة السكري. الأعراض هي بالخصوص ألم في

المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في النوم أو تنفس مع واحدة فواكه غير

عادية.

\* إذا كنت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بسبب إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي، البقاف يمكن

أن يؤدي إلى مشاكل الكلى التي يمكن أن تضعف في خطير الإصابة

بالتتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وين» أدناه).

\* إذا كانت لديك إصابة حادة، مثلًا إصابة الرئتين أو القصبات الهوائية

أو إصابة الكلى، إصابات وخيمة يمكن أن تتسبب في مشاكل في الكلى

قد تضعف في خطير الإصابة بالتتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة

مع ميتفورمين وين» أدناه).

\* إذا كنت تتلقى علاجاً ضد تضور القلب أو مؤخراً أصبت بتنوية قلبية،

إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في الدورة الدموية (مثل الصدمة) أو إذا

كانت لديك مشعوبات في التنفس، يمكن أن يؤدي هذا إلى اتفقار في

إمداد الأوكسجين إلى الأنفحة، الذي يمكن أن يضعف في خطير الإصابة

بالتتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وين» أدناه).

\* إذا كانت تتماطل الكثير من الكحول.

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تطبق عليك، تحدث عن ذلك إلى

طبيبك قبل بدء تناول هذا الدواء.

يرجى استشارة طبيبك إذا :

\* جعل على القيام بفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكانير

الذي قد يتطلب حقن مادة تباين محتوية على الريود في دورتك الدموية.

\* وجّب علىك الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد هذه

الفحوصات أو العمليات الجراحية. سبق طبيبك بتحديث ما إذا كنت

بحاجة أو لا إلى استبدال العلاج خلال هذه الفترة. من الضروري أن تبقي

يدقة تعليمات طبيبك.

احتياطات الاستعمال: تحذيرات خاصة

يجب الانتباه قبل تناول ميتفورمين وين :

الرجو الأخذ بعين الاعتبار الخطير الخاص التالي للتتحمّس اللاكتوني

يمكن أن يتسبب الميتفورمين وين في مضاعفة ناردة جداً لكنها

خطيرة تسمى التتحمّس اللاكتوني، خاصة إذا كانت الكلينين لا

تعملان بشكل صحيح. خطير التتحمّس اللاكتوني يمكن أن يزيد في

حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض

التتحمّس اللاكتوني هي «قي»، ألام البطن مع تشنجات ضلائية، شعور

بعياد عام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك

في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الاستشارة على الفور لتلقي

العلاج لأن التتحمّس اللاكتوني يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.



# ميتفورمين وين®

كلوريدات الميتفورمين

قرص ملبيس

ملغ 500 ملخ 1000 ملخ

عن طريق الفم

مذا الدواء

طلبوا مزيداً

، وإن ظهرت

ر إذا لاحظتم

هذه النشرة.

في هذه النشرة :  
1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبيس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

2. ما المعلومات الضرورية قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

3. كيف يمكن تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

5. كيف يحفظ ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

6. معلومات إضافية  
1. ما هو ميتفورمين وين، قرص ملبيس، وما الحالات التي يستعمل فيها؟

الصنف الصيدلي العلاجي -

ميتفورمين وين يحتوي على الميتفورمين. هذا الدواء يستخدم لعلاج داء السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ كواتوند.

الإرشادات العلاجية

بالاقتران مع حمية غذائية مناسبة، هذا الدواء هو مضاد للسكري عن طريق الفم، مخصص لمعالجة داء السكري من صنف 2.

\* عند البالغين، يمكن وصفة لوحده أو مع دواء آخر مضاد للسكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.

\* عند الطفل الذي يتجاوز عمره 10 سنوات والراهقين: يمكن وصفة لوحده أو مع الأنسولين.

يمكن استعمال ميتفورمين وين 1000 ملخ بدل قرصين من ميتفورمين 500 ملخ حينما يتطلب العلاج جرعة من 2 أو 3 غرامات يومياً من ميتفورمين.

2. ما المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول ميتفورمين وين، قرص ملبيس؟

مضادات الاستعمال

يجب عدم تناول ميتفورمين وين :

\* إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للميتفورمين، أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا الدواء. (انظر «ما المكونات التي

(

يحتوي عليها ميتفورمين وين» في فقرة 6 «معلومات إضافية»)

\* إذا كانت لديك مشاكل مقتربة بالكلينين أو الكبد.

\* إذا كان لديك داء سكري غير منضبط مصحوب مثلاً بارتفاع شديد لـ

الدم (نسبة السكر مرتفعة جداً في الدم)، غليان، قيء، بقاف، فقدان سر

للوزن أو ارتفاع المجموعة السيتوبلازمية ارتفاع المجموعة السيتوبلازمية هو

مرض يعتمد على تراكم مواد في الدم تسمى « أجسام السيتوبلازم التي يمكن

أن تتسبب في ميسق غيبوبة السكري. الأعراض هي بالخصوص ألم في

المعدة، تنفس سريع وعميق، رغبة في النوم أو تنفس مع واحدة فواكه غير

عادية.

\* إذا كنت قد فقدت الكثير من الماء (جفاف)، على سبيل المثال بسبب إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي، البقاف يمكن

أن يؤدي إلى مشاكل الكلى التي يمكن أن تضعف في خطير الإصابة

بالتتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وين» أدناه).

\* إذا كانت لديك إصابة حادة، مثلًا إصابة الرئتين أو القصبات الهوائية

أو إصابة الكلى، إصابات وخيمة يمكن أن تتسبب في مشاكل في الكلى

قد تضعف في خطير الإصابة بالتتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة

مع ميتفورمين وين» أدناه).

\* إذا كنت تتلقي علاجاً ضد تضور القلب أو مؤخرًا أصبت بتنوية قلبية،

إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في الدورة الدموية (مثل الصدمة) أو إذا

كانت لديك مشعوبات في التنفس، يمكن أن يؤدي هذا إلى اتفقار في

إمداد الأوكسجين إلى الأنفحة، الذي يمكن أن يضعف في خطير الإصابة

بالتتحمّس اللاكتوني (انظر «عناية خاصة مع ميتفورمين وين» أدناه).

\* إذا كانت تتماطل الكثير من الكحول.

إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تطبق عليك، تحدث عن ذلك إلى

طبيبك قبل بدء تناول هذا الدواء.

يرجى استشارة طبيبك إذا :

\* جعل على القيام بفحص بالتصوير الإشعاعي أو فحص السكانير

الذي قد يتطلب حقن مادة تباين محتوية على الريود في دورتك الدموية.

\* وجّب علىك الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

يجب التوقف عن تناول ميتفورمين وين بعض الوقت قبل وبعد هذه

الفحوصات أو العمليات الجراحية. سبق طبيبك بتحديث ما إذا كنت

بحاجة أو لا إلى استبدال العلاج خلال هذه الفترة. من الضروري أن تتب

يدقة تعليمات طبيبك.

احتياطات الاستعمال: تحذيرات خاصة

يجب الانتباه قبل تناول ميتفورمين وين :

الرجو الأخذ بعين الاعتبار الخطير الخاص التالي للتتحمّس اللاكتوني

يمكن أن يتسبب الميتفورمين وين في مضاعفة ناردة جداً لكنها

خطيرة تسمى التتحمّس اللاكتوني، خاصة إذا كانت الكلينين لا

تعملان بشكل صحيح. خطير التتحمّس اللاكتوني يمكن أن يزيد في

حالة داء سكري غير منضبط، صوم مطول أو شرب الكحول. أعراض

التتحمّس اللاكتوني هي «قي»، ألام البطن مع تشنجات ضلائية، شعور

بعياد عام مع تعب شديد وصعوبات في التنفس. إذا وجدت نفسك

في هذه الحالة، قد تحتاج إلى الاستشارة على الفور لتلتقي

العلاج لأن التتحمّس اللاكتوني يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.



# Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez noter que ce médicament n'est pas destiné aux personnes d'au moins 18 ans.

LOT : 20E03  
PER : 12/2023

STILNOX 10 MG

CP PFL SFC B20

P.P.V : 56DH60



6 118000 061465

pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?** Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

**AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?** Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

**Avertissements et précautions** Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable. **Mises en garde** Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose. **Risque de dépendance** : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

# Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez noter que ce médicament n'est pas destiné aux personnes d'âge avancé.

LOT : 20E03  
PER : 12/2023

STILNOX 10 MG

CP PFL SFC B20

P.P.V : 56DH60



6 118000 061465

pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?** Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

**AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?** Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

**Avertissements et précautions** Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable. **Mises en garde** Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose. **Risque de dépendance** : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

# Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez noter que ce médicament n'est pas destiné aux personnes d'au moins 18 ans.

LOT : 20E03  
PER : 12/2023

STILNOX 10 MG

CP PFL SFC B20

P.P.V : 56DH60



6 118000 061465

pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?** Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

**AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?** Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

**Avertissements et précautions** Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable. **Mises en garde** Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose. **Risque de dépendance** : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

# Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez noter que ce médicament n'est pas destiné aux personnes d'au moins 18 ans.

LOT : 20E03  
PER : 12/2023

STILNOX 10MG

CP PFL SFC B20

P.P.V : 56DH60



6 118000 061465

pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?** Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

**AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?** Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

**Avertissements et précautions** Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable. **Mises en garde** Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose. **Risque de dépendance** : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

# Stilnox® 10 mg

Tartrate de zolpidem

Comprimé pelliculé sécable

SANOFI

Veuillez noter que ce médicament n'est pas destiné aux personnes d'au moins 18 ans.

LOT : 20E03  
PER : 12/2023

STILNOX 10 MG

CP PFL SFC B20

P.P.V : 56DH60



6 118000 061465

pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**1. QU'EST-CE QUE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?** Classe pharmacothérapeutique : hypnotiques et sédatifs - code ATC : N05CF02 Ce médicament est apparenté aux benzodiazépines. Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement de l'insomnie. Chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, étant donné l'absence de données, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

**AVANT DE PRENDRE STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?** Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. **Ne prenez jamais STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable :** • Si vous êtes allergique à la substance active, à la classe de produits apparentés aux benzodiazépines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des

muscles).

**Avertissements et précautions** Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable. **Mises en garde** Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose. **Risque de dépendance** : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance: • durée du traitement, • dose, • antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique. La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants. Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires, mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin. La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Des troubles de la mémoire sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Dans les heures qui suivent, il peut survenir une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices), une diminution de la capacité à conduire, en particulier si : • vous prenez ce médicament moins de 8 heures avant d'effectuer des activités nécessitant de la vigilance, • vous prenez une dose supérieure à la dose recommandée, • vous prenez du zolpidem alors que vous utilisez déjà un autre médicament sédatif ou qui augmente la quantité de STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable dans le sang, ou encore des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool, ou des substances illicites. Pour

# Voltare Emulg

90% vaseline officinale  
teur - Sans colorant -  
LOT: 121012  
P.S.R: 01/2024  
PPC: 11.50 DHS



Veuillez lire attentivement  
prendre ce médicament.

\* Gardez cette notice, vous p

\* Si vous avez d'autres questions, don

votre pharmacien.

Ce m

pers

même

Dans

1. C

Dans

2. C

Dans

3. C

Dans

4. C

Dans

5. C

Dans

6. C

Dans

Classe pharmacothérapeutique

Ce médicament est un anti-inflammatoire et un antalgique (il calme la douleur), sous forme de gel pour application sur la peau, uniquement au niveau de la région douloureuse.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est prescrit chez l'adulte dans les tendinites des membres supérieurs et inférieurs (inflammation des tendons des

après une opération ou après un agement de la

0,1 % ® فنيـرـكان

13,20

gel ET

AVANT

%, gel ?

%, gel ?

%, gel ?

, gel ET

NAITRE AVANT  
gel ?

IE 1%, gel dans

du 6ème mois de


ament apparenté,  
ns, aspirine;

intantes, eczéma,

DE DEMANDER  
(RMACIEN.

s DPIQUE 1%, gel:

- la dose administrée à chaque application est de l'ordre de 4 g de gel. Ceci correspond à un ruban de 10 cm environ (voir schéma à l'échelle).



## Durée de traitement

En l'absence de prescription médicale, le traitement est limité à 5 jours.

## Mode d'administration

Voie locale.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation, sauf en cas d'application par vous-même dans le cadre d'une arthrose douloureuse des doigts.

## Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de Voltarène Emulgel Topique 1%, gel que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, Voltarène Emulgel Topique 1%, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

Exceptionnellement peuvent survenir des réactions pouvant être sévères:

- réactions allergiques cutanées: éruption (boutons), urticaire, bulles,
- problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée),
- manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge).

Il faut immédiatement interrompre le traitement et avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers:

- des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales,
- très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil,
- d'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER VOLTARÈNE EMULGEL TOPIQUE 1%, gel ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

## Date de péremption

Faites attention avec VOLTARE

Mises en garde spéciales

Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

## Précautions d'emploi

La forme gel est réservée à l'adulte.

Le port de gants par le masseur kinésithérapeute, en cas d'utilisation intensive, est recommandé.

EN CAS DE DOLTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE

Praticien