RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR IVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ions générales :

- cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- a validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spécieux, xtractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 5ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 19 - www.mupras.com

MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

Nº P19- 73637 055273

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7249 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Smail Ben Lahouar

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Fatiha Zentoni Age:

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Le :** / /

Signature de l'adhérent(e) :

MUPRAS 08 JUIN 2021 ACCUEIL Z. BOKAR

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Cœfficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Cœfficient



CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE



(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

21/04/2021

SAHAM Assurance
member of Sanlam group

OK

CMN_Pa Pouba. Tel SD

DECOMPTE DE REMBOURSEMENT DESTINE A L'ASSURE

Police N°	: 0600999712	**Contractante**	: Atasa
Assuré	: Fatiha Zemzami	**Date de réception de la déclaration**	: 07/04/2021
N° Adhésion	: 887	**Date de validation**	: 21/04/2021
Personne soignée	: Fatiha Zemzami	**Date de survenance**	: 10/03/2021
Sinistre N°	: 5001432	**Déclaration N°**	: 1B363908A
Bordereau N°	: 787503	**Médecin Traitant**	: MEDECIN DIVERS

Nature de soins	Frais engagés	Coefficient	Valeur	Base de remboursement (a)	Frais remboursés par le premier assureur	Taux de remboursement (b)	Frais remboursés (c)= (a)*(b)
CONSULTATION / SPECIALISTE	300.00	NA	NA	300.00	NA	80.00 %	240.00
MEDICAMENTS	750.50	NA	NA	750.50	NA	80.00 %	600.40
A P M C	90.00	NA	NA	90.00	NA	80.00 %	72.00
ACTE SPECIALISTE	300.00	NA	NA	300.00	NA	80.00 %	240.00
ANALYSE	268.00	NA	NA	268.00	NA	80.00 %	214.40
RADIOGRAPHIE	200.00	NA	NA	200.00	NA	80.00 %	160.00
Totaux	**1 908.50**			**1 908.50**			**1 526.80**

Détail explicatif des soins non remboursés

Nature du soin non remboursé	Montant du soin non remboursé	Motif du non remboursement
Totaux		

Nom du gestionnaire : AMINE YASMINA

Date de l'édition : 21/04/2021

a) Si la nature du soin correspond à une prestation avec une valeur clé (dentaire, analyses, etc.),la base de remboursement est le produit du coefficient de remboursement par la valeur clé.
Si la nature du soin ne correspond pas à une prestation avec valeur clé, la base de remboursement est issue de la Nomenclature générale des actes professionnels marocaine.
b)Le taux de remboursement est le taux de couverture garanti défini pour chaque prestation dans le contrat.
c)Les frais remboursés ne peuvent pas dépasser le solde restant du plafond général ou le solde restant du plafond de la prestation.

SAHAM Assurance

membre de Sanlam group

Recommandations importantes

Etablir une déclaration par personne et par maladie

- La déclaration maladie doit comporter les cachets de l'employeur et du médecin traitant, les noms et les prénoms de la personne soignée (bénéficiaire) inscrits de la main du médecin traitant.
- La déclaration maladie doit être accompagnée de l'ordonnance médicale prescrivant les médicaments, examens de radiologie et de laboratoire, ainsi que toutes les pièces justificatives.
- Les noms et prénoms de la personne malade doivent obligatoirement être portés par les praticiens eux-mêmes, sur chaque pièce transmise.
- Toutes les pièces concernant une maladie doivent être remises à la Compagnie dans les trois mois au plus tard suivant la date d'ordonnance médicale.
- En cas d'accident, préciser les causes, circonstances, date, lieu et heure.
- Les prospectus, vignettes et PPM concernant les médicaments doivent être joints aux ordonnances.
- En cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, la déclaration de maladie doit être accompagnée d'une facture détaillée et acquittée sur laquelle devront être précisés: la cotation des actes, la ventilation des frais annexes, le nombre de jours d'hospitalisation et le détail des fournitures pharmaceutiques.
- Tous les certificats, notes d'honoraires et ordonnances remis à l'occasion d'une maladie sont conservés par la Compagnie.
- Tout dossier retourné pour complément d'informations doit être retourné à la Compagnie dans un délai d'un mois.
- Pli confidentiel : dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, en préciser la nature sous pli cacheté à l'attention du médecin-conseil de la Compagnie.
- L'indemnité forfaitaire couvrant les frais de grossesse et de maternité est payable sur présentation d'un extrait d'acte de naissance du nouveau né.
- Lorsque la personne bénéficie d'un premier remboursement auprès d'un régime de prévoyance, l'assuré(e) doit remettre à la Compagnie les photocopies des pièces justificatives et l'original du décompte de règlement délivré par cet organisme.
- Afin de prolonger la garantie des enfants âgés de plus de 21 ans, l'assuré doit produire annuellement un certificat de scolarité correspondant à l'année d'assurance considérée.
- Dans le cas où le conjoint de l'assuré ne bénéficierait d'aucun régime de prévoyance, demander le questionnaire relatif à la prise en charge du conjoint et/ou des enfants. Ce document doit nous être retourné dûment rempli et accompagné des pièces justificatives nécessaires.
- Réclamations : toute réclamation doit être formulée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du dossier maladie.
- Toute fausse déclaration est passible des sanctions prévues par la Loi.

SAHAM Assurance, Société anonyme d'assurances et de réassurance au capital social de 41 140 400 de DH. Entreprise régie par la loi n°17 - portant code des assurances - siège social 216, Boulevard Zerktouni 20100 Casablanca Maroc - RC Casablanca 21241 - TP 35211 - Tax professionnelle 35211 - CNSS 4 - 3086825 - ICE 000270354000017 - Tél: 05 22 19 16 00 - Fax: 05 22 20 60 97

VOLET DÉTACHABLE

Déclaration de maladie N° **18363908**

Remplissez ce volet, détachez-le et conservez-le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Exemplaire à conserver par l'intermédiaire.

Police n° : .....
Adhésion n° : .....
Nom de l'assuré(e) : .....
Date de consultation : .....
Total des frais engagés : .....
Date de dépôt : .....

SAHAM Assurance

membre de Sanlam group

Déclaration de maladie N° 18363908

A

Maladie ☐ Maternité ☐ Optique ☐ Traitements spéciaux ☐

Société contractante

Société contractante : .....
N° de police : .....
N° d'adhésion : .....
N° d'adhésion du conjoint : .....

Cachet de la société contractante

Renseignements concernant l'assuré(e)

Nom : FATIHA Prénom(s) : ZENZANI
N° de C.I.N : BK 72515 Date de naissance : .....
Adresse : 60 Résidence Houria 4ème Etage N° 17 Q. H Casablanca Ville : Casablanca Islam Cp
Montant des frais engagés : 1008 DH N° GSM : 0661777669

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration.
Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca le 31 03 2022

Signature de l'assuré(e)

Clause « Protection des données personnelles »

SAHAM Assurance, Société anonyme d'assurances et de réassurance au capital social de 41 140 400 de DH. Entreprise régie par la loi n°17 - portant code des assurances - siège social 216, Boulevard Zerktouni 20100 Casablanca Maroc - RC Casablanca 21241 - TP 35211 - Tax professionnelle 35211 - CNSS 4 - 3086825 - ICE 000270354000017 - Tél: 05 22 19 16 00 - Fax: 05 22 20 60 97

VOLET DÉTACHABLE

Déclaration de maladie N° **18363908**

Remplissez ce volet, détachez-le et conservez-le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Exemplaire à conserver par l'assuré(e).

Police n° : .....
Adhésion n° : .....
Nom de l'assuré(e) : .....
Date de consultation : .....
Total des frais engagés : .....
Date de dépôt : .....

À remplir par le Médecin

Renseignements concernant le patient

Nom du patient : Prénom(s) du patient :

Date de naissance : Lien de parenté avec l'assuré(e) :

Nature de la maladie :

S'il s'agit d'un accident, en indiquer la cause :

Fait à : , le 10/3/2021

Détail des soins (à remplir par le Médecin)

Date des actes médicaux	Nombre d'actes	Nature et coefficient	Montant détaillé des honoraires	Signature et cachet du médecin attestant le paiement des actes
10/3/21	4	1	300 DH	
15/3/21	4	1		
30/3/2021	4	1	300 DH	

Exécution des ordonnances (à remplir par le Pharmacien)

Date de l'ordonnance	Montant de la facture	Cachet du pharmacien attestant le paiement de la
10/3/21	112.10	
30/3/21	638.10	

Analyses - Radiographies

Date de l'ordonnance	Désignation des coefficients	Montant des honoraires	Signature et cachet du laboratoire ou du radiologue
03/21	RX ASTIF	200 DH	
24/3/21	B 200	268,00	

Actes médicaux ou paramédicaux - Auxiliaires médicaux

Devis 8 Nombre de séances : Établi le :

Facture 8 Nombre de séances : Établi le :

Date des soins	Nombre AM	PC	IM	IV	Montant détaillé des honoraires	Signature et cachet du praticien N° d'autorisation d'exercer au MAROC
10/3/2021	6	X			90 DH	

Cadre réservé à SAHAM Assurance

Médecin conseil	Fiche dossier

www.sahamassurance.ma

Exemplaire à conserver par l'assuré

Exemplaire à conserver par l'intermédiaire.

www.sahamassurance.ma

Docteur Seddiki Afif
CHIRURGIEN UROLOGUE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France
Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc
Andrologie - Troubles sexuels
Stérilité masculine
Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف
إختصاصي في جراحة
الجهاز البولي والتناسلي
درع سابقا بمستشفيات فرنسا
ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب
خريج كلية باريز

PHARMACIE DE LA SECURITE
Hada ELAMRA BENCHEKROUN
130, Bd My Driss 1er
Tél: 0522 86 22 45 - Casablanca

Fait à Casablanca, le 30/3/2021

INPE
092052703

Mme ZEMZAMI ep BENLHOUMA
Fatiha

45.20 x11 1e Glucophage 850 mg
23.50 1x3j x 3mois
76.70 x5 2e Diamicron 60 mg
1x2j x 3mois
131.40 x3 3e Lostalyn 50 mg
1j x 3mois
638,40

Docteur SEDDIKI Afif
Rés. Charles Nicolas
Place Ch. Nicolas
Tél. 05 22 29 86 65 / 06 61 21 03 05

Place Charles Nicolas, Résidence Nour, 1er étage Apt. n°2, Quartier des Hôpitaux (face Institut Pasteur)
Urgences : 06 61 21 03 06 - Cabinet Tél. : 05 22 29 86 65

Docteur Seddiki Afif
CHIRURGIEN UROLOGUE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France
Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc
Andrologie - Troubles sexuels
Stérilité masculine
Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف
إختصاصي في جراحة
الجهاز البولي والتناسلي
براج سابقا بمستشفيات فرنسا
ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب
خريج كلية باريس

Fait à Casablanca, le 10/3/2021

Mme ZEMZAMI ep BENLHOUAR
Fatiha

PHARMACIE DE LA SECURITE
Nadia et Mariya BENCHEKROUN
130, Bd. Moulay Driss 1er
et Rue de la sécurité Sociale
Tél : 0522 86.22.45 - Casablanca

Mb.90 1° Xmid 7j ujlla in
27.50 S. 1/1 × 6j
37.70 2° Opalgan cp
S. 2-2-2 × 10j
Jd2.10 3° Dolgyr
S. 1/1 × 6j

Place Charles Nicolas, Résidence Nour, 1er Etage Apt. n° 2, Quartier des Hôpitaux (face Institut Pasteur)
Urgences : 06-61 21 03 06 - Cabinet Tél. : 05 22 29 86 65

LABORATOIRE ATLAS D'ANALYSES MEDICALES

Dr ALAOUI Mohamed Spécialiste en Biologie Médicale
Immeuble Angle Bd. Abdelmoumen Rue Chatila 1er étage N2 casablanca
TEL. +212(0)522 25 28 49 FAX. +212(0)522 25 03 82
INP: 093060549
ICE : 001851292000089
IF : 40199501

Assuré	
Matricule	
Bénificiaire	ZEMZAMI FATIHA
Prise en charge N°	

FACTURE N° 51309 Facturé le : 24/03/2021

Analyses :			
ETUDE CHIMIQUE DUN CALCUL	B	200,00	
		Total analyses :	268,00 Dh

Prélèvements :		
	Total Prélèvements :	0,00 Dh

Total <<B>>	200	Soit un montant total :	268,00 Dh

Arrêtée la présente facture à la somme de :

DEUX CENT SOIXANTE HUIT DIRHAMS

Dr Alaoui Mohamed
Biologiste

Docteur Seddiki Afif
CHIRURGIEN UROLOGUE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France
Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc
Andrologie - Troubles sexuels
Stérilité masculine
Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف
إختصاصي في جراحة
الجهاز البولي والتناسلي
جراح سابقا بمستشفيات فرنسا
ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب
خريج كلية باريز

Fait à Casablanca, le 15/3/2021

Mme ZEMZAMI Fatiha

1° Analyse
Compte rendu
renale

Place Charles Nicolas, Résidence Nour, 1er étage Apt. n°2, Quartier des Hôpitaux (face Institut Pasteur)
Urgences : 06 61 21 03 06 - Cabinet Tél. : 05 22 29 86 65

Ctre **RADIOLOGIE ABDELMOUMEN**

مركز الفحص بالأشعة
عبد المـومن

Dr BENNISS Fouad — الدكتوربنيس فؤا د

Pr FATHI Khadija — الأستاذة فتحي خديجة

Dr LARAQUI BENSOUDA Nadia — الدكتورة العراقي بنسودة نادية

Médecin Traitant : DR SEDDIKI Afif

Nom du patient : MME ZEMZAMI FATIHA

Examen réalisé : RX ASP F — Date : 15/03/2021

COMPTE RENDU

RESULTATS :

- Image de tonalité calcique se projetant sur l'aire rénale gauche correspondant vraisemblablement à un calcul urinaire.
- Aspect radiologique ostéo-articulaire et disco-somatique normal par ailleurs.

Confraternellement
DR F. BENNISS

Bd Abdelmoumen, N° 7 Rue Soumaya, Casablanca

Tél. : 05.22.23.31.18/91 - 05.22.99.10.83 : الهاتف
Fax. : 05.22.98.19.17 : الفاكس
E-mail : radiologie-ab@menara.ma : البريد الإلكتروني
Site Web : http // www.radiologieabdelmoumen.ma

شارع عبد المومن، زنقة سمية رقم 7، الدار البيضاء

C.N.S.S. : 8064602 - I.F. : 40289799 - PATENTE N° : 34782741 - ICE : 001699442000043

Docteur Seddiki Afif
CHIRURGIEN UROLOGUE
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris - France
Ancien Urologue des Hôpitaux Militaires - Maroc
Andrologie - Troubles sexuels
Stérilité masculine
Diplômé de l'Université de Paris

الدكتور الصديقي عفيف
إختصاصي في جراحة
الجهاز البولي والتناسلي
دراج سابقا بمستشفيات فرنسا
ثم المستشفيات العسكرية بالمغرب
خريج كلية باريز

Fait à Casablanca, le 16/3/2021

Mme ZEMZAMI épouse SENLHOUAL
Fatiha
née ASSFAR
Ouiza

Docteur SEDDIKI AFIF
Chirurgien Urologue
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
Tél. : 05 22 29 86 65 - 06 61 21 03 06

Place Charles Nicolas, Résidence Nour, 1er étage Apt. n°2, Quartier des Hôpitaux (face Institut Pasteur)
Urgences : 06 61 21 03 06 - Cabinet Tél. : 05 22 29 86 65

Ctre **RADIOLOGIE ABDELMOUMEN**

مركز الفحص بالأشعة
عبد المومن

Dr BENNISS Fouad — الدكتور بنيس فؤاد
Pr FATHI Khadija — الأستاذة فتحي خديجة
Dr LARAQUI BENSOUDA Nadia — الدكتورة العراقي بنسودة نادية

Date : 15/03/2021

Facture N° : **001433/2021**

- Nom patient : MME **ZEMZAMI FATIHA**
- Examen(s) réalisé(s) : RX ASP F
-
- Net à payer T.T.C : 200 DH
- Arrêter la présente facture a la somme de :DEUX CENTS DH
- Mode de règlement : ESPECE

L'adherent :	Signature & cachet

Bd Abdelmoumen, N° 7 Rue Soumaya, Casablanca
Tél. : 05.22.23.31.18/91 - 05.22.99.10.83 - هاتف
Fax. : 05.22.98.19.17 : فاكس
E-mail : radiologie-abd@menara.ma : البريد الإلكتروني
Site Web : http:// www.radiologieabdelmoumen.ma
شارع عبد المومن، زنقة سمية رقم 7، الدار البيضاء
C.N.S.S. : 6064602 - I.F. : 40788799 - PATENTE N° : 34787741 - ICE : 001489447000047

ALAOUI Mohamed
Biologiste
Diplômé des Facultés
de Médecine et de Pharmacie de Montpellier

ATLAS
LABORATOIRE
D'ANALYSES MEDICALES

العلوي محمد
إحيائي
خريج كليتي الطب و الصيدلة بمونبوليي

مختبر التحليلات الطبية أطلس
LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES ATLAS

CES: Hématologie • Bactériologie - Virologie
Immunologie • Parasitologie - Mycologie

MADAME ZEMZAMI FATIHA

Préscripteur : Dr. SEDDIKI Afif

Prélèvé à : ::

Dossier N° : 1032454270 **du : 24/03/2021**

Compte Rendu d'Analyses

EXAMEN MACROSCOPQIUE: **DUR**

COMPOSITION CHIMIQUE : **OXALATE DE CALCIUM**

1032454270

Immeuble Angle Bd. Abdelmoumen Rue Chatila. 1er étage N°2 - Casablanca
Tél.: 05.22.25.28.49. - Tél/Fax : 05. 22.25.03.82 - Gsm: 06.71.36.28.88 - E-mail : laboatlasalaoui@hotmail.com

Xénid®

Diclofénac de sodium

soln

LOT : 1343
PER : 09/22
PPV : 46,90 DH

Formes et présentations :
- Comprimés enrobés
XENID 50 mg : Etui de 30 comprimés.
XENID 25 mg : Etui de 30 comprimés.
Excipient à effet notoire : Lactose
- Suppositoires
XENID 25 mg : Etui de 10 suppositoires.
XENID 100 mg : Etui de 10 suppositoires.
- Solution injectable I.M.
XENID 75 mg / 3 ml : Etui de 2 et 6 ampoules.
Excipients à effet notoire : Mannitol, Alcool benzylique, Propylène glycol, Disulfite de sodium.

Indications :
- Chez l'enfant, elles sont limitées au traitement des rhumatismes inflammatoires infantiles (xénid 25 mg comprimés et suppositoires).
- Chez l'adulte, elles sont limitées au :
- Traitement symptomatique au long cours : des rhumatismes inflammatoires chroniques, notamment polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante(ou syndromes apparentés, tels que les syndromes de Fiessinger-Leroy-Reiter et rhumatisme psoriasique) ; de certaines arthroses douloureuses et invalidantes.
- Traitement symptomatique de courte durée des poussées aiguës des rhumatismes articulaires (épaules douloureuses aiguës, tendinites...) des arthrites microcristallines ; des arthroses, des lombalgies et radiculalgies sévères.
- Dysménorrhées essentielles (Xénid 50 mg comprimés uniquement).
- Traitement d'entretien des affections rhumatismales chroniques pour lesquelles, lors de l'utilisation des formes dosées à 25 mg et 50 mg, la posologie de 100 mg par jour s'est révélée adéquate ;
- Traitement des sciatiques aiguës, des lombalgies aiguës, des rhumatismes inflammatoires en poussée aiguë, des crises de coliques néphrétiques (Xénid injectable uniquement).

Contre indications :
- Ulcère gastrique ou duodénal en évolution.
- Hypersensibilité au Diclofénac.
- Insuffisance rénale ou hépatique sévère.

Grossesse et allaitement :
- Il est recommandé de ne pas administrer XENID lors des 3 derniers mois de la grossesse.
- Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

Précautions d'emploi :
- Une surveillance médicale étroite est indispensable chez les patients présentant des symptômes suggérant des troubles gastro-intestinaux, des antécédents évocateurs d'ulcère gastro-intestinal, une colite ulcéreuse ou une maladie de crohn, ou encore une atteinte de la fonction hépatique.
- Lors de la varicelle, il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.

Effets indésirables :
Gêne gastrique, nausées, douleurs d'estomac, vomissements, irritation du rectum (suppositoires) et exceptionnellement infections graves de la peau en cas de varicelle.

Posologie et mode d'emploi :
*** Enfants** : 2 à 3 mg / kg / jour, soit par exemple :
1 suppositoire à 25 mg par jour chez l'enfant de 10 à 15 kg.
2 comprimés ou suppositoires à 25 mg par jour chez l'enfant au dessus de 15 kg.
Les comprimés sont à absorber entiers, sans les croquer, avec un verre d'eau. En cas de crise aiguë, il est conseillé de prendre les comprimés avant le repas.
Le choix de l'utilisation de la voie rectale ou orale s'est déterminé que par la commodité d'administration du médicament.
*** Adultes** :
- En traitement d'attaque, dans les cas aigus ou lorsqu'un effet intense est recherché : 150 mg/ jour en 3 prises.
soit 6 comprimés à 25 mg ou 3 comprimés à 50 mg en trois prises.
soit 1 suppositoire à 100 mg, à compléter par une forme orale prise à distance.
- En traitement d'entretien (ou d'emblée chez certains malades), une posologie de 75 mg ou 100 mg par jour sera prescrite.
soit des comprimés à 25 mg et / ou à 50 mg en 2 ou 3 prises.
A avaler sans croquer avec un verre d'eau, de préférence pendant ou après un repas. Quand les symptômes sont plus prononcés durant la nuit, il est conseillé de prendre le comprimé le soir.
soit 1 suppositoire à 100 mg le soir au coucher.
- Dysménorrhées : 2 comprimés à 50 mg en 2 prises.
Injectable :
La posologie est d'une injection intramusculaire par jour pendant deux jours ; si besoin, le traitement peut être complété par la prise d'un comprimé diclofénac 50 mg.
Au-delà de ces deux jours, poursuivre par la voie orale ou rectale.
Les injections doivent être faites d'une façon rigoureusement aseptique dans la partie externe du cadran supéro-externe de la fesse, profondément et lentement ; lorsqu'elles sont répétées, il est recommandé de changer de côté à chaque injection. Il est important d'aspirer avant d'injecter afin de s'assurer que la pointe de l'aiguille n'est pas dans un vaisseau.
En cas de forte douleur au moment de l'injection, arrêter celle-ci immédiatement.

Mode de conservation :
- **Comprimés** :
A conserver à une température inférieure à 30°C, à l'abri de l'humidité.
- **Suppositoires** :
A conserver à l'abri de la chaleur.
- **Solution injectable** :
A conserver à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C.
Après ouverture : le produit doit être utilisé immédiatement.

Laboratoires **Biogalénique**
Laboratoire Pharmaceutique **NOVOPHARMA**
Casablanca

Spasfon® 80 mg

Imp 1/2/09

Spasfon® 80 mg

Comprimé enrobé

Phloroglucinol/Trimethylphloroglucinol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous doute, de ou à voi
- Ce méd Ne le dc cas de r noci
- Si l'un d remarqu cette nc pharma

COMPO
Phloroglu
Quelques
Triméthyl
Pour un com

Les autres composants : ..., saccharose, acétate de polyvinyle, amidon de blé, acide stéarique, stéarate de magnésium, talc, gomme arabique, gélatine, dioxyde de titane (E 171), érythrosine (E 127), cire de carnauba.

Excipients à effet notoire : lactose, amidon de blé, saccharose

FORME ET PRESENTATION :
Comprimé enrobé Boîte de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :
ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE
(A.: appareil digestif et métabolisme)
(G: système génito-urinaire

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :
Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

CONTRE-INDICATIONS :
Ne prenez jamais Spasfon®, comprimé enrobé :
- en cas d'allergie à l'un des composants.
- en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten, en raison de présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde
En raison de présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomalase (maladies métaboliques rares).
En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ces dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

Précautions d'emploi
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS :
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
L'utilisation de ce médicament, ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.
L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Spasfon® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
Posologie
Chez l'adulte :
Prendre 2 comprimés par prise, trois fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.
Les comprimés pourront prendre le relais d'un traitement d'attaque sous forme injectable, à la posologie maximale de 6 comprimés par 24 heures.
Utilisation chez les enfants
Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.
Chez l'enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé par prise, deux fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures.
Chez l'enfant de plus de 6 ans, il conviendra de s'assurer que les comprimés peuvent être avalés sinon une autre forme sera préférée.
Mode et voie d'administration
Voie orale.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
Comme tous les médicaments, **Spasfon®**, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
- Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :
Aucune condition particulière de conservation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser **Spasfon®**, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Date de la notice : Janvier 2018

Fabriqué et distribué par Sanofi-Aventis
Zone Industrielle Tassila Inerguene Agadir Maroc
Sanofi Winthrop Industrie
Sous licence Aventis France
Dr M EL BOUHMADI Pharmacien Responsable

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

IDOL® 100 mg
Boîte de 10 et 20 suppositoires
D.C.I : Indométacine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes, même en cas de suspicion d'une maladie identique.

LOT : 2620335
FAB : 04.2025
PPV 37,70 DH

- Thé
- Tabac
- Alcool
- Bière
- Vin
- Apéritifs.

2. QUELLES ...

PRENDRE IDOLE 100 mg, suppositoire ?

Lisez des informations ci-dessous avant de prendre de ce médicament :

• Ne prenez jamais IDOL® 100 mg, suppositoire dans les cas suivants :
- Au delà de 5 mois de grossesse révélée (24 semaines d'aménorrhée).
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine).
- Antécédent d'allergie à l'un des excipients.
- Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou cérébraux liés à des traitements antérieurs par AINS.
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum actuel en évolution ou récidivant.
- Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours.
- Maladie grave du foie.
- Maladie grave du rein.
- Maladie grave du coeur.
- Enfant de moins de 15 ans.
- Inflammation ou saignements récents du rectum (sorte indication liée à l'utilisation de la voie rectale).

• Mise en garde et précautions d'emploi :

Autres attentions avec IDOL® 100 mg, suppositoire :

Mises en garde spéciales :

Les médicaments tels que IDOL® 100 mg, suppositoire pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée du traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), veuillez en parler avec votre médecin ou votre pharmacien.

AVANT LE TRAITEMENT :

PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN, EN CAS :
- D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une urticaire, une sensibilité chronique au rhinite polypeux (sorte de nez). L'administration de cette substance peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certaines sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique « N'utilisez jamais IDOL® 100 mg, suppositoire »).
- De troubles de la coagulation, de traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire concomitant. Ce médicament peut entraîner des hémorragies gastro-intestinales graves.
- D'antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien, hernie hiatale, hémorragie digestive).
- De maladie du foie, du rein ou du cœur.
- De troubles psychiques, d'épilepsie, de maladie de Parkinson.
- De traitement par diurétique ou d'intervention chirurgicale majeure.

AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS :
- De troubles de la vue (sensation de brouillard), PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN.
- De crise de tête paroxystique PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN.
- De signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, œdème gonflement du visage et du cou, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE.
- D'hémorragie gastro-intestinale (sang dans les selles ou vomissements de sang) ou ulcère, perforation de sang dans les selles ou coloration des selles en noir, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE.
- D'apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à une lésion bouillon avec bulles ou cloques, ulcérations, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE.

Précautions d'emploi :

Si vous êtes une femme, IDOL® 100 mg, suppositoire peut altérer votre fertilité. Cette utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui souhaitent concevoir enfant. Chez les femmes qui rencontrent des difficultés pour concevoir ou chez les qui subissent des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre IDOL® 100 mg, suppositoire.

Ce médicament existe sous d'autres dosages et autres formes pharmaceutiques qui vous pourraient être plus adaptées.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ne pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens incluant les anti-sélectifs de la cyclo-oxygénase. Et le cas de l'acide acétylsalicylique (aspirine).

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Autres prises / Autres médicaments :

Interaction d'autres médicaments :

Indiquez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, même s'il s'agit d'un médicament ancien ou courant, car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont associés.

Il est toujours préférable de prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou des médicaments suivants avant de prendre IDOL® 100 mg, suppositoire :
- le lithium
- le méthotrexate
- l'acide acétylsalicylique ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens
- les anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antagonistes plaquettaires ou autres thrombolytiques contre la lacoplane
- Lithium
- Méthotrexate
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II.
- Lantanil, antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine).
- Fenestrenol.
- Ciclosporine, tacrolimus.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

• Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Au cours des 5 PREMIERS MOIS de votre grossesse votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

À PARTIR DU 6ème MOIS DE GROSSESSE, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE VOUS-MÊME CE MÉDICAMENT, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire (et rénal, et cela, même avec une seule prise.

Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers, que votre gynécologue vous prescrive ce médicament. Dans ce cas, respecter STRICTEMENT l'ordonnance de votre médecin.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement :

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Effets sur la capacité de conduire et utilisation des machines :

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner une somnolence, des vertiges ou des troubles visuels.

• Informations importantes concernant certains composants de IDOL® 100 mg :

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE IDOL® 100 mg, suppositoire ?

Posologie :

RÉSERVÉ À L'ADULTE (plus de 15 ans)

La posologie est fonction de l'indication et de la réponse du patient.

Une voie de 1 à 2 suppositoires à 100 mg par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Mode d'administration :

Voie rectale.

Le choix de cette voie d'administration n'est déterminé que par la commodité d'administration de ce médicament.

Se laver les mains après manipulation du suppositoire.

Durée du traitement :

L'utilisation de cette voie d'administration doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale rectale aux risques de la voie générale.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

• Si vous avez pris plus de IDOL® 100 mg, suppositoire que vous n'aurez dû :

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

• Si vous oubliez de prendre IDOL® 100 mg, suppositoire :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, IDOL® 100 mg, suppositoire est susceptible d'entraîner des effets indésirables, bien que tout le monde n'en soit pas sujet. Ce médicament tel que IDOL® 100 mg, suppositoire pourrait augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

• Peuvent survenir :
- des réactions allergiques :
- Cutanées de type éruption, urticaire, démangeaisons, inflammation des vaisseaux sanguins, rougeur, exceptionnellement : éruption cutanée lors d'une exposition au soleil.
- Respiratoires de type crise d'asthme, œdème pulmonaire.
- Générales, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke).
- rarement, un décollement de la peau pouvant rapidement atteindre de façon très grave à tout le corps.
- rarement, psoriasie.

• Dans certains cas rares, il est possible qu'survienne une hémorragie digestive (sorte rectorrage « Rissa en garde spéciales »).

Cette ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.

Dans tous ces cas, arrêter le traitement et avertir un médecin.

• Peuvent survenir également :
- Des troubles digestifs : douleurs d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, constipation.
- Des maux de tête, vertiges, fatigue intense, confusion mentale, syncope, somnolence, insomnie, angoisse, cauchemars.
- Des troubles psychiques : délires, hallucinations.
- Des troubles neurologiques : atteinte des nerfs des membres, mouvements anormaux, tremblements involontaires et plus rarement, fourmillements, difficultés d'élocution.
- Des troubles visuels : rarement, douleurs des globes, vision trouble.
- Des troubles du fonctionnement des reins.
- Des troubles de l'audition : rarement, surdité.
- Des troubles cardiaques : rarement, hypertension, palpitations, douleur thoracique, troubles du rythme, œdèmes périphériques.
- Une augmentation du nombre de crises convulsives chez les patients épileptiques ; une aggravation d'une maladie de Parkinson.
- Une chute des cheveux.
- Une douleur au niveau des seins ou une augmentation de leur volume ; des saignements vaginaux.
- Fièvre, transpiration, rougeur du visage, saignements de nez.

Dans tous ces cas, avertir votre médecin.

- Des cas d'ulcère ou de perforation gastro-intestinaux ont pu être observés.
- On est observées également des modifications des tests sanguins (augmentation du taux de sucre ou de potassium, baisse du taux de globules blancs, plaquettes rouges et des plaquettes), hépatiques et rénal, provoqué être graves.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer tous effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et de la Pharmacovigilance. Site internet : www.capm.ma.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER IDOL® 100 mg, suppositoire ?
- Médicament à conserver dans son état original dans un endroit sec à température inférieure à 25°C.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas utiliser IDOL® 100 mg, suppositoire après la date de péremption figurant sur la boîte et sur les blisters. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.
- Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient IDOL® 100 mg ?

• La substance active est l'indométacine. Chaque suppositoire contient : indométacine ..... 100,00 mg.

• Les autres composants sont :
Glycérides monosaturés solides.

Forme pharmaceutique et contenu :
IDOL® 100 mg, se présente sous forme de suppositoire. Boîte de 10 et 20 suppositoires.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché au Maroc :
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE BIPHA
21 - Lot 149 - Had Soualem
Province de Berrechid-Maroc

La dernière date à la quelle cette notice a été révisée :
Juin 2017

Conditions de prescription et de délivrance :
Tableau B (liste I).

Biopha 120074 v03

DIAMICRON 60 mg

Gliclazide — *Comprimés sécables à Libération Modifiée*

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice: voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09.

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée :

- si vous êtes allergique au gliclazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6, ou à d'autres médicaments de la même classe (sulfonylurées), ou à d'autres médicaments apparentés (sulfamides hypoglycémiants) ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (de type 1) ;
- si vous avez des corps cétoniques et du sucre dans vos urines (ce qui peut signifier que vous avez une acido-cétose diabétique), un pré-coma ou un coma diabétique ;
- si vous souffrez d'insuffisances rénale ou hépatique sévères ;
- si vous prenez des médicaments pour traiter des infections fongiques (miconazole) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60mg, comprimé sécable à libération modifiée») ;
- si vous allaitez (voir rubrique «Grossesse, allaitement et fertilité»).

Avertissements et précautions:

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.

Vous devez respecter le traitement prescrit par votre médecin pour atteindre une glycémie normale. Cela signifie qu'à part la prise régulière du traitement, vous respectez un régime alimentaire, faites de l'exercice physique et, quand cela est nécessaire, perdez du poids.

Durant le traitement par gliclazide, un contrôle régulier de votre taux de sucre dans le sang (et éventuellement dans les urines), et également de votre hémoglobine glycquée (HbA1c), est nécessaire.

Dans les premières semaines de traitement, le risque d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) peut être augmenté. Dans ce cas, un contrôle médical rigoureux est nécessaire.

Une hypoglycémie peut survenir :

- si vous prenez vos repas de manière irrégulière ou si vous sautez un repas,
- si vous jeûnez,
- si vous êtes malnourri,
- si vous changez de régime alimentaire,
- si vous augmentez votre activité physique et que votre apport en hydrates de carbone ne compense pas cette augmentation,
- si vous buvez de l'alcool, en particulier si vous sautez des repas,
- si vous prenez d'autres médicaments ou des remèdes naturels en même temps,
- si vous prenez de trop fortes doses de gliclazide,
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles fonctionnels de la glande thyroïdienne, de la glande hypophysaire ou du cortex surrénalien),
- si votre fonction rén[illegible]

Si vous avez une hypo[illegible]
Maux de tête, faim, [illegible]
agressivité, manque de [illegible]
confusion, troubles de l[illegible]
et sensation d'impuissa[illegible]
Les signes et sympto[illegible]
anxiété, battements [illegible]
artérielle, forte douleu[illegible]
(angine de poitrine).
Si le taux de sucre [illegible]
confusion importante [illegible]
respiration peut être superficielle et les battements de votre cœur [illegible] prendre conscience.

Dans la plupart des cas, les symptômes d'une hypoglycémie disparaissent très rapidement si vous consommez du sucre, par exemple des comprimés de glucose, morceaux de sucre, jus de fruits, thé sucré.

Vous devez donc toujours avoir sur vous de sucre (comprimés de glucose, morceaux de sucre). Souvenez-vous que les édulcorants ne sont pas efficaces. Veuillez contacter votre médecin ou l'hôpital le plus proche si la prise de sucre n'est pas efficace ou si les symptômes réapparaissent.

Les symptômes d'une hypoglycémie peuvent être absents, être moins évidents ou se développer très lentement ou vous pouvez ne pas vous rendre compte à temps que votre taux de sucre dans le sang a baissé. Ceci peut se produire chez les personnes âgées qui prennent certains médicaments (par exemple les médicaments agissant sur le système nerveux central et les bêta bloquants).

Si vous êtes en situation de stress (par exemple accident, opération chirurgicale, fièvre, ...), votre médecin peut temporairement faire un relais par un traitement par insuline.

Les symptômes d'une hyperglycémie (fort taux de sucre dans le sang) peuvent survenir lorsque le traitement par gliclazide n'a pas encore suffisamment réduit la glycémie, lorsque vous n'avez pas respecté le traitement prescrit par votre médecin ou vous prenez des préparations à base de Millepertuis (Hypericum perforatum) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée») ou dans des situations particulières de stress. Ces derniers peuvent inclure soif, envie fréquente d'uriner, bouche sèche, peau sèche qui démange, infections de la peau et performances réduites.

Si ces symptômes surviennent, vous devez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Une perturbation de la glycémie (faible ou fort taux de sucre dans le sang) peut survenir lorsque le gliclazide est pris en même temps que des médicaments de la classe des antibiotiques appelés fluoroquinolones, en particulier chez les patients âgés. Dans ce cas, votre médecin vous rappellera l'importance de surveiller votre glycémie.

Si vous avez des antécédents familiaux ou si vous êtes atteint d'un déficit en Glucose-6-Phosphate-Déshydrogénase (G6PD) (anomalie des globules rouges), une baisse du taux d'hémoglobine et une destruction des globules rouges (anémie hémolytique) peuvent survenir.

Des cas de porphyrie aiguë ont été décrits avec d'autres médicaments de la classe des sulfonylurées chez les patients atteints de porphyrie (maladies génétiques héréditaires provoquant une accumulation dans l'organisme de porphyrines ou de précurseurs de porphyrines).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée, n'est pas recommandé chez l'enfant en raison d'un manque de données.

Autres médicaments et DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

L'effet hypoglycémiant du gliclazide peut être renforcé et les signes d'une hypoglycémie peuvent survenir lorsque vous prenez l'un des médicaments suivants :

- autres médicaments utilisés pour traiter une hyperglycémie (antidiabétiques oraux, agonistes des récepteurs GLP-1 (ex exénine)),
- antibiotiques (par exemple sulfamides, quinolones),
- médicaments pour traiter l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque (bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion tels que captopril ou enalapril),
- médicaments pour traiter les infections fongiques (miconazole, fluconazole),
- médicaments pour traiter les douleurs de l'endomètre ou du fibrome (antagonistes des récepteurs H2),
- médicaments pour traiter la dépression (inhibiteurs de la monoamine oxidase),
- analgésique ou anti-inflammatoire (phénylbutazone, ibuprofène),
- médicaments contenant de l'alcool.

L'effet hypoglycémiant du gliclazide peut être diminué et une hyperglycémie peut survenir lorsque vous prenez l'un des médicaments suivants :

- médicaments pour traiter les troubles du système nerveux central (chlorpromazine),
- médicaments réduisant les inflammations (corticostéroïdes),
- médicaments pour traiter l'asthme ou utilisés pendant l'accouchement (salbutamol, fénoterol et terbutaline),
- médicaments pour traiter les affections du foie, les saignements menstruels importants et l'endométriose (danazol),
- Préparations à base de Millepertuis (Hypericum perforatum).

Une perturbation de la glycémie (faible ou fort taux de sucre dans le sang) peut survenir lorsque DIAMICRON 60 mg est prescrit en même temps que des médicaments de la classe des antibiotiques appelés fluoroquinolones, en particulier chez les patients âgés.

كليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف
كليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف
كليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

ميتفورمين الهيدروكلوريد

يجب قراءة هذه النشرة بتمعن كاملة بانتباه قبل تناول هذا الدواء.
احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها من جديد.
إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
يصف هذا الدواء لك شخصيا. لا تعطه أبدا لأحد سواك حتى ولو كانت لديه الأعراض التي لديك لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
إذا تفاقم أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

1 - ما هو كليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج، قرص مغلف؟
3 - ما هي طريقة تناول كليكوفاج، قرص مغلف؟
4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
5 - ما هي طريقة حفظ كليكوفاج، قرص مغلف؟
6 - معلومات إضافية و معلومات إضافية

1 - ما هو كليكوفاج، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلي العلاجي A10BA02 : code ATC

دواعي الاستعمال:
يحتوي كليكوفاج على ميتفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري، ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بيغوانيدات.
الأنسولين هرمون يفرزه البنكرياس. يسمح الجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكر) الموجود في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز إما لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقا.
عندما تكون مريضا بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الأنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرا على استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوفاج على تخفيض معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
إذا كنت بالغا ومصابا من دون ذلك، يسمح لك تناول كليكوفاج على المدى الطويل، للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المضادية للسكري. يشرك كليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟
يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 (المسمى كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستخدم المرضى البالغون تناول كليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية فائقة التنظيم أو إنسولين).
يستخدم الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال:
لا تتناول أبدا كليكوفاج في الحالات التالية:
- إذا كنت تعاني من الأرجة (الحساسية المفرطة) تجاه الميتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من حماض في الكلى.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلا فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورة صارمة، مثلا، تقيؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حماض لبني (انظر "خطر حماض لبني" أسفله) أو حماض كيتوني. الحماض الكيتوني إصابة يكون في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبات سكري لدى الأعراض. في حالة فرط الدم في السكر، تنفس سريع وعميق، الرائحة في الفم تفس أو رائحة فاكهية عن معاطة.
- إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (الجفاف)، مثلا على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الجفاف إلى مشاكل كلوية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات و إحتياطات").
- إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثلا التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكليتين قد يؤدي الالتهاب الحاد إلى مشاكل في الكليتين من شأنها تعريضك لخطر الحماض اللبني (انظر "أنه" و كليكوفاج أدناه).
- إذا كنت تتناول علاجا ضد القصور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس، مثلا من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات و إحتياطات").

- إذا كنت سنعيك بكثرة للتصويرات الإشعاعية.
- إذا كنت تعاني من مرض الكبد.
- إذا كنت تعاني من الإدمان على الكحول.
- إذا كنت تعاني من الإدمان على الكحول.
- إذا كنت تعاني من الإدمان على الكحول.

LOT 201451
EXP 11/2025
PPV 45.20DH

من
إذا كان أي من هذه الحالات ينطبق عليك، اتصل بطبيبك. سيقرر طبيبك ما إذا كنت تريد أن تتوقف عن تناول كليكوفاج أو تقرر خصوصا إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطا بالحماض. إن هذا مهم لتجنب أي مشاكل كلوية أخرى. الجفاف، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة أو لبرد سيؤثر أقل من الماء، تحدث مع طبيبك للحصول على نصيحة من الطبيب. توقف عن تناول كليكوفاج وخذ المشورة الطبية بالطبيب أو بطبيب مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض اللبني:
- القيء
- اضطراب في المعدة (آلام في البطن)
- تشنجات العضلات
- الشعور العام بوجود الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم وبطء ضربات القلب.

الحماض اللبني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى.
إذا اضطررت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول كليكوفاج في وقت و بعد العملية سوف يقرر طبيبك متى تتوقف وستستأنف عاجلا باستخدام كليكوفاج.
كليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم لكن، إذا تناولت كليكوفاج في بعض الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلفاميدات المخفضة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، الغليتينيدات). هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أصبحت بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق.
أثناء فترة العلاج بكليكوفاج، سيقوم طبيبك بفحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل سنويا أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسنا و / أو عندما وظائف الكلى.

الأطفال لا يتناول.

معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ: لا ينطبق.

تناول أو استعمال أدوية أخرى
إذا كنت مقبلا على حقن وعائي من مادة مبرئة تحتوي على اليود، مثلا لفحص بالأشعة أو بالسكانر، عليك إيقاف تناول كليكوفاج قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول كليكوفاج.
عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول عقاقير مؤخرا أو من السكر أن تتناول أي دواء. عليك قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى. وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.
من المهم بصفة خاصة الإعلام عن الأدوية التالية:
- الأدوية التي تزيد من كمية أبول (مدرات البول).
- الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب، مثل المضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبطات كوكاكس-2، إيبوبروفين و سيليكوكسيب.
- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ACE ومضادات مستقبلات الأنجيوتنسين II).
- شبادات المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تيربوتالين التي تستخدم لعلاج الربو.
- كورتيكوستيرويد المستعملة لعلاج مختلف الاختلالات خاصة التهابات الغدة الدرقية، أو الربو.
- الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم وخاصة إذا كانت وظائف الكلى منخفضة إمثل فيرامابيل، ريفاميبيسين، سيمتيدين، دولوتيغرافير، رانولازين، فريسيتوبير، فاندتانيب، إيزافوكونازول، كريزوتينيب و أولاباريب).
- أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

كليكوفاج مع الكحول:
تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ كليكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض اللبني (انظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

- إذا كنت تعاني من مرض الكبد.
- إذا كنت تعاني من الإدمان على الكحول.
- إذا كنت تعاني من الإدمان على الكحول.
- إذا كنت تعاني من الإدمان على الكحول.

3 - ما هي طريقة تناول كليكوفاج، قرص مغلف؟

يجب اتباع دائما بالجرعة التي يصفها لك الطبيب. في حال الشك عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي.
كليكوفاج لا يحل محل فوائد النظام الغذائي المعتاد. عليك الاستمرار في اتباع نصائح الطبيب الخاصة بالنظام الغذائي والقيام بتمارين بدنية بصورة منتظمة.

الجرعة المعتادة
لدى الأطفال في العاشرة وما فوق ولدى المراهقين: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ من كليكوفاج تقريبا مرة واحدة في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 2000 مغ منوزعة على وجبتين أو ثلاث وجبات.
إن استعمال هذا الدواء لعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 سنة يوصى به فقط بناء على نصائح خاصة من طرف الطبيب. علما بأن الخبرة في ما يخص هذه الفئة من الأعمار محدودة.
لدى الكبار: يبدأ العلاج عادة بـ 500 مغ أو 850 مغ من كليكوفاج مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. الجرعة اليومية القصوى هي 3000 مغ منوزعة على ثلاث وجبات.
إذا كانت وظيفة الكلى لديك ضعيفة: سيصف لك الطبيب الجرعة الأقل.
إذا كان تناول الإنسولين أيضا، سيصف لك الطبيب الجرعة الواجب تناولها من كليكوفاج.
المراقبة
- سيراقب الطبيب بصورة منتظمة معدل السكر في الدم لديك وسيضبط الجرعة التي ستتناولها من كليكوفاج تبعا لمعدل السكر في الدم. عليك استشارة الطبيب بصورة منتظمة، لأن ذلك مهم جدا خاص لدى الأطفال ولدى أو بعض بذلك لدى البالغين.
- سيراقب الطبيب أيضا مرة في السنة على الأقل حالة عمل كليتيك. قد يكون من الضروري إجراء عدة فحوصات إذا كنت مسنا أو في حالة خلل وظيفة كليتك.

طريقة تناول كليكوفاج
يجب تناول كليكوفاج أثناء وجبة الطعام أو بعدها. هذا سيسمح بتحد التأثيرات غير المرغوبة على الجهاز الهضمي.
لا تسحق القراص ولا تمضغها. يبلع كل قرص مع كأس ماء.
- إذا كنت تتناول جرعة واحدة في اليوم، تناولها في الصباح (مع وجبة الفطور).
- إذا كنت تتناول جرعتين في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء).
- إذا كنت تتناول ثلاث جرعات في اليوم، تناول جرعة في الصباح (مع وجبة الفطور) جرعة ظهرا (مع وجبة الغداء) وجرعة في المساء (مع وجبة العشاء).
إذا شعرت، بعد بضع الوقت، بأن مفعول كليكوفاج قوي جدا أو ضعيف جدا، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي بذلك.
الجرعة المفرطة
إذا تناولت من كليكوفاج أكثر مما كان يلزم
إذا تناولت من كليكوفاج أكثر مما كان يلزم، قد يسبب ذلك حماضا لبنيا. أعراض الحماض اللبني غير محددة، مثل التقيؤ، الوجاع في البطن مع تشنجات عضلية، إحساس عام بالانزعاج مع نعب شديد وصعوبات في التنفس.
وتتمثل الأعراض الأخرى انخفاض في درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب.
إذا كنت تشعر أي من هذه الأعراض، تحدث إلى رأيه الطبيب على الفور لأن الحماض اللبني يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.
توقف عن تناول كليكوفاج فورا واتصل بالطبيب أو اذهب مستشفى على الفور.
إذا نسيت تناول كليكوفاج
لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة النسية. تناول الجرعة التالية في موعدها المعتاد.
خطر متلازمة الانقطاع
إذا توقفت عن أخذ كليكوفاج
لا ينطبق
إذا كان لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

يمكن أن يسبب الجلوكوفاج تأثيرا جانبيا نادرا جدا عند وزير على 1 من أصل 10000 شخص، ولكن تأثير جانبي خطير جدا يسمى الحماض اللبني (انظر قسم "التحذيرات والاحتياطات"). إذا حدث هذا، توقف عن تناول كليكوفاج واتصل بالطبيب على الفور أو اذهب إلى أقرب مستشفى لأن الحماض اللبني يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.
ومثل كل الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا جانبية، حتى و لو أن كل الأشخاص غير معرضين لها.

قد تظهر التأثيرات غير المرغوبة التالية:
تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص):
اضطرابات هضمية مثل الغثيان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية. تعد هذه التأثيرات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليكوفاج. قد يساعد توزيع الجرعات خلال النهار وتناول كليكوفاج أثناء وجبات الطعام أو حالة بحدها، استمرت الأعراض، عليك التوقف عن تناول كليكوفاج واستشارة الطبيب.
تأثيرات غير مرغوبة متواترة (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص):
- اضطراب الذائقة.
تأثيرات غير مرغوبة نادرة جدا (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10000 شخص):
- حماض لبني: هذه المضاعفة نادرة جدا، لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت مثلا لأن سلسلة بصورة جيدة.
أعراض الحماض اللبني غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات").
- تغير في الفحوصات البيولوجية في ما يخص الكبد أو الكبد (التهاب الكبد الذي قد يسبب التقيؤ، فقدان الشهية، فقدان لبعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين). إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، عليك التوقف عن تناول كليكوفاج واستشارة الطبيب.
- وجود قعل جلدية مثل احمرار الجلد (حمامي) أو طفح جلدي مع بقع قاتمة.
انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.
الأطفال والمراهقون
وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدتها لتلك التي سجلت لدى الكبار.
الإبلاغ عن الآثار الجانبية
إذا ظهرت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. ينطبق هذا أيضا على أي تأثير غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة. يمكنك التبليغ عن التأثيرات غير المرغوبة مباشرة عبر النظام الوطني للتبليغ من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية. يمكنك أيضا في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5 - ما هي طريقة حفظ كليكوفاج، قرص مغلف؟

يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال وأنظارهم.
لا يجوز استعمال كليكوفاج بعد التاريخ الأقصى للاستعمال المذكور على العلبة أو على الصفيحة المذكلة حرارية بعد علامة « EXP » يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر.
ليس هناك احتياطات خاصة بالحفظ

6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية

لا يجب أبدا طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل. هذه إجراءات لحماية البيئة.
على ماذا يحتوي كليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف؟
المادة الفعالة هي كلوريدات الميتفورمين.
يحتوي كل قرص مغلف على 500 مغ من كلوريدات الميتفورمين، مما يقابل 390 مغ من الميتفورمين قاعدة.
السواغات هي:
بوفيدون (K30)، سليلوز الدقيقي، هيدروميلوز.
ما هو كليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف وما هو محتوى العلبة
يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف، يصرف في علبة تحتوي على 50 قرص.
على ماذا يحتوي كليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف؟
المادة الفعالة هي كلوريدات الميتفورمين.
يحتوي كل قرص مغلف على 850 مغ من كلوريدات الميتفورمين، مما يقابل 662.90 مغ من الميتفورمين قاعدة.
السواغات هي:
بوفيدون (K30)، سليلوز الدقيقي، هيدروميلوز.
ما هو كليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما هو محتوى العلبة
يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف، في علب تحتوي على 30 و 60 قرص.
على ماذا يحتوي كليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟
المادة الفعالة هي كلوريدات الميتفورمين.
يحتوي كل قرص مغلف على 1000 مغ من كلوريدات الميتفورمين، مما يقابل 780 مغ من الميتفورمين قاعدة.
السواغات هي:
بوفيدون (K30)، سليلوز الدقيقي، هيدروميلوز، 400 ميكاغرام/8000 ميكاغرام.
ما هو كليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف وما هو محتوى العلبة؟
يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف، في علبة تحتوي على 30 قرص.
شروط الوصف والتسليم: بدون (القائمة I)
تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

صنع من طرف

COOPER
PHARMA

11، زنقة محمد بيري 20110 الدار البيضاء
مترجم من جيرار سانتيه - فرنسا

كليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف
كليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف
كليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

ميتفورمين هيدروكلوريد

يجب قراءة هذه النشرة بتمكن قبل تناول هذا الدواء
احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها من جديد.
إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء قد شخصيا. لا تعطه أبدا لأحد سواك حتى ولو كانت لديه الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
إذا تفاقم أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره هو المنشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

1 - ما هو كليكوفاج ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مغلف؟
3 - ما هي طريقة تناول كليكوفاج ، قرص مغلف؟
4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
5 - ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مغلف؟
6 - محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1 - ما هو كليكوفاج ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلي العلاجي ABRAR: code ATC

دواعي الاستعمال

يحتوي كليكوفاج على ميتفورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري، ينتمي إلى فئة الأدوية البيغوانيدات.

الإنسولين هرمون يفرزه البنكرياس يسمح للجسم باستعمال كمية الغلوكوز (السكر) الموجود في الدم، يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضا بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو يستعمل غير قادرة على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح، يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوفاج على تخفيض معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغا وتعاني من وزن زائد، يمنح كذلك تناول كليكوفاج على المدى الطويل فائدة على الحد من أخطار المضاعفات الناجمة السكري، يشرك كليكوفاج بالاستمرار في الوزن أو بفقدان قطر من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟

يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 المسمى كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين" عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستطيع المرضى البالغين تناول كليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري لأدوية قابلة للتكم أو الإنسولين.

يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال

لا تتناول أبدا كليكوفاج في الحالات التالية

- إذا كنت تعاني من الأرجية المناسبة (الفرطة) تجاه الميتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متكافئ، يصاحبه مثلا فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورة صارمة، قيئ، تقيؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حماض لبني (انظر "حماض لبني" أسفله) أو حماض كيتوني. الحماض الكيتوني إصابة تتكون في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبات سكري أولي. الأعراض هي تشمل ألم في الأمعاء، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة.
- إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (إنتفاضة)، مثلا على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي، قد يؤدي الإنتفاض إلى مشاكل كلوية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات و إحتياطات").
- إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثلا التهاب الرئتين أو القصبات، أو إلتهاب الكليتين. قد تؤدي الإصابات الحادة إلى مشاكل في الكليتين من شأنها تعريضك لخطر الحماض اللبني (انظر "التهاب من كليكوفاج").
- إذا كنت تتناول حاليا حمض اللاكتيك الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات و إحتياطات").

كليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف
كليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف
كليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

ميتفورمين هيدروكلوريد

يجب قراءة هذه النشرة بتمكن قبل تناول هذا الدواء
احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها من جديد.
إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء قد شخصيا. لا تعطه أبدا لأحد سواك حتى ولو كانت لديه الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر.
إذا تفاقم أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره هو المنشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه النشرة

1 - ما هو كليكوفاج ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مغلف؟
3 - ما هي طريقة تناول كليكوفاج ، قرص مغلف؟
4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
5 - ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مغلف؟
6 - محتوى العلبة ومعلومات إضافية

1 - ما هو كليكوفاج ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟

الصنف الصيدلي العلاجي ABRAR: code ATC

دواعي الاستعمال

يحتوي كليكوفاج على ميتفورمين، إنه دواء مستعمل لعلاج السكري، ينتمي إلى فئة الأدوية البيغوانيدات.

الإنسولين هرمون يفرزه البنكرياس يسمح للجسم باستعمال كمية الغلوكوز (السكر) الموجود في الدم، يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقا. عندما تكون مريضا بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو يستعمل غير قادرة على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح، يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوفاج على تخفيض معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.

إذا كنت بالغا وتعاني من وزن زائد، يمنح كذلك تناول كليكوفاج على المدى الطويل فائدة على الحد من أخطار المضاعفات الناجمة السكري، يشرك كليكوفاج بالاستمرار في الوزن أو بفقدان قطر من الوزن.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟

يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 المسمى كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين" عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يستطيع المرضى البالغين تناول كليكوفاج وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري لأدوية قابلة للتكم أو الإنسولين.

يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوفاج وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مغلف؟

موانع الاستعمال

لا تتناول أبدا كليكوفاج في الحالات التالية

- إذا كنت تعاني من الأرجية المناسبة (الفرطة) تجاه الميتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى.
- إذا كنت تعاني من سكري غير متكافئ، يصاحبه مثلا فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمعدل السكر في الدم) بصورة صارمة، قيئ، تقيؤ، إسهال، فقدان سريع للوزن، حماض لبني (انظر "حماض لبني" أسفله) أو حماض كيتوني. الحماض الكيتوني إصابة تتكون في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبات سكري أولي. الأعراض هي تشمل ألم في الأمعاء، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهية غير معتادة.
- إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (إنتفاضة)، مثلا على إثر إسهال مستمر أو حاد، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي، قد يؤدي الإنتفاض إلى مشاكل كلوية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات و إحتياطات").
- إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثلا التهاب الرئتين أو القصبات، أو إلتهاب الكليتين. قد تؤدي الإصابات الحادة إلى مشاكل في الكليتين من شأنها تعريضك لخطر الحماض اللبني (انظر "التهاب من كليكوفاج").
- إذا كنت تتناول حاليا حمض اللاكتيك الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس، ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين مما يعرضك لخطر الحماض اللبني (انظر "تحذيرات و إحتياطات").

LOT 201451
EXP 11/2025
PPV 45.20DH

- إذا كنت تستعمل حاليا أو إذا كنت تنوي استعمال أدوية تحتوي على اليود، مثلا لتصوير بالأشعة أو بالسكانر، عليك إيقاف تناول كليكوفاج قبل بدء الفحص ، سيوقف بقرار طبيبك متى يجب استئناف تناول كليكوفاج.
- إذا كنت تستعمل حاليا أو إذا كنت تنوي استعمال أدوية تحتوي على اليود، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول مؤخرا أو من الممكن أن تتناول أي دواء جديد. قد تحتاج أي إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل مكثف أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم بصفة خاصة الإعلام عن الأدوية التالية

- الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
- الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل إعطاءات الالتهاب غير الستيروئيدية أو مثبطات كوكاز (ايبوبروفين و سيليكوكسيب).
- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأنجيوتنسين II).
- شبان المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تيربوتالين التي تستخدم لعلاج الربو).
- كورتيكوستيروب المستعملة لعلاج مختلف الاعتلالات خاصة التهابات الحدقة الجلد أو الربو.
- الأدوية التي قد تؤثر على كمية الغلوكوز في الدم، وخاصة إذا كانت وظائف الكلى مختلطة (مثل فيراباميل، رفامبيسين، سيمتيدين، دولوتيغرافير، رانولازين، تريمتوبريم، فانكومايسين، إيزوكويناز، كريزيتيب و لوتيابريد)
- أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غلوكوفاج مع الكحول:

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض اللبني (أنظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

إذا كان في من هذه الحالات تحقق طبيب الحمل بحيث تحصول على مزيد من المعلومات توقف عن تناول كليكوفاج لفترة قصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المستحسن أن يكون مرتبطا بمستقبلك القدان مهم لسوائل الجسم مثل القيء، التعب، الإسهال، والحمى، والتعرض لمرارة أو لشرب سوائل أقل من العادة. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات.
توقف عن تناول كليكوفاج وعلى الفور اتصل بالطبيب أو بقرب مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض اللبني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

ويتضمن أعراض الحماض اللبني:

- القيء
- اضطراب في المعدة (ألم في البطن)
- تشنجات العضلات
- الشعور العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب

الحماض اللبني حالة طارئة طبية يجب معالجتها في المستشفى
إذا اضطررت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوفاج في وقت و بعد العملية بأسبوع فقط بقرار طبيبك متى توقف، ويستئنف علاجك باستخدام غلوكوفاج.

كليكوفاج وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم لكن إذا تناولت كليكوفاج في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل السلفاميدات المخفضة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، الغليتينيدات)، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أصبحت بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالدوخة، الدوخة، زيادة تعب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الإحساس بالضيق.

أثناء فترة العلاج بكليكوفاج، سيقوم طبيبك بفحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل سنويا أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسنا و / أو ضعيفا، وبخلاف الأكلي.

الأطفال لا يدخل.

معلومات عن سواغات لها تأثير مفعوله. لا يدخل.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

إذا كنت مقبلا على دهن وهائي من مادة صباغية تحتوي على اليود ، مثلا لتصوير بالأشعة أو بالسكانر، عليك إيقاف تناول كليكوفاج قبل بدء الفحص ، سيوقف بقرار طبيبك متى يجب استئناف تناول كليكوفاج.

عليك إعلام الطبيب إذا كنت تتناول مؤخرا أو من الممكن أن تتناول أي دواء جديد. قد تحتاج أي إجراء اختبارات جلوكوز الدم بشكل مكثف أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.

من المهم بصفة خاصة الإعلام عن الأدوية التالية

- الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
- الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل إعطاءات الالتهاب غير الستيروئيدية أو مثبطات كوكاز (ايبوبروفين و سيليكوكسيب).
- بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأنجيوتنسين II).
- شبان المستقبلات بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تيربوتالين التي تستخدم لعلاج الربو).
- كورتيكوستيروب المستعملة لعلاج مختلف الاعتلالات خاصة التهابات الحدقة الجلد أو الربو.
- الأدوية التي قد تؤثر على كمية الغلوكوز في الدم، وخاصة إذا كانت وظائف الكلى مختلطة (مثل فيراباميل، رفامبيسين، سيمتيدين، دولوتيغرافير، رانولازين، تريمتوبريم، فانكومايسين، إيزوكويناز، كريزيتيب و لوتيابريد)
- أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غلوكوفاج مع الكحول:

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع الأخذ غلوكوفاج لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض اللبني (أنظر التحذيرات وقسم الاحتياطات).

الحمل والإرضاع

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا: تسجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 ، اضطرابات هضمية، مثل الغثيان، التقيؤ، الإسهال، أوجاع في البطن، فقدان الشهية. هذه التأثيرات غير المرغوبة في أغلب الأحيان في بداية العلاج بكليكوفاج. قد ، تزيح الجرعات خلال أشهر وتناول كليكوفاج أثناء وجبات الطعام أو حالا بعد استمرت الأعراض، **عليك التوقف عن تناول كليكوفاج واستشارة الطبيب.**

تأثيرات غير مرغوبة متواترة: تسجلت لدى أقل من شخص من أصل 10 أشخاص

- اضطراب أغذية.

تأثيرات غير مرغوبة نادرة جدا: تسجلت لدى أقل من شخص من أصل 10000 شخص

- حماض لبني: هذه المضاعفة نادرة جدا. لكنها خطيرة، خاصة إذا كانت كليتاك لا تعمل بصورة جيدة.

أعراض الحماض اللبني غير محددة (انظر القسم "التحذيرات والاحتياطات")

- تغير في المعرضات البيولوجية في ما يخص الكبد أو الكبد: الالتهاب الكبد الذي قد يسبب القيء، فقدان الشهية، فقدان بعض الوزن، مع أو دون اصفرار الجلد أو بياض العينين. إذا وجدت نفسك في هذه الحالة، **عليك التوقف عن تناول كليكوفاج واستشارة الطبيب.**

ربود فعل جلدية، مثل احمرار الجلد (حمامي) أو طفح جلدي مع حكة (شرى).

انخفاض معدل الفيتامين B12 في الدم.

الأطفال والمراهقون

وقد أظهرت بيانات محدودة لدى الأطفال والمراهقين أن الآثار غير المرغوبة كانت مماثلة في طبيعتها وشدتها لتلك التي سجلت لدى الكبار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا حصلت على أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي. ينطبق هذا أيضا على أي مباشرة غير المنشور الوطني للتبليغ من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية. يمكنك المساهمة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5 - ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مغلف؟

يحفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال والمراهم.

لا يجوز استعمال كليكوفاج بعد التاريخ الأقصى المستعمل المذكور على العلبة أو على الصفيحة المشكلة مرارية بعد كلمة « EXP » يشير هذا التاريخ إلى آخر يوم من الشهر.

ليس هناك احتياطات خاصة بالحفظ.

6 - محتوى العلبة و معلومات إضافية

لا يجب أبدا طرح الأدوية في مجاري المياه أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التصرف في الدواء غير المستعمل. هذه إجراءات لحماية البيئة.

على ماذا يحتوي كليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف؟

المادة الفعالة في كلوريدرات الميتفورمين

يحتوي كل قرص مغلف على 500 مغ من كلوريدرات الميتفورمين، مما يقابل 390مغ من الميتفورمين قاعدة.

السواغات هي:

بوفيدون K30، ستيارات المغنزيوم، هيبروميلوز.

ما هو كليكوفاج 500 مغ، قرص مغلف وما هو محتوى العلبة؟

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف ، يصرف في علبة تحتوي على 30 قرص.

على ماذا يحتوي كليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف؟

المادة الفعالة في كلوريدرات الميتفورمين

يحتوي كل قرص مغلف على 850 مغ من كلوريدرات الميتفورمين، مما يقابل 652.80 مغ من الميتفورمين قاعدة.

السواغات هي:

بوفيدون K30، ستيارات المغنزيوم، هيبروميلوز.

ما هو كليكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما هو محتوى العلبة؟

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف ، في علبة تحتوي على 30 و60 قرص.

على ماذا يحتوي كليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

المادة الفعالة في كلوريدرات الميتفورمين

يحتوي كل قرص مغلف على 1000 مغ من كلوريدرات الميتفورمين، مما يقابل 780 مغ من الميتفورمين قاعدة.

السواغات هي:

بوفيدون K30، ستيارات المغنزيوم، هيبروميلوز.

ما هو كليكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف وما هو محتوى العلبة؟

يصرف هذا الدواء بشكل قرص مغلف ، في علبة تحتوي على 30 قرص.

شروط الوصف والتسليم: جدول I (القائمة I)

تاريخ مراجعة هذه النشرة: 01/2017

صنع من طرف

COOPER PHARMA

41، رقمة محمد ديوري 20110 الدار البيضاء، بتخريص من مبرك سانتيه - فرنسا

كلوبيدوغراج 300 مغ، قرص مغلف

كلوبكوفاج 850 مغ، قرص مغلف

كلوبكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف

للوريدرات المتقوين

يجب قراءة هذه النشرة بتمكنها بالتمام قبل تناول هذا الدواء.
احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها من جديد.
إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، إذا كان أمرا، شك، اطلب المزيد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لك وحدك، لا تعطه للآخرين حتى ولو كانت لديهم نفس الأعراض التي لديك، فقد يضرهم.
إذا تعانقم أحد الآثار الجانبية، بما فيها تلك التي لم ترد في هذه النشرة، عليك إعلام طبيبك أو الصيدلي.

ما هو الدواء؟

ما هي الحالات التي ...

لا تتناول أبدا كلبوكوفاج في الحالات التالية

موانع الاستعمال

تناول أو استعمال أدوية أخرى

الحمل والإرضاع

الجرعة المعتادة

الجرعة المفرطة

ما هو كلوبكوفاج 850 مغ، قرص مغلف وما هو محتوى العلبة؟

ما هو كلوبكوفاج 1000 مغ، قرص مغلف؟

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص)

تأثيرات غير مرغوبة نادرة جدا (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10.000 شخص)

تأثيرات غير مرغوبة متواترة جدا (سجلت لدى أكثر من شخص من أصل 10 أشخاص)

تأثيرات غير مرغوبة نادرة جدا (سجلت لدى أقل من شخص من أصل 10.000 شخص)

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

فئة الحمل

الإرضاع

الأطفال والمراهقون

الأدوية التي يجب تجنب استعمالها

الأدوية التي يجب أخذ الحيطة عند استعمالها

الأدوية التي يجب أخذ الحيطة عند استعمالها

**الأدوية التي يجب أخذ الحيطة عند