



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

Nº M20- 0007987

73719

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1895 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : BENAKHLIF HOUARIA

Date de naissance : 1948

Adresse : 49 Rue ASSANA N BAR Rer Sultan cosa

Tél. : 06 65 12 03 17 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 04 Juin 2021

Nom et prénom du malade : BENAKHLIF HOUARIA Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Icm /

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14 Juin 2022	V - CS		300 DH	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
LAOUI FIDEL Mostafa Pharmacie de l'ouraine SARL 62, Bd. Radial D'Essekini - Casablanca tel.: 0522 20 56 40 / 0522 22 21 56 ICE : 002536701000094	04/06/22	343,20

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

Dr. Hafid OUKHLIFT

EX. MEDECIN CHEF DES F.A.R

MEMBRE AFFILIÉ À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
ET EUROPÉENNE DE CARDIOLOGIE

MEMBRE AFFILIÉ À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

CERTIFICAT DE LA FEDERATION

INTERNATIONAL DU DIABÈTE ET DE U.E.M.S.

ECHOGRAFIE

ECG

الدكتور حفيظ أوكيلفت

طبيب رئيسي سلبا بالقوات المسلحة الملكية

عضو منتب للجمعية الفرنسية

والأوروبية لأمراض القلب

عضو منتب للجمعية الفرنسية لضغط الشريان

شهادة من الجامعة الدولية لداء السكري والإذناد

الأوروبي للأطباء الأخصائيين

الجاف بالصدى (اكوغرافي)

تخطيط القلب

Casablanca, le 04/06/2021

J'sea au elevat 100 n & 100

49,70

- Volt J = 0 50 mg

37,00

- Dnolbed 1 n x 21. pris 2 p 100 / 2 mg

41,80

1 n x 87. pris 2 p

- Adocandyl 400 mg

- Progred 1/4 p. m.s

- Progred 1/4 p. m.s

ALAOUI FEDUL Most
Pharmacie de la Gendarmerie
22 Bd d'Alsace Casablanca
Tel.: 0522 25 37 40 - 0522 22 27 56
ICB: 0522 25 37 40 - 0522 22 27 56
J1000094

~~UR 126~~ - AD 11/2 SV 0; 8 mg 35,70

1/2 g l g 8:28 209,00

1- E 2, 1 (

~~SV~~

~~CABINET MEDICAL
Dr. OUKHLI HAFID
Dr. d'Etat en médecine Gén
Dr. de la famille et de l'assurance
n° 05 22 00 22 22~~

~~A. OUKHLI MOSTAFA
Pharmacie de l'Ornain SARL
52, Bd. Ralli, La Marsa, Casablanca
Tél.: 0525 26 35 40 / 0525 22 27 56
CE : 002536701000094~~

~~373,20~~



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
Denomination du médicament :

VOLTFAST® 50 mg

Poudre pour solution orale. Boîtes de 9 sachets.
Diclofénac potassique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1 Qu'est-ce que Voltfast® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Voltfast® ?
- 3 Comment utiliser Voltfast® ?
- 4 Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 Comment conserver Voltfast® ?
- 6 Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE VOLTFAST® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Voltfast contient le sel potassique du diclofénac, un composé non stéroïdien qui se caractérise par ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires.

La prise de Voltfast soulage les symptômes d'une inflammation tels que douleur et gonflement, en bloquant la synthèse des molécules (prostaglandines) responsables de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre. Ce médicament ne peut cependant pas en soigner les causes.

L'effet du médicament se manifeste dans l'espace d'env. 30 minutes.

Voltfast est utilisé sur prescription médicale dans le traitement à court terme (maximum 3 jours) des affections aiguës suivantes, dans les cas où un effet rapide est recherché, comme par ex. inflammations douloureuses après une blessure (par ex. entorse, élongation), inflammations et douleurs après une intervention chirurgicale orthopédique ou dentaire, douleurs et inflammations en gynécologie, crises de migraine avec ou sans aura, syndromes douloureux du dos et des cervicales, rhumatisme extra-articulaire, ainsi que traitement complémentaire lors de diverses infections aiguës douloureuses, en particulier au niveau des oreilles, du nez et de la gorge.

6 118001 031016
VOLTFAST® 50 mg

Poudre pour
solution orale

PPV : 49.70 Dhs

pas employer Voltfast uniquement pour faire baisser la fièvre. Offrez-d'une maladie cardiaque ou avec des risques importants de maladie a, votre médecin réévaluerà à intervalles réguliers la poursuite du traitement ast, en particulier si votre traitement dure plus de 4 semaines.

.LES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER FAST®?

...ez pas Voltfast :

si vous êtes allergique à l'un des composants ou si vous avez présenté des difficultés respiratoires ou des réactions de la peau de type allergique , par exemple un gonflement du visage, des lèvres, de la langue, du cou et/ou des extrémités (signes d'un angioédème), après la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres antalgiques ou antirhumatismaux, dits anti-inflammatoires non stéroïdiens, durant le 3e trimestre de la grossesse, en cas d'ulcères actifs de l'estomac et/ou de l'intestin grêle (ulcères duodénaux), de saignements ou de perforation gastro-intestinaux ou en cas de symptômes tels que du sang dans les selles ou des selles noires, en cas de maladies intestinales inflammatoires chroniques (maladie de Crohn, colite ulcéreuse), en cas de défaillance hépatique ou rénale sévère, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, pour le traitement des douleurs après un portage coronarien au niveau du cœur (ou de l'utilisation d'une circulation extracorporelle), chez les enfants de moins de 14 ans.

Si l'une de ces situations s'applique à votre cas, veuillez le signaler à votre médecin et ne prenez pas Voltfast. Votre médecin décidera si ce médicament vous convient. Si vous pensez être éventuellement allergique à ce produit, consultez votre médecin.

Durant le traitement par Voltfast, il est possible que des ulcères au niveau de la muqueuse du tractus gastro-intestinal supérieur, rarement des hémorragies ou, dans des cas isolés, des perforations (gastriques ou intestinales) apparaissent. Ces complications peuvent survenir n'importe quand durant le traitement, sans aucun signe d'alarme. Afin de réduire ce risque au maximum, votre médecin vous prescrira la dose minimale efficace pour la durée de traitement la plus courte possible. Adressez-vous à votre médecin si vous avez des douleurs gastriques que vous supposez être en relation avec la prise du médicament.

Il convient de faire preuve de prudence si vous souffrez d'une maladie du cœur ou des vaisseaux sanguins (maladies dites cardiovasculaires, notamment tension artérielle élevée non contrôlée, insuffisance cardiaque, maladie cardiaque ischémique ou maladie artérielle périphérique), car le traitement par Voltfast n'est généralement pas recommandé.

Si vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire (voir ci-dessus) ou présentez des facteurs de risque importants comme une tension artérielle élevée, des taux de graisses sanguines anormalement élevés (cholestérol, triglycérides), un diabète ou si vous fumez et que votre médecin décide de vous prescrire Voltfast, vous ne devez pas dépasser une dose de 100 mg par jour si votre traitement dure plus de 4 semaines.

En général, il est important d'utiliser la dose minimale efficace de Voltfast permettant de soulager vos douleurs et/ou d'atténuer le gonflement, et le moins longtemps possible, pour réduire autant que possible vos risques d'effets secondaires cardiovasculaires.

Pour certains médicaments contre la douleur, les inhibiteurs COX-2, on a constaté, sous traitement à doses élevées et/ou à longue durée, une augmentation du risque d'infarctus

PPV : 209DH00
PER : 05/22
LOT : J2636-2

PER : 12/2023
LOT : 21E001

AVLOCARDYL 40MG
CP SEC B50
P.P.V : 41DH80
6 118000 010227
www.your-pharmacy.com

vous avez une maladie de la peau (psoriasis), • Si vous avez une basse tension (taux élevé dans le sang (diabète)), • Si vous avez une maladie du rein, • Si vous avez une maladie de la circulation sanguine (telle que la maladie de Raynaud), • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, • Si vous avez des antécédents cardiaques.

Vous devez prévenir votre médecin : • Si vous avez une maladie de la peau (psoriasis), • Si vous avez une maladie du rein, • Si vous avez une maladie de la circulation sanguine (telle que la maladie de Raynaud), • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, • Si vous avez des antécédents cardiaques.

Vous ne devez jamais arrêter brutalement votre traitement sans avoir demandé, au préalable, l'avis de votre médecin.

• Si vous devez subir une opération, vous devez prévenir votre anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Patients devant faire attention au risque d'hypoglycémie

Une hypoglycémie est un taux trop bas de sucre dans le sang. Ce médicament peut aggraver une hypoglycémie en particulier, chez les personnes souffrant de diabète et les personnes non diabétiques mais qui sont prédisposées à l'hypoglycémie (le nourrisson, l'enfant, la personne âgée, les personnes souffrant d'une maladie du foie, les personnes sous dialyse, les personnes qui ont fait un jeûne ou les personnes qui ont pris trop de comprimés).

Cette hypoglycémie peut conduire à des convulsions ou un coma. Vous reconnaîtrez les signes annonciateurs d'une hypoglycémie par une faiblesse, des sueurs, une fringale, des tremblements, une somnolence, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré. Si l'un de ces signes survient, mangez ou buvez quelque chose de sucré et contactez votre médecin.

La substance active de ce médicament (le propranolol) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle antidopage.

Autres médicaments et AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

Sauf avis contraire de votre médecin, n'utilisez pas AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable avec certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium : bêpridil, diltiazem, vérapamil et fionolomid). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, si certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence,

210368 1
02.2024
35.70
35,70



strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Mode d'administration

Ce médicament est utilisé par voie orale. Les comprimés doivent être avalés avec une boisson (par exemple de l'eau).

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son autorisation.

Si vous avez pris plus de AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre comprimé et poursuivre votre traitement normalement. Ne jamais prendre une double dose pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : • une fatigue, • des refroidissements des extrémités, • un ralentissement du rythme cardiaque, • des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud), • des insomnies, des cauchemars.

Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : • des troubles gastro-intestinaux (douleurs de l'estomac, nausées, vomissements, diarrhées).

Effets indésirables rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) : • des sensations vertigineuses, • une diminution du nombre de plaquette dans le sang, • une maladie du cœur (insuffisance cardiaque), • des anomalies du rythme cardiaque (troubles de la conduction cardiaque), • une chute de la tension artérielle, • une difficulté à marcher pouvant être aggravée chez une personne qui boitait déjà, • des hallucinations, des troubles psychiatriques (psychoses, modifications de l'humeur, confusion), une impuissance, • divers effets sur la peau et les cheveux, notamment, des taches rouges (purpura), une chute de cheveux (alopecie), des boutons rouges (psoriasis, ou aggravations d'un psoriasis), • une

4000290-01

DULASTAN® 500mg/2mg Boîte de 20 comprimés

دوالستان ملبة من 20 قرصاً

une sécheresse au action des bronches

ffecter jusqu'à 1 de sucre dans le ne « Patients devant ppartition de certains d'une prise de sang, • musculaire causée par une

37,00

Effets indésirables de fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : • des crises convulsives liées à un taux anormalement bas de sucre (hypoglycémie) chez les enfants et adolescents.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

5. COMMENT CONSERVER AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température inférieure à 30°C.



Tenir à l'abri de la lumière.



Tenir à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

• La substance active est (sont) : Chlorhydrate de propranolol 40 mg
• Les autres composant(s) excipient(s) est (sont) : Le D-mannitol, la gélatine, l'acide alginique, l'acide stéarique et le stéarate de magnésium.

Qu'est-ce que AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable. Chaque boîte contient 50 comprimés.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

06/07/2018

mm/s HF·DF·MF2 HR:97

10mm/mV

25mm/s HF·DF·MF2 HR:10

V3



