

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en soins.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Alai Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Alai Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LQ) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 052526

☐ Maladie ☒ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1748 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : ADIOUBAN OTHMAN
Date de naissance : 19-12-47
Adresse : 78, RUE HAJOMAR RFI 2^{ème} étage
CASABLANCA
Tél : 0661952611 Total des frais engagés : 2011,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Maroua HAYOUK

Cachet du médecin :

CABINET D'ENDOCRINOLOGIE
DIABETOLOGIE NUTRITION
Av. Hassan II, 1^{er} étage
Casablanca 20000
Tél : 05 22 22 78 18

Date de consultation : 04/05/2021
Nom et prénom du malade : D.T. Adiouban Othman 73
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : D.T.

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA le 06/06/21
Signature de l'adhérent(e) : O. ADIOUBAN



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin etant aut le Paiement des Actes
09.05.22			6	
19.05.22			6	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie El Aladi Dr. Hassan Hamez Cheikh El Aladi EL ALADI N° 0538 97 48 44 Tél: 0538 97 48 44	19.5.21	811,40 DH

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	04/05/21	B.1950	12500th

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.				
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de				
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 00000000 25533411 B 11433553			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECU

DR. MAROUA HAYOUK

Spécialiste

Diabète, obésité et nutrition
endocrinologie, goitre
Cholestérol, goutte
Retard pubertaire/ croissance
Stérilité endocrinienne
Troubles hormonaux



الدكتورة حيوك مروة

اختصاصية

أمراض السكري و التغذية
الغدد و القدة الدرقية
السمنة، الكوليسترول و الغرس
تأخر النمو و البلوغ
اضطراب الهرمونات و العقم الهرموني

Tétouan Le: 19.05.22

Ordonnance

Adriamban Otan

$51,60 \times 6 = 309,60$

1) Tardy B9 1p 2ft

$60,40 \times 6 = 362,40$

2) Arel 2g 1-0-1

$13,40 \times 3 = 40,20$

3) Lenthya 500g 1p. 6-1

$49,60 \times 2 = 99,20$

4) D-ve ft 100000
1p 15 Jrs

T: 811,40

L-t 03



INPE
162035411

Av. Hassan II, Imm Chellal 1, 1^{er} étage Appt 8 - Tétouan

شارع الحسن الثاني إقامة الشلال 1 قرب محطة CTM الطابق الأول - تطوان

① 06 77 02 17 84

② 05 39 71 42 29

cabinetdrhayouk@gmail.com



Dr. CHAOUI Tarik | Médecin Biologiste

Date du prélèvement : 04-05-2021

Heure : 18:10

Né(e) le : 19-12-1947 (73 ans)



Mr ADIOUBAN Otman

Dossier N° : 2105040114

Date de l'ordonnance : 04-05-2021

Prescripteur : Dr HAYOUK MAROUA

TETOUAN le 04-05-2021

FACTURE N° : 2105040114

Récapitulatif des analyses		
Analyse	Clé	Coefficient
Prélèvement sanguin	B	20
Prélèvement sur écouvillon ou mycologique	B	25
Créatinine	B	30
Ferritine	B	250
Glycémie	B	30
Hémoglobine glycosylée	B	100
Numération formule	B	80
TSH	B	250
Urée	B	30
VS	B	30
Anticorps Anti Thyro-Per-Oxydase	B	250
Peptide C	B	350
Créatinine Urinaire	B	60
Microalbuminurie	B	100
Vitamine D2 + D3	B	390

TOTAL DES B 1950 B

TOTAL DOSSIER 1250 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : **mille deux cent cinquante dirhams**

JC. AZOULAY	A. EBEL	A. LIOUVER	D. PERAZZA	L. STROMPF
Y. BOUAMRA	D. ENGERAND	A. MARCILLY	A. PETIT	S. TAPIA
C. BOURDIN	ME. FORAY	N. MEKNACHE	L. PETIT	JM. VANDERNOTTE
C. BOUZ	A. FORCE	ME. NAUD	B. GUILLOMIN	
E. CART-YANNEUR	L. GUIS	X. NAUDOT	L. RAYMOND	
C. COGNARD	H. HAJJI	M. NOUCHY	O. ROUADES	
N. COUPRIE	V. JACOMO	A. OVZE	C. SAULI	
H. DESSUANT	V. LE	G. PANTEIX	B. SCHUBERT	
L. DRUART	L. LEFLEM	L. PELLEGRINA	D. SCIORINO	

AUTORIZATIONS : Activités de diagnostic prénatal ; analyses de cytogénétique ; comptes moléculaires ; analyses de génétique moléculaire ; analyses en vue du diagnostic des maladies héréditaires ; comptes de biologie médicale ; analyses de biochimie ; comptes les analyses portant sur les marqueurs viraux majeurs ; Examen des virus oncogènes génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques ; Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ; Autorisation de détention et/ou d'utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins de médecine nucléaire.

Dossier : 20672 45225-12.05.21

Enregistré le 12 Mai 2021, à 10h49

Edité le 12 Mai 2021, à 15h12

Transmis par : LABORATOIRE DU NORD TETOUAN

Références : 2105040114 2105040114

MA586 - C - 2067245225

LABORATOIRE DU NORD TETOUAN
RDC, AVE DES FAR, RESIDENCE HANIA 1
93000 TETOUAN

Exemplaire destiné au correspondant

Résultat d'analyse : **Monsieur ADIOUBAN, OTMAN**

Né le 19 Décembre 1947, âgé de 73 ans

Prélèvement du 06 Mai 2021 à 09h00

cofrac



ACCREDITATION
N° 9-1188
Liste des sites accrédités
et portés disponibles sur :
www.cofrac.fr

Seuls les résultats identifiés par le symbole # sont couverts par l'accréditation.

Informations complémentaires

DR HAYOUK MAROUA

HORMONOLOGIE Hormonologie Sanguine

Peptide C (ECLIA-COBAS® Roche)(§)

- 2,90 ng/mL
- 0,97 pmol/mL

Valeurs de référence à jeun du Peptide C sérique ou plasmatique (5e et 95e percentiles)

ng/mL 1,1 - 4,4
pmol/mL 0,37 - 1,47

Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement post-prandial, le résultat est à interpréter en fonction de la glycémie.


Interlocuteur : Jean-Marc Vandernotte - Réalisé par Biomnis (VRY) - Validé par : Dr Jean-Marc VANDERNOTTE

(§) Une attention particulière doit être portée aux résultats de patients traités par la Biotine (ou vitamine B7, B8 ou H) qui peuvent être faussés, compte tenu du principe de la technique d'immunodosage utilisant la liaison biotine/streptavidine.

En cas de prise d'un complément alimentaire contenant de la biotine, il est recommandé d'effectuer le prélèvement de l'échantillon au moins 8 heures après la dernière administration.

A noter qu'en cas de traitement par de fortes doses de biotine (exemple traitement par QIZENDAY), un contrôle après une fenêtre thérapeutique d'une semaine est impératif.

Dossier complet


François CORNU

La présentation de nos résultats a changé : désormais, chaque analyse est suivie de la mention « validé par », qui vous signale l'approbation du biologiste concerné.



Dr. CHAOUI Tarik | Médecin Biologiste

Date du prélèvement : 04-05-2021

Patient(e): Mr Otman ADIOUBAN 2105040114

VITAMINES

25-OH-VITAMINE D (D2 et D3)

(Technique Immunoenzymatique chimiluminiscente)

17.0 ng/mL
42.5 nmol/L

(30.0-100.0)
(75.0-250.0)

Valeurs de référence (ng/ ml)

Déficit profond	<5
Déficit modéré	5 - 10
Niveau insuffisant	10 - 30
Niveau suffisant	30 - 60
Toxicité	>100

HORMONOLOGIE

TSH US :

(IE FLUORESCENCE VIDAS-PC)

7.61 μ UI/mL

(0.38-5.33)

10-11-2020

4.22

Valeurs de référence pour femme enceinte (μ U l/ mL)

1 ^{er} Trimestre	0.05 - 3.70
2 ^{ème} Trimestre	0.31 - 4.35
3 ^{ème} Trimestre	0.41 - 5.18

PEPTIDE C :

(Veuillez consulter le compte rendu ci-joint)

2.90 ng/mL

(1.10-4.40)

0.96 pmol/mL

(0.37-1.46)

(RC) : Résultat contrôlé



Dr. CHAOUI Tarik | Médecin Biologiste

Date du prélèvement : 04-05-2021

Patient(e): Mr Otman ADIOUBAN 2105040114

BIOCHIMIE SANGUINE

UREE (Méthode Uréase-GLDH Beckman Coulter)	0.25 g/L 4.16 mmol/L	(0.15-0.43) (2.50-7.43)
CREATININE (RC) (Technique enzymatique- Beckman Coulter- AU 480)	8.2 mg/L 72.6 µmol/L	(6.7-12.0) (59.3-106.2)
CLAIRANCE DE LA CREATININE (CKD-EPI)	101.67 ml/min	

Intervalle de références

- > 60 ml/min : Fonction rénale normale
- 30 à 60 ml/min : Insuffisance rénale modérée
- 15 à 30 ml/min : Insuffisance rénale sévère
- < 15 ml/min : Insuffisance rénale grave

BIOCHIMIE URINAIRE

MICROALBUMINURIE (Méthode Immunoturbidimétrie Beckman Coulter)	12.7 mg/L	(<30.0)
CREATININE URINAIRE : (Technique enzymatique- Beckman Coulter- AU 480)	2.65 g/L 23 mmol/L	(0.90-2.04) (8-18)
Rapport Microalbumine/Créatinine	4.79 mg/g	(<30.00)

Normales du rapport sur échantillon :

- < à 30 mg/g : Taux normal
- 30 à 100 mg/g : Taux douteux à contrôler de préférence sur urines de 24h
- > à 100 mg/g : Taux pathologique à suivre sur urines de 24h

AUTO-IMMUNITE

Ac Anti-THYROPEROXYDASE (Technique Immuno-enzymatique ELFA - VIDAS)	<0.80 UI/mL	(<8.00)
---	-------------	---------



Date du prélèvement : 04-05-2021

Patient(e): Mr Otman ADIOUBAN 2105040114

BIOCHIMIE

GLYCEMIE A JEUN

(Méthode Héokinase-G6PDH Beckman Coulter)

1.67 g/L (0.74-1.10)
9.27 mmol/L (4.11-6.11)

Interprétation

Diminution de la tolérance au glucose : 1.10 à 1.26 g/L
DIABETE : > 1.26 g/L (observé sur 2 prélèvements distincts)

HEMOGLOBINE GLYQUÉE

(Technique HPLC TOSOH)


9.8 % (4.0-6.0)

10-11-2020

9.0

Interprétation des résultats selon la standardisation du NGSP :

HBA1C entre 4.0 et 6.0 % : intervalle non diabétique
HBA1C inférieur à 6.5 % : excellent équilibre glycémique (DNID)
HBA1C inférieur à 7.0 % : excellent équilibre glycémique (DID)
HBA1C entre 7.0 et 8.0 % : bon équilibre glycémique
HBA1C à 8 % : Action corrective suggérée



FERRITINE

(IE FLUORESCENCE VIDAS)

8.09 ng/mL (70.00-435.00)



Dr. CHAQUI Tarik | Médecin Biologiste

Date du prélèvement : 04-05-2021

Patient(e): Mr Otman ADIOUBAN 2105040114

HEMATOLOGIE

VITESSE DE SEDIMENTATION

1ère Heure
2ème Heure

8 mm ✓ (3-7)
23 mm (<20)





Dr. CHAOUITarik | Médecin Biologiste

Date du prélèvement : 04-05-2021

Heure : 18:10

Né(e) le : 19-12-1947 (73 ans)

Tél : 06.24.01.10.31



Mr ADIOUBAN Otman

Passeport N°/CIN : B369975

Dossier N° : 2105040114

Date de l'ordonnance : 04-05-2021

Prescripteur : Dr HAYOUK MAROUA

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

LIGNEE ERYTHROCYTAIRE

Antériorité

Hématies	6.2	M/mm ³	(4.5-5.8)	M/mm ³
Hémoglobine	14.9	g/dL	(13.0-17.5)	g/dL
Hématocrite	47.4	%	(40.0-50.0)	%
VGM	76.5	μ ³	(82.0-98.0)	μ ³
CCMH	31.4	g/dL	(30.0-36.5)	g/dL
TCMH	24.0	pg	(28.0-32.0)	pg
RDW	13.8	%	(12.0-16.0)	%

LIGNEE THROMBOCYTAIRE

Plaquettes	68 000	/mm ³	(150 000-400 000)	/mm ³
------------	--------	------------------	-------------------	------------------

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Leucocytes	7 030	/mm ³	(4 000-10 000)	/mm ³
Neutrophiles	62.7 %	Soit 4 408 /mm ³	(1 800-7 500)	/mm ³
Lymphocytes	26.0 %	Soit 1 828 /mm ³	(1 000-4 000)	/mm ³
Monocytes	8.8 %	Soit 619 /mm ³	(200-1 000)	/mm ³
Eosinophiles	1.6 %	Soit 112 /mm ³	(50-600)	/mm ³
Basophiles	0.9 %	Soit 63 /mm ³	(<200)	/mm ³

Commentaire : Microcytose + Hypochromie associée à une thrombopénie contrôlée sur frottis avec absence d'agrégats et / ou de macroplaquettes.

continued on p. 100

- En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de sodium dans le sang et les urines ainsi que la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées, souvent un traitement concomitant ou des médicaments cardiovasculaires utilisés pour stimuler la fonction cardiaque ou d'autres médicaments utilisés pour stimuler l'activité.

REV: 49,60 0H
LOT: 21A04
EXP: 01/2024

Notice :
 information de l'utilisateur
 D-CURE FORTE 100.000 U.I.
 solution buvable en ampoule, boîtes de 3.
 Cholecalciférol (Vitamine D₃)

Ne vous fiez pas aveuglément à l'intégrité de cette revue avant de prendre ce médicament car elle n'est pas importante pour vous.

- D'après votre notice, votre produit peut contenir de la caféine.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour lui indiquer ce symptôme.
- Si vous souffrez d'un des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre infirmière. Un effet indésirable non mentionné dans votre notice.
- Vous devez aussi définir à votre médecin si vous ne souffrez d'aucun problème ou si vous avez des problèmes liés.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Quel est ce que D-Cure forte et dans quel cas on le utilise ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE D-CINE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- **Indications thérapeutiques** : DCURE FORTE 100 mg/125 mg est utilisé en tant que traitement d'appoint pour le cancer du col utérin.

2. **QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CLINE FORTEL?**

Hydrex 400 D-CL-400 FORTÉ.

- si vous êtes allergique (hypersensibilité) au cholestérol ou si vous prenez des médicaments du D-CURE FORTE (cf. rubrique R4)
- si vous avez moins de 18 ans
- si vous souffrez d'hypocalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) élevée
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans les urines)
- si vous souffrez de pseudo-hypoparathyroïdisme (généralisation du métabolisme de l'organisme parathyroïdien), comme le teston de vitamine D peut être réduit lors de phosénos et s'ensuivent renforcés à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage phosénos. (cf. rubrique R4)
- si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs, si vous consommez du calcium
- si vous avez une insuffisance rénale

Mettez un garde spécial et précautions particulières d'usage

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

- il vous présenter des troubles de réorption urinaire (de calcium et de phosphate).
- il vous fera probablement faire par vos médecins des prises de sang régulières pour surveiller l'équilibre osseux;
- il faut les prendre immédiatement puisqu'il s'agit de développer une hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypophosphatémie (une diminution du taux de calcium dans les urines).
- il vous prescrira de surveillancez chaque fois du risque accru de convulsion de la volemie (il se agit d'une toxique acide). Il aura en cas, à y a les tests suivants de calcium et de phosphore.

Il y a peu de données l'effet sur le métabolisme squelettique et phosphoré chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CAP.¹⁰

Si d'autres médicaments contenant de la chlorure D sont prescrits, le dose de chlorure D contenue dans DUCLORE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de chlorure D ou de sodium ne peut se faire qu'après consultation d'un médecin. Lisez les dosages des médicaments dans le sens de tous les autres produits de contrôle.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de sodium dans le sang et les urines ainsi que la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées, souvent un traitement concomitant ou des médicaments cardiovasculaires utilisés pour stimuler la fonction cardiaque ou d'autres médicaments utilisés pour stimuler l'activité.

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veulli
Ete
Si voi
d'inte
+ Ga
+ Si
vo
+ Si
+ Si
noli
veulli en informer votre médecin ou votre pharmacien.



TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed El-Bachir - Casablanca
Activité DACCOR - Pharmacie Responsable
RPPV - 51.60 DH

dicament.
virement.
ndez plus

e.
adrez

nédecin.
dans cette
ne grave,

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTI-ANÉMIQUES - Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré. Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 4.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions et mises en garde

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 se sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être suçés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple :

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaires (infectieux / l'acide acétylsalicylique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphenytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestéramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite. **DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.**

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). **DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veulli
Ete
Si voi
d'inte
+ Ga
+ Si
vo
+ Si
+ Si
noli
veulli en informer votre médecin ou votre pharmacien.



TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed El-Bachir - Casablanca
Activité DACCOR - Pharmacie Responsable
IPV - 51 60 DH

dicom.
vitem.
ndez plus

e.
adrez

si nédecin.
si dans cette
me grave,

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTI-ANÉMIQUES
Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré. Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 4.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 se sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être suçés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple :

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaires (infectieux / l'acide acétylsalicylique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphénytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestéramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite. **DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.**

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). **DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veulli
Ete
Si voi
d'inf
+ Ga
+ Si
vo
+ Si
+ Si
noli
veulli



6 118001 100620
TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed El-Bachir - Casablanca
Activité DACCOR - Pharmacie Responsable
RPPV - 51.60 DH

dicament.
virement.
ndez plus

e.
adrez

nédecin.
dans cette
ne grave,

veulli en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTI-ANÉMIQUES - Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré. Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 4.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions et mises en garde

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 se sera pas efficace.

En raison du risque d'obstructions buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être suçés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple :

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaires (infectieux / l'acide acétylsalicylique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphenytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestéramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'ail ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veulli
Ete
Si voi
d'inte
+ Ga
+ Si
vo
+ Si
+ Si
noli
veulli



6 118001 100620
TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed El-Bachir - Casablanca
Activité DACCOR - Pharmacie Responsable
IPV - 51 60 DH

dicament.
virement.
ndez plus

e.
adrez

nédecin.
dans cette
ne grave,

veulli en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTI-ANÉMIQUES
Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré. Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 4.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions et mises en garde

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 se sera pas efficace.

En raison du risque d'obstructions buccales et d'alération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être suçés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple :

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaux (infectieux / l'acide acétylsalicylique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphenytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestéramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veulli
Ete
Si voi
d'inte
+ Ga
+ Si
vo
+ Si
+ Si
noli
veulli



6 118001 100620
TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed El-Bachir - Casablanca
Activité DACCOR - Pharmacie Responsable
RPPV - 51.60 DH

dicament.
virement.
ndez plus

e.
adrez

nédecin.
dans cette
ne grave,

veulli en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTI-ANÉMIQUES
Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré. Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 4.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions et mises en garde

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 se sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être suçés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple :

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaires (infectieux / l'acide acétylsalicylique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphenytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestéramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'ail ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite. **DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.**

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). **DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

Tardyferon B9

comprimé pelliculé
Fer/ acide folique

Veulli
Ete
Si voi
d'inte
+ Ga
+ Si
vo
+ Si
+ Si
noli
veulli



6 118001 100620
TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par Cooper Pharma
41, rue Mohamed El-Bachir - Casablanca
Activité DACCOR - Pharmacie Responsable
RPPV - 51.60 DH

dicament.
virement.
ndez plus

e.
adrez

nédecin.
dans cette
ne grave,

veulli en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON B9, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTI-ANÉMIQUES - Code ATC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré. Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AFTN : spina bifida...).

TARDYFERON B9 est indiqué seulement chez la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au fer ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 4.
- Si vous présentez une surcharge en fer (comme une hémochromatose par exemple).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions et mises en garde

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9.

Si vous prenez TARDYFERON B9 pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9 se sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être suçés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau. Si vous ne pouvez

pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez des patients recevant un traitement à base de fer. Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale au niveau gastro-intestinal.

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par Tardyferon B9, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple :

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez un médicament pour traiter les calculs urinaires (infectieux / l'acide acétylsalicylique).
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc et du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez des médicaments permettant d'éliminer ou de réduire la fréquence des crises d'épilepsie comme le phénobarbital, la primidone, la phénytoïne, la fosphenytoïne.
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de légumineuses, de laitage, de thé, de café, de vin rouge, d'ail ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse. L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allaite. DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Posologie

1 comprimé par jour 50 mg de fer élément et 350 µg d'acide folique pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4^{ème} mois). DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تفكك العظام).
يوصى بالمرافقة الدقيقة لتبهن للغدة الدرقية
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج
لتسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية
الحقيقي، قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان
يشارك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية * قليل
الشهية *).

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من
15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص
146 - 1.20



و الصيدلي إذا كنت تأخذ مثلاً
ما في تلك الأدوية التي يتم
بعض الأدوية قد تؤثر على

من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكس (أكثر من 2 ساعة

وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في
هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد
على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5. ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للتقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على
تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العبة بعد
من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °م في
العبوة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العلم أو في النفايات
المزيلة. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية
من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكس (أكثر من 2 ساعة

مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تفكك العظام).
يوصى بالمرافقة الدقيقة لتبهن للغدة الدرقية
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج
للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية
الحقيقي. قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان
يشارك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية * ثقبيل
الشهية *).

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من
15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص
146 - 1.20



و الصيدلي إذا كنت تأخذ مثلاً
ما في تلك الأدوية التي يتم
بعض الأدوية قد تؤثر على

من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكس (أكثر من 2 ساعة

وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في
هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد
على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5. ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للتقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على
تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العبة بعد
من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °م في
العبوة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العلم أو في النفايات
المزيلة. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية
من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكس (أكثر من 2 ساعة

مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تفكك العظام).
يوصى بالمرافقة الدقيقة لتبهن للغدة الدرقية
هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج
لتسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية
الحقيقي، قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصاً إذا كان
يشارك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية * قليل
الشهية *).

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من
15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص
146 - 1.20



و الصيدلي إذا كنت تأخذ مثلاً
ما في تلك الأدوية التي يتم
بعض الأدوية قد تؤثر على

من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكس (أكثر من 2 ساعة

وهذا ينطبق أيضاً على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في
هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد
على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5. ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للتقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على
تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العبة بعد
من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °م في
العبوة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور
لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العلم أو في النفايات
المزيلة. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية
من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليفوثيروكس (أكثر من 2 ساعة

HEMOGLOBIN REPORT *

2021/05/05 13:51

RPORATION V01.24

TB 0001 - 08

2105040114

CAL(NJ)= 1.2700X - 0.1006

NAME	%	TIME	AREA
FP	0.0	0.00	0.00
A1A	0.6	0.24	0.10
A1B	1.0	0.33	17.17
F	0.6	0.45	9.91
LA1C+	3.2	0.54	52.88
SA1C	9.8	0.66	127.41
AD	86.8	1.03	1425.57
TOTAL AREA			1642.13

HbA1c(NGSP) 9.8%

HbA1 11.4 % HbF 0.6 %
0% 15%

