

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.



Déclaration de Maladie

N° M20- 0005398

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1101 Société : 43794
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : Benziane Badia Nassallah
Date de naissance : 17/16/2021
Adresse :
Tél : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Date de consultation : 07/06/2021
Nom et prénom du malade : BEN ZIANE Badia Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Tendinite - Anxiété - Constipation
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : Le :
Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

adhesion@mupras.com

Centre Allal B...

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/06/2021	C	C ₁	150 DH	 Dr. El Kaouchi Fatiha N°1, Imm. A28 Résidence Addamane Ain chock-CASA-Tél: 0522.50.11.90

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Prescripteur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE CHARM CHEIKH SAHL N° 600 LOTS HAMMAZ AVAL AIN CHOCK-CASABLANCA TEL: 05 22 50 65 10 / 07	02/06/2021	330,00 092076793

[illegible][illegible]

Veuillez joindre les pages

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient								
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE										
	<table border="1"><thead><tr><th>H</th><th>G</th></tr></thead><tbody><tr><td>25533412 00000000</td><td>21433552 00000000</td></tr><tr><th>D</th><th>B</th></tr><tr><td>00000000 35533411</td><td>00000000 11433553</td></tr></tbody></table>			H	G	25533412 00000000	21433552 00000000	D	B	00000000 35533411	00000000 11433553
	H	G									
	25533412 00000000	21433552 00000000									
	D	B									
	00000000 35533411	00000000 11433553									
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession										

Coefficient DES TRAVAUX	MONTANTS DES SOINS	DEBUT D'EXECUTION	FIN D'EXECUTION

Coefficient DES TRAVAUX	MONTANTS DES SOINS	DATE DE L'EXECUTION

ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'

Docteur Fatiha EL KAÏCHI
Médecine générale

N° 1, Imm. A 28 Résidence ADDAMANE

Aïn Chock - Casablanca

Tél : 05 22 50 11 90

الدكتورة فتيحة القيشي
الطب العام

رقم 1, عمارة أ 28 إقامة الضمان (الضحى)

عين الشق - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 50 11 90

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Casablanca, le : 07/06/2021

H^{me} = BEN ZIANE Badia

12.80 x 2

1) Odes Long

SV

1 gélule / j après le dîner x 28 j.

57,10

2) Brexin sachet Long

SV

1 sachet / j après le dîner.

53,10

3) Relaxol

SV

1 cp x 3 j, nets au cours de la nuit.

19,10

4) Zetalax DM

SV

1 microlavement x 2 j nets.

34,70

5) Zepam 6 mg

PHARMACIE CHARMEH CHEIKH SARL
N° 600 LOTS HAMRA AV AL QODS
AIN CHOCK - CASABLANCA
TEL: 05 22 50 11 90

1/2 cp / j le soir x 2 mois

330,00

PHARMACIE CHARMEH CHEIKH SARL
N° 600 LOTS HAMRA AV AL QODS
AIN CHOCK - CASABLANCA
TEL: 05 22 50 11 90

الدكتورة فتيحة القيشي
Docteur El Kaïchi Fatiha
N° 1, Imm. A 28 Résidence Addamane
Ain Chock - CASABLANCA - Tél: 05 22 50 11 90



LOT 181762
EXP 08/2021
PPV 52.80DH

بد

زبطة

بإستعمال هذا الدواء، رغم أنها تظل نادرة، وتقاوم هذه المصاعب، يستحسن تجنب:

الكحولية أو الأدوية المحتوية على الكحول.

3. كيف يجب استعمال رولاكسول؟

خاص بالبالغين ما فوق 16 سنة

احرص دائما على تناول هذا الدواء تماما حسب تعليمات الطبيب أو الصيدلي. تحقق لدى الطبيب أو الصيدلي في حالة الشك.

الجرعة اليومية هي 1 إلى 2 أقراص في كل مرة، 3 مرات في اليوم، مع فاصل زمني مدته 4 ساعات على الأقل.

يجب عدم تجاوز 6 أقراص في ظرف 24 ساعة.

تُعد مدة العلاج في 7 أيام متتالية.

يجب دائما احترام فاصل زمني مدته 4 ساعات على الأقل بين الجرعات (باراسيتامول أو أوكسيتوكسين).

في حالة قصور كلوي حاد (تصفية الكرياتينين تقل عن 10 مل/دقيقة)، يجب ترك فاصل زمني مدته 8 ساعات على الأقل، ويجب ألا تتعدى الجرعة الكاملة 6 أقراص (3 غ) في اليوم.

يجب ألا تتعدى الجرعة اليومية القصوى من باراسيتامول (باعتبار كل الأدوية المحتوية على باراسيتامول في صيغتها) 600 مغ/كغ في اليوم (دون تجاوز 3 غ/يوم) في الحالات التالية:

• البالغون الذين يقل وزنهم عن 50 كغ. • إصابة خطيرة في الكبد. • إدمان مزمن على الكحول. • سوء التغذية المزمن. • فقدان الماء من الجسم.

إذا شعرت بأن تأثير هذا الدواء قد وُجد ضعيفا، استشر الطبيب أو الصيدلي. في حالة الشك، استشر الطبيب أو الصيدلي.

لا تتجاوز الجرعة الممنوعة بها أو مدة العلاج.

يجب عدم استعمال هذا الدواء، أو علاج طويل الأمد (انظر الفقرة 2).

طريقة الاستعمال: عن طريق الفم.

استعمل الأقراص بكاملها.

تناول الدواء لدى الأطفال والمراهقين: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16 سنة لأسباب السلامة.

إذا تناولت رولاكسول أكثر مما يجب: إذا تناولت رولاكسول عن طريق الخطأ أو إذا تناولت رولاكسول أكثر مما يجب، أخبر فوراً الطبيب أو الصيدلي.

إذا نسيت تناول رولاكسول: لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها. إذا كانت لديك أسئلة أخرى عن استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

كمثل كافة الأدوية، قد يكون لدواء رولاكسول تأثيرات غير مرغوب فيها، رغم أنها لا تخص جميع الأشخاص.

المرتبطة بباراسيتامول:

• دوار، قد يظهر تفاعل حساسي: يثور وأو احمرار جلدي - شري - انتفاخ مفاجئ في الوجه أو التورم قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس (وذمة خبيثة)، توقف مفاجئ مع انخفاض هام للضغط الشرياني (صدمة تأقية). • إذا ظهرت حساسية، يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب بسرعة. يجب عدم تناول أي دواء تتوفر على

الوجه أو التورم قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس (وذمة خبيثة)، توقف مفاجئ مع انخفاض هام للضغط الشرياني (صدمة تأقية). • إذا ظهرت حساسية، يجب التوقف فوراً عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب بسرعة. يجب عدم تناول أي دواء تتوفر على

يجب التحذير

المحتوية

RELAXOL 500MG/2MG
CP B20
P.P.V. 53DH10
1180001860833
LOT 181762
EXP 08/2021
PPV 52.80DH

تحتوي على

آخر الطبيب: • إذا كان وزنك يقل عن 50 كغ، • إذا كنت تعاني من مرض كبد أو مرض

خطر في الكلى، • إذا كنت تشبه الكحول كثيرا أو توقفت عن استهلاك الكحول مؤخرا، • إذا كنت تعاني من فقدان للماء من الجسم، • إذا كنت تعاني مثلا من سوء التغذية المزمن،

إذا كنت في فترة الصوم، إذا فقدت الكثير من الوزن مؤخرا، إذا كان سنك يفوق 75 سنة أو يفوق 65 سنة وتعاين من أمراض طويلة الأمد، إذا كنت مصابا بقرص أو نقص المناعة البشرية

أو بالتآكل الكبد الفيروسي المزمن، إذا كنت تعاني من التليف الكيسي (مرض جنيني ووراثي ينسب خاصة بإصابات تنفسية خطيرة)، أو إذا كنت مصابا بمرض جيلير (مرض وراثي مقترن

بأقراص بيرويين في الدم).

ينصح بعدم استهلاك المشروبات الكحولية خلال العلاج.

في حالة الانقطاع حديث العهد عن الإدمان المزمن على الكحول، يتردد خطر الإصابة الكبدية، في حالة التهاب الكبد الفيروسي الحاد، توقف عن العلاج واستشر الطبيب.

في حالة مشكلة التغذية (سوء التغذية) أو فقدان الماء من الجسم، يجب تناول رولاكسول، أقراص بكل حذر.

الأطفال والمراهقون: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16 سنة لأسباب السلامة.

في حالة الشك، لا تردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تأول أو استعمال أدوية أخرى: أبلغ أنك تتناول هذا الدواء إذا وصف لك الطبيب تحليل نسبة الحصى البوريك في الدم أو نسبة السكر في الدم.

لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول. قد تتعرض لخطر جرعة مفرطة.

إذا كنت تتيج علاجاً مضاداً لتخثر الدم عن طريق الفم (وارفارين أو مضاد فيتامين K)، فأن تناول باراسيتامول بالجرعات القصوى (4 غ/اليوم) لأكثر من 4 أيام يتطلب مراقبة مشددة

للتحليل البيولوجية ما فيها خاصة النسبة القياسية الدولية. في هذه الحالة، استشر الطبيب. قد تتناقص فعالية باراسيتامول إذا كنت تتناول في نفس الوقت الستيرويدات الستيرويدية - دواء

يخفف: في الدم (احترم فاصلا زمنيا لأكثر من ساعتين بين كل جرعتين).

باراسيتامول وعلاج بفيتوكوكساليين (مضاد حيوي)، قد (حساسية عالية في الدم يسبب تسرع معدل التنفس).

تحت تناول: للكبد، • أدوية تنحرف إنزاج الأيض السام لباراسيتامول

بنيتال، فينيتوين، كارامازيبين، توبراماسات، • الوقت مع الكحول.

يل أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي دواء آخر، لكونكوكسينول.

خطر لظهور ال
إلى الطبيب إذا
سوف يخبرك
للحمل.

تُعد مدة العلاج في 7 أيام متتالية.

قبل الشروع في العلاج بهذا الدواء، تحقق من عدم تناول أدوية -

باراسيتامول.

تأول باراسيتامول يمكن أن يسبب اضطرابات وظائف الكبد.

آخر الطبيب: • إذا كان وزنك يقل عن 50 كغ، • إذا كنت تعاني من مرض كبد أو مرض

خطر في الكلى، • إذا كنت تشبه الكحول كثيرا أو توقفت عن استهلاك الكحول مؤخرا، • إذا كنت تعاني من فقدان للماء من الجسم، • إذا كنت تعاني مثلا من سوء التغذية المزمن،

إذا كنت في فترة الصوم، إذا فقدت الكثير من الوزن مؤخرا، إذا كان سنك يفوق 75 سنة أو يفوق 65 سنة وتعاين من أمراض طويلة الأمد، إذا كنت مصابا بقرص أو نقص المناعة البشرية

أو بالتآكل الكبد الفيروسي المزمن، إذا كنت تعاني من التليف الكيسي (مرض جنيني ووراثي ينسب خاصة بإصابات تنفسية خطيرة)، أو إذا كنت مصابا بمرض جيلير (مرض وراثي مقترن

بأقراص بيرويين في الدم).

ينصح بعدم استهلاك المشروبات الكحولية خلال العلاج.

في حالة الانقطاع حديث العهد عن الإدمان المزمن على الكحول، يتردد خطر الإصابة الكبدية، في حالة التهاب الكبد الفيروسي الحاد، توقف عن العلاج واستشر الطبيب.

في حالة مشكلة التغذية (سوء التغذية) أو فقدان الماء من الجسم، يجب تناول رولاكسول، أقراص بكل حذر.

الأطفال والمراهقون: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16 سنة لأسباب السلامة.

في حالة الشك، لا تردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تأول أو استعمال أدوية أخرى: أبلغ أنك تتناول هذا الدواء إذا وصف لك الطبيب تحليل نسبة الحصى البوريك في الدم أو نسبة السكر في الدم.

لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول. قد تتعرض لخطر جرعة مفرطة.

إذا كنت تتيج علاجاً مضاداً لتخثر الدم عن طريق الفم (وارفارين أو مضاد فيتامين K)، فأن تناول باراسيتامول بالجرعات القصوى (4 غ/اليوم) لأكثر من 4 أيام يتطلب مراقبة مشددة

للتحليل البيولوجية ما فيها خاصة النسبة القياسية الدولية. في هذه الحالة، استشر الطبيب. قد تتناقص فعالية باراسيتامول إذا كنت تتناول في نفس الوقت الستيرويدات الستيرويدية - دواء

يخفف: في الدم (احترم فاصلا زمنيا لأكثر من ساعتين بين كل جرعتين).

باراسيتامول وعلاج بفيتوكوكساليين (مضاد حيوي)، قد (حساسية عالية في الدم يسبب تسرع معدل التنفس).

تحت تناول: للكبد، • أدوية تنحرف إنزاج الأيض السام لباراسيتامول

بنيتال، فينيتوين، كارامازيبين، توبراماسات، • الوقت مع الكحول.

يل أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي دواء آخر، لكونكوكسينول.

خطر لظهور ال
إلى الطبيب إذا
سوف يخبرك
للحمل.

تُعد مدة العلاج في 7 أيام متتالية.

قبل الشروع في العلاج بهذا الدواء، تحقق من عدم تناول أدوية -

باراسيتامول.

تأول باراسيتامول يمكن أن يسبب اضطرابات وظائف الكبد.

آخر الطبيب: • إذا كان وزنك يقل عن 50 كغ، • إذا كنت تعاني من مرض كبد أو مرض

خطر في الكلى، • إذا كنت تشبه الكحول كثيرا أو توقفت عن استهلاك الكحول مؤخرا، • إذا كنت تعاني من فقدان للماء من الجسم، • إذا كنت تعاني مثلا من سوء التغذية المزمن،

إذا كنت في فترة الصوم، إذا فقدت الكثير من الوزن مؤخرا، إذا كان سنك يفوق 75 سنة أو يفوق 65 سنة وتعاين من أمراض طويلة الأمد، إذا كنت مصابا بقرص أو نقص المناعة البشرية

أو بالتآكل الكبد الفيروسي المزمن، إذا كنت تعاني من التليف الكيسي (مرض جنيني ووراثي ينسب خاصة بإصابات تنفسية خطيرة)، أو إذا كنت مصابا بمرض جيلير (مرض وراثي مقترن

بأقراص بيرويين في الدم).

ينصح بعدم استهلاك المشروبات الكحولية خلال العلاج.

في حالة الانقطاع حديث العهد عن الإدمان المزمن على الكحول، يتردد خطر الإصابة الكبدية، في حالة التهاب الكبد الفيروسي الحاد، توقف عن العلاج واستشر الطبيب.

في حالة مشكلة التغذية (سوء التغذية) أو فقدان الماء من الجسم، يجب تناول رولاكسول، أقراص بكل حذر.

الأطفال والمراهقون: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16 سنة لأسباب السلامة.

في حالة الشك، لا تردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تأول أو استعمال أدوية أخرى: أبلغ أنك تتناول هذا الدواء إذا وصف لك الطبيب تحليل نسبة الحصى البوريك في الدم أو نسبة السكر في الدم.

لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول. قد تتعرض لخطر جرعة مفرطة.

إذا كنت تتيج علاجاً مضاداً لتخثر الدم عن طريق الفم (وارفارين أو مضاد فيتامين K)، فأن تناول باراسيتامول بالجرعات القصوى (4 غ/اليوم) لأكثر من 4 أيام يتطلب مراقبة مشددة

للتحليل البيولوجية ما فيها خاصة النسبة القياسية الدولية. في هذه الحالة، استشر الطبيب. قد تتناقص فعالية باراسيتامول إذا كنت تتناول في نفس الوقت الستيرويدات الستيرويدية - دواء

Lot : 028
À utiliser de
préférence avant le : 04/2025

PPC : 79,50 DH

خطر لظهور ال
إلى الطبيب إذا
سوف يخبرك
للحمل.

تُعد مدة العلاج في 7 أيام متتالية.

قبل الشروع في العلاج بهذا الدواء، تحقق من عدم تناول أدوية -

باراسيتامول.

تأول باراسيتامول يمكن أن يسبب اضطرابات وظائف الكبد.

آخر الطبيب: • إذا كان وزنك يقل عن 50 كغ، • إذا كنت تعاني من مرض كبد أو مرض

خطر في الكلى، • إذا كنت تشبه الكحول كثيرا أو توقفت عن استهلاك الكحول مؤخرا، • إذا كنت تعاني من فقدان للماء من الجسم، • إذا كنت تعاني مثلا من سوء التغذية المزمن،

إذا كنت في فترة الصوم، إذا فقدت الكثير من الوزن مؤخرا، إذا كان سنك يفوق 75 سنة أو يفوق 65 سنة وتعاين من أمراض طويلة الأمد، إذا كنت مصابا بقرص أو نقص المناعة البشرية

أو بالتآكل الكبد الفيروسي المزمن، إذا كنت تعاني من التليف الكيسي (مرض جنيني ووراثي ينسب خاصة بإصابات تنفسية خطيرة)، أو إذا كنت مصابا بمرض جيلير (مرض وراثي مقترن

بأقراص بيرويين في الدم).

ينصح بعدم استهلاك المشروبات الكحولية خلال العلاج.

في حالة الانقطاع حديث العهد عن الإدمان المزمن على الكحول، يتردد خطر الإصابة الكبدية، في حالة التهاب الكبد الفيروسي الحاد، توقف عن العلاج واستشر الطبيب.

في حالة مشكلة التغذية (سوء التغذية) أو فقدان الماء من الجسم، يجب تناول رولاكسول، أقراص بكل حذر.

الأطفال والمراهقون: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16 سنة لأسباب السلامة.

في حالة الشك، لا تردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تأول أو استعمال أدوية أخرى: أبلغ أنك تتناول هذا الدواء إذا وصف لك الطبيب تحليل نسبة الحصى البوريك في الدم أو نسبة السكر في الدم.

لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول. قد تتعرض لخطر جرعة مفرطة.

إذا كنت تتيج علاجاً مضاداً لتخثر الدم عن طريق الفم (وارفارين أو مضاد فيتامين K)، فأن تناول باراسيتامول بالجرعات القصوى (4 غ/اليوم) لأكثر من 4 أيام يتطلب مراقبة مشددة

للتحليل البيولوجية ما فيها خاصة النسبة القياسية الدولية. في هذه الحالة، استشر الطبيب. قد تتناقص فعالية باراسيتامول إذا كنت تتناول في نفس الوقت الستيرويدات الستيرويدية - دواء

يخفف: في الدم (احترم فاصلا زمنيا لأكثر من ساعتين بين كل جرعتين).

باراسيتامول وعلاج بفيتوكوكساليين (مضاد حيوي)، قد (حساسية عالية في الدم يسبب تسرع معدل التنفس).

تحت تناول: للكبد، • أدوية تنحرف إنزاج الأيض السام لباراسيتامول

بنيتال، فينيتوين، كارامازيبين، توبراماسات، • الوقت مع الكحول.

يل أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي دواء آخر، لكونكوكسينول.

خطر لظهور ال
إلى الطبيب إذا
سوف يخبرك
للحمل.

تُعد مدة العلاج في 7 أيام متتالية.

قبل الشروع في العلاج بهذا الدواء، تحقق من عدم تناول أدوية -

باراسيتامول.

تأول باراسيتامول يمكن أن يسبب اضطرابات وظائف الكبد.

آخر الطبيب: • إذا كان وزنك يقل عن 50 كغ، • إذا كنت تعاني من مرض كبد أو مرض

خطر في الكلى، • إذا كنت تشبه الكحول كثيرا أو توقفت عن استهلاك الكحول مؤخرا، • إذا كنت تعاني من فقدان للماء من الجسم، • إذا كنت تعاني مثلا من سوء التغذية المزمن،

إذا كنت في فترة الصوم، إذا فقدت الكثير من الوزن مؤخرا، إذا كان سنك يفوق 75 سنة أو يفوق 65 سنة وتعاين من أمراض طويلة الأمد، إذا كنت مصابا بقرص أو نقص المناعة البشرية

أو بالتآكل الكبد الفيروسي المزمن، إذا كنت تعاني من التليف الكيسي (مرض جنيني ووراثي ينسب خاصة بإصابات تنفسية خطيرة)، أو إذا كنت مصابا بمرض جيلير (مرض وراثي مقترن

بأقراص بيرويين في الدم).

ينصح بعدم استهلاك المشروبات الكحولية خلال العلاج.

في حالة الانقطاع حديث العهد عن الإدمان المزمن على الكحول، يتردد خطر الإصابة الكبدية، في حالة التهاب الكبد الفيروسي الحاد، توقف عن العلاج واستشر الطبيب.

في حالة مشكلة التغذية (سوء التغذية) أو فقدان الماء من الجسم، يجب تناول رولاكسول، أقراص بكل حذر.

الأطفال والمراهقون: لا تستعمل هذا الدواء لدى الأطفال أو المراهقين دون 16 سنة لأسباب السلامة.

في حالة الشك، لا تردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تأول أو استعمال أدوية أخرى: أبلغ أنك تتناول هذا الدواء إذا وصف لك الطبيب تحليل نسبة الحصى البوريك في الدم أو نسبة السكر في الدم.

لا تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول. قد تتعرض لخطر جرعة مفرطة.

رولا

باراسيتامول

أقراص

يخضع هذا الدواء ل

المرتبطة بالسلامة.

انظر نهاية الفقرة 4

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة

احتفظ بها

أو قد قد

استعملين وسيلة لمنع الحمل. • إذا كنت ترضعين، • قصور،

في حالة الشك، من الضروري استشارة الطبيب

يجب الانتباه عند استعمال رولاكسول

احتياطات الاستعمال الخاصة:

يتطلب ظهور نوبة احتل

في حالة جرعة مفرطة

الفور.

يحتوي هذا الدواء على

تتناول أدوية أخرى تحتوي ع

طبية.

لا تجمع بينها حتى لا تتجاوز الجر

تعليمات خاصة: في حالة الإسهال، أخبر الطبيب الذي قد يعيد ضبط الجرعة.

في حالة آلام المعدة، غثيان، في. أخبر الطبيب.

احترم تماما جرعات ومدة العلاج الموصوفة في الفقرة 3. يجب عدم استعمال

صيغة كوك (أو أقراص من رولاكسول) أو لمدة تتجاوز 7 أيام. وذلك لأن المواد

جسمك عندما تتناول بيوكوكسينول جرعات مفرطة قد تنسب في إصابات في

الخلايا (عدد غير عادي من الصفيحات). وبنت البرونة على ذلك خلال دراسات لدى

الحيوانات والدراسات في المختبر. لدى الإنسان، يعتبر هذا النوع من الإصابات الخلوية عامل