

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MD N° M21- 0057418

Maladie

Dentaire

76309

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00657

Société : R.A.M.

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Mr. MAZHOUR Salam

Date de naissance :

Adresse :

El Massoudia Rue 29 N° 25 cité Djamaa
Casablanca

Tél. :

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. MOUFID Salam
OPHTHALMOLOGISTE
Bd. Mohamed VI, N°3 Rue 249 Hay Moulay Abdellah,
Ain Chock, CASABLANCA - Tél : 05 22 39 56 60
Agréé Permis de Conduire

Date de consultation : 28/06/2021

Nom et prénom du malade : Mr. MAZHOUR Salam

30 JUIN 2021

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Chalazion

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

MAZHOUR SALAM

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/06/2011	CHIRURGIE	03	200 DH	Dr. MOUFIID OTHMANE Ophtalmologue Mohamed VI, N°3 Rue 249 Hay Mohammadi Casablanca - Tel : 05 22 50 10 01 Permis de PE : 091021014

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE DR. EL HARRAK 28, Bd. Driss El Harti Cité Djemaa Casablanca	128 / 06 / 2021	248,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MÉDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000

[Création, remont, adjonction]

11. *Leucosia* *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius) *leucostoma* (Fabricius)

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

Coefficient des travaux

MONTANTS DES COINS

DATE DU
DEVIS

Dr MOUFID Saadia

Maladies et Chirurgie des yeux

- Ex Médecin à l'Hôpital 20 Août
- Ex Médecin à l'Hôpital Moulay Youssef
- Ex Médecin à l'Hôpital Sidi Othmane
- Membre de Société Française d'Ophtalmologie
 - Chirurgie de la cataracte
- Chirurgie des paupières et des voies-lacrymales
 - Glaucomes • Diabète • Lasers

الدكتورة بفيدة السعدية

أمراض وجراحة العيون

طبية سابقة بمستشفى 20 غشت

طبعة سابقة بمستشفى مولاي يوسف

طبقة سابقة بمستشفى سعد عثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حاجة الحالات وحاجة الحفظ

• ببرانج • ببرانج • ببرانج • ببرانج

Casablanca le

28 JUN 2023

Amie

MAZ 1602

بنموسى
pharmacie BENMOUSSA
El Hart

26. Av. Cdt. Driss El
Jamila 3 - Cité Djémâa
Tel. : 0522 37 33 67 - CASABLANCA

~~22~~ 22i TOURNIA

→ Taxishash
30, 10, 1/2 the left.

18000 ~~SV~~ (3500 x 2)
Leptoptera
1/1 the 24/ $\frac{1}{2}$

- o Cito Davis 

220° Fatched
1" long & 6"

Dr. MOUFIID Saadia
OPTOMETRISTE
BP. Mohamed VI, N° 3108-249-HAY Moulay Abdellah,
Ain Ben Yakk CASABLANCA - Tel : 05 22 59 96 60
Permis de Conduire
NIP : 091021014

شارع محمد السادس الرقمن 3 الزنقة 249 - حي مولاي عبد الله عين الشق - الدار البيضاء

Bd.Mohammed VI N° 3 Rue 249 - Hay Mly Abdellah - Ain Chock - Casablanca

الهاتف: 0522 59 96 60

24840

LEVOPHTA 0,05%
Colyre 5ml
ZENITH PHARMA
PPV : 75.00 DHS
AMM N° 728/16DMP/21/NRQr

LOT/بارد H6040
FAB/انتاج 04-2020
EXP/انتهاء 03-2022

LEVOPHTA 0,05%
Colyre 5ml
ZENITH PHARMA
PPV : 75.00 DHS
AMM N° 728/16DMP/21/NRQr

LOT/بارد H5488
FAB/انتاج 11-2019
EXP/انتهاء 10-2021

MAXIDROL®, pommade ophtalmique

Dexaméthasone

Sulfate de néomycine

Sulfate de polymyxine B

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE-QUE MAXIDROL, pommade ophtalmique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MAXIDROL, pommade ophtalmique ?
3. COMMENT UTILISER MAXIDROL, pommade ophtalmique ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MAXIDROL, pommade ophtalmique ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE MAXIDROL, pommade ophtalmique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Corticoïdes et anti-infectieux en association.

Ce médicament est une pommade ophtalmique contenant :

- un antibiotique de la famille des aminosides : la néomycine,
- un antibiotique de la famille des polypeptides : la polymyxine B,
- et un corticoïde : la dexaméthasone.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines inflammations et infections de l'œil et des paupières :

- après chirurgie de l'œil,
- dans des infections avec inflammation, dues à des bactéries pouvant être combattues par les antibiotiques contenus dans ce médicament.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MAXIDROL, pommade ophtalmique ?

Ce médicament n'est pas destiné à :

- antécédents d'allergie à la polymyxine B (antibiotique), à la néomycine (antibiotique de la famille des aminosides),
- infection débutante de l'œil d'origine virale,
- affection mycosique.

6 118001 070404
Laboratoires Sotherma Bouskoura
Maxidrol pommade ophtal., 3,5 g
A.D.S.P. Maroc N° 14/DMP/21/NCI
PPV : 22,40 DHS

406805
X

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament :

CILOXAN® 0,3 % Collyre**Ciprofloxacin**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin, ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **CILOXAN collyre** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **CILOXAN collyre** ?
3. Comment utiliser **CILOXAN collyre** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **CILOXAN collyre** ?
6. Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QUE CILOXAN collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Le collyre Ciloxan contient le principe actif ciprofloxacin (un antibiotique) qui agit contre de nombreuses bactéries qui peuvent provoquer des infections oculaires. Ciloxan collyre est destiné

au traitement des conjonctivites, des blépharites ainsi que des ulcères cornéens d'origine bactérienne et s'utilise uniquement sur ordonnance médicale

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OU D'UTILISER CILOXAN collyre**Contre-indications :****Ne pas utiliser CILOXAN 0,3 %, collyre**

- si vous êtes allergique à la ciprofloxacin ou à un autre antibiotique similaire (la famille des quinolones),
- si vous êtes allergique à l'un des composants de ce collyre,

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Consultez immédiatement votre médecin si les irritations oculaires traitées s'aggravent dans les 2 à 3 jours après le début du traitement avec Ciloxan collyre ou si vous observez de nouveaux symptômes.

Le traitement par Ciloxan doit être arrêté dès les premiers signes de tendinite.

Veuillez informer votre médecin ou

pharmacien si vous souffrez d'autres maladies, êtes allergique ou prenez déjà des médicaments (même en automédication!).

Remarque pour porteurs de lentilles de contact

Ne portez pas vos lentilles pendant le traitement avec Ciloxan collyre.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Pendant la grossesse et l'allaitement, utilisez ce médicament uniquement sur autorisation de votre médecin.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

Après l'utilisation de Ciloxan collyre, il arrive que l'on voie trouble pendant un petit moment. Évitez donc de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines jusqu'à ce que cet état cesse.

3 COMMENT PRENDRE OU UTILISER CILOXAN collyre ?**Instructions pour un bon usage:**

Ce médicament vous a été prescrit pour les maladies oculaires dans le



Remboursable AMO

406434

Ciloxan collyre sans presc., médicale pour le traitement d'une maladie autre que celle dont vous souffrez ou pour d'autres personnes. Même lors d'une nouvelle infection

Ensuite Instillez dans l'oeil atteint 1 à 2 gouttes toutes les 4 heures jusqu'à ce que l'inflammation bactérienne ait disparu.

En cas d'ulcère cornéen:

Adultes et enfants à partir de 1 an:

Ciloxan doit être appliqué selon le schéma suivant, également pendant la nuit:

1^{er} jour: Instillez dans l'oeil atteint 2 gouttes toutes les 15 minutes pendant les 6 premières heures, puis 2 gouttes toutes les 30 minutes.

2^{er} jour: Instiller 2 gouttes toutes les heures dans l'oeil atteint

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :
L'utilisation pendant la grossesse n'est pas recommandée. L'utilisation pendant l'allaitement, ne peut se faire que sur autorisation expresse de votre médecin.

Enfants et adolescents : L'utilisation et la sécurité d'emploi du collyre Maxidrol n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent.

souples. Après l'application du collyre Maxidrol, vous devez attendre au moins 15 minutes avant de pouvoir remettre vos lentilles.

Le collyre Maxidol contient du benzalkonium. agent conservateur qui peut engendrer des irritations oculaires et des éruptions cutanées. Les collyres et les gouttes de l'œil contiennent de l'acide soufré. Il convient d'éviter tout contact avec les lentilles de contact et avec les gouttes de l'œil.

780398 070398
Laboratoires SotHEMA
Maxidrol Collagène
Tirez d'une pression oculaire accrue, si vous avez
l'herpès ou mycosine ou des blessures ou des

• Viale trattie Volee PPV : 30,10 DHS
N°54/DMP/21/NCV
Maroc 5 ml
15 vous souffrez d'autres maladies (en particulier

• En cas de tracé 466904, fronce et du visage (syndrome de Cushing), vous devrez en informer

- Schéma : application locale de critères pour privilier une priorité de l'eau.

- de nouveaux symptômes, consultez immédiatement votre médecin;

Le deuxième constat important est que sous conditions médicales, devant un traitement avec le collyre mésaxidol, la pression intraoculaire devrait être mesurée régulièrement par vote médicin.

Maxidol est utilisé pendant une longue période, cela peut retarder la cicatrisation. Cela peut également augmenter la pression intraoculaire et, par conséquent, entraîner un glaucome. Vous

- Utilisez d'autres antidiotiques avec le collyre Maxidol.
- Utilisez prolongé du collyre Maxidol pour soulager le rhume des yeux.

allergiques peuvent également survenir dans d'autres traitements (topiques ou systémiques) avec un antibiotique du même type (amylolycosides). Adressez-vous à votre médecin si vous

gommement des palpitations ou de rougissement des yeux, arrêtez le traitement et consultez votre médecin. Les réactions allergiques peuvent se manifester de manière très différente, de

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales : • Lorsqu'une réaction allergique se développe, par ex. en cas de démagéfaction oculaire, de

- lors de certaines infections virales et bactériennes de l'œil,
- lors de mycoses oculaires ou d'infections parasitaires non traitées de l'œil,
- lors de maladies neurologiques ou de lésions de la moelle épinière.

N'utilisez jamais MAXIDROL collyre :
- Lors d'une hypersensibilité allergique connue ou supposée à une substance du médicament.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MAXIDRUG COLLYRE ?

Le collyre Mézixidol est un médicament pour le traitement des infections oculaires mécaniques et doit être utilisé uniquement sur prescription du médecin.

6. Informations supplémentaires
1-QUELLE EST LA MAXIDIROL COLLYRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

4. Quels sont les effets indésirables événuels ?
5. Comment conserver Maxidrol collyre ?

1. Qu'est-ce que Maxidrol collirre et de quoi ça est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Maxidrol collirre ?

Quel contributeur cette notice :

Si l'un des effets indésirables délivré grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné malade soit identiques aux vôtres.

medecin, ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la rire. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre

Wavelength 632.8 nm

NOTICE : UN QUARTON DE CHIQUETTE

© NOVARTIS

NOVATIS