

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :

668

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

SAGHTIR BA Md Abdellah

Date de naissance :

01/01/1942

Adresse :

HAY SALMI II Rue 1 N° 245 CASA

Tél. :

0663523785

Total des frais engagés :

609,60

Dhs

Cadre réservé au Médecin

DOCTEUR BERRADA Saïd

Dermatologue
338, Bd. Driss El Harti
CASABLANCA
Tél: 05 22 57 97 30-Fax: 05 22 57 97 33

MUPRAS

09 JUIL. 2021

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

2021

SAGHTIR BA Md Abdellah

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

2021

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous plconfidential à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 09/07/21

Signature de l'adhérent(e) :

DOCTEUR BERRADA Saïd
Le : 09/07/21
338, Bd. Driss El Harti
CASABLANCA
Tél: 05 22 57 97 30-Fax: 05 22 57 97 33

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09/01/21	3	300,00	INP : 09/01/2021	DOCTEUR BERRADA Said Dermatologue 338 Bd. Driss El Hachmi TANANARIVE

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE n°116 Salma Casablanca 25 22 38 38 84	20 06 2011	609,60 MAD

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES																					
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																					
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.																					
SOINS DENTAIRES 	Dents Traitées (List of treated teeth)	Nature des Soins (Nature of treatments)	Coefficient (Coefficient)	INP : <input style="width: 100px; height: 15px; border: 1px solid black; border-radius: 5px;" type="text"/>																	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX																	
				MONTANTS DES SOINS																	
				DEBUT D'EXECUTION																	
				FIN D'EXECUTION																	
				ODF PROTHÉSES DENTAIRES 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> </div>	H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	00000000	G	35533411	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX			
						H	25533412	21433552													
						D	00000000	00000000													
						B	00000000	00000000													
						G	35533411	11433553													
MONTANTS DES SOINS																					
DATE DU DEVIS																					
DATE DE L'EXECUTION																					
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																					
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS																					
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION																					

الدكتور سعيد بerala Docteur Saïd BERRADA

Diplômé de la Faculté de Médecine de Montpellier.
Ancien Attaché des Hôpitaux de Montpellier

- Maladies de la Peau et du Cuir Chevelu
- Maladies Sexuellement Transmissibles
- Dermatologie Pédiatrique
- Chirurgie Dermatologique
- Allergologie Cutanée
- Phlébologie - Sclérose des varices
- Liposculpture-Peeling-Feeling-Dermabrasion
- Botox - Comblement

DERMATOLOGUE



SAID BERRADA
دكتور سعيد بerala

- خريج بكلية الطب بمونبولي بفرنسا
منتدب سابق بمستشفيات مونبولي
● اختصاصي في أمراض وجراحة الجلد والشعر
● الأمراض التناسلية
● الأمراض الجلدية للأطفال
● حساسية الجلد
● أمراض وجراحة الدوالي
● الطب التجميلي

Casablanca, le :

27/01/2024

PHARMACIE BELLOUCH
Rue 1 N°116 Salmia II Sbata
Casablanca
Tél: 05 22 38 36 84

2280x2

Vitamin E oil



119.40 x 4 28 37j > 10
Al7vin 500

22.20 x 2 180 42j > 10

Co Dociornic

18 37j > 10

30,00 50mls neuds 21

609.60

PHARMACIE BELLOUCH
Rue 1 N°116 Salmia II Sbata
Casablanca
Tél: 05 22 38 36 84

DOCTEUR BERRADA Saïd
Dermatologue
338, Bd. Driss El Harti
CASABLANCA
Tél: 05 22 57 97 30-Fax: 05 22 57 97 33

Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

EDUCATIONAL COMPOSITION

Paracétamol

Phosphate de codeïne hémihydraté

1. Acétopamorphine hydrochlorate (Quantité correspondant à codeïne base)

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre.

Exipients : gelatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Sy.)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, ~~qui~~ ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

CE MEDICAMENT NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeine,
 - maladie grave du foie,
 - chez l'asthmatique,
 - en cas d'insuffisance respiratoire,
 - allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS,
Notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine ou la pentazocine, IL FAUT SIGNALER
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A
VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf posologie).



Codoliprane®

PARACETAMOL ET CODEINE

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

EDUCATIONAL COMPOSITION

Paracétamol

Phosphate de codeïne hémihydraté

1. Acétopamphate de codeïne hémiméthyle (Quantité correspondant à codeïne base)

Excipients : gélatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre

Excipients : gelatine, acide stéarique, amidon de pomme de terre.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable - boîte de 16.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE CENTRAL ET PERIPHERIQUE (N. Sy.)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitement chez l'adulte des douleurs d'intensité modérée à intense, *qui ne sont pas soulagées par l'aspirine ou le paracétamol utilisé seul.*

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

CE MEDICAMENT NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol ou à la codeine,
 - maladie grave du foie,
 - chez l'asthmatique,
 - en cas d'insuffisance respiratoire,
 - allaitement.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine. EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant d'expectoration, en cas de maladie du foie ou d'insuffisance rénale ainsi que chez les sujets âgés, un avis médical est indispensable. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.

PRECAUTION D'EMPLOI

La prise de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, NOTAMMENT AVEC LA BUPRÉNORPHINE, LA NAIBUPHINE OU LA PENTAZOCINE, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine. D'autres médicaments en contiennent.

Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (cf. posologie).



Alyvir® RANBAXY 500 mg

(Chlorhydrate de Valaciclovir), Comprimé pelliculé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALYVIR® RANBAXY appartient à la famille des médicaments appelés antiviraux. Son mécanisme d'action consiste à détruire ou arrêter la croissance des virus appelés *Herpes simplex* (HSV), *Varicelle-Zona* (VZV) et *Cytomégalovirus* (CMV).

ALYVIR® RANBAXY est indiqué dans les :

Infections à virus varicelle-zona (VZV) :

- Traitement du zona et du zona ophthalmique chez l'adulte immunocompétent.
- Traitement du zona chez le patient adulte présentant une immunodépression légère ou modérée.

Infections à virus *Herpes simplex* (HSV) :

- Traitement et prévention des infections cutanées et muqueuses à HSV, incluant :
 - Traitement du premier épisode d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Traitement des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Prévention des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.

Arrêter l'infection à CMV (Cytomégalovirus)

- La dose habituelle est de 2000 mg (4 comprimés de 500 mg) 4 fois par jour.
- Vous devrez respecter un intervalle d'environ 6 heures entre chaque prise.
- En général, vous commencerez votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY juste après la transplantation.
- Vous devrez prendre ALYVIR® RANBAXY environ après la transplantation. Votre médecin vous dise d'arrêter.

Votre médecin peut

si:

- Vous avez plus de 65 ans.
- Si vous êtes immunocompétent.
- Vous présentez des troubles rénaux.
- Si vous êtes dans l'un de ces cas, de prendre ALYVIR® RANBAXY.

Mode d'administration

Ce médicament se prend par voie orale.

Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez ALYVIR® RANBAXY chaque jour à la même heure.

Durée de traitement

Prenez ALYVIR® RANBAXY en respectant les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien.

Patients de plus de 65 ans ou présentant des troubles rénaux :

- La posologie de ALYVIR® RANBAXY sera diminuée par votre médecin.
- Pendant toute la durée de votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY , il est très important de vous hydrater régulièrement tout au long de la journée. Cela permettra de réduire les effets indésirables du médicament qui peuvent affecter la fonction rénale ou le système nerveux. Votre médecin vous suivra attentivement afin de détecter d'éventuels signes de ces effets. Les effets indésirables affectant le système nerveux peuvent inclure une sensation de confusion, ou d'agitation, de somnolence inhabituelle.

Si vous avez l'impression que l'effet de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé que vous n'auriez dû : Habituellement, ALYVIR® RANBAXY n'est pas nocif, sauf en cas de surdosages répétés sur plusieurs jours. Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, une confusion, une agitation ou encore une somnolence inhabituelle. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez pris trop de ALYVIR® RANBAXY et amenez-lui la boîte de médicaments.

Si vous oubliez de prendre ALYVIR® RANBAXY , comprimé

PPV : 119D140

Alyvir® RANBAXY 500 mg

(Chlorhydrate de Valaciclovir), Comprimé pelliculé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALYVIR® RANBAXY appartient à la famille des médicaments appelés antiviraux. Son mécanisme d'action consiste à détruire ou arrêter la croissance des virus appelés *Herpes simplex* (HSV), *Varicelle-Zona* (VZV) et *Cytomégalovirus* (CMV).

ALYVIR® RANBAXY est indiqué dans les :

Infections à virus varicelle-zona (VZV) :

- Traitement du zona et du zona ophthalmique chez l'adulte immunocompétent.
- Traitement du zona chez le patient adulte présentant une immunodépression légère ou modérée.

Infections à virus *Herpes simplex* (HSV) :

- Traitement et prévention des infections cutanées et muqueuses à HSV, incluant :
 - Traitement du premier épisode d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Traitement des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Prévention des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.

Arrêter l'infection à CMV (Cytomégalovirus)

- La dose habituelle est de 2000 mg (4 comprimés de 500 mg) 4 fois par jour.
- Vous devrez respecter un intervalle d'environ 6 heures entre chaque prise.
- En général, vous commencerez votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY juste après la transplantation.
- Vous devrez prendre ALYVIR® RANBAXY environ après la transplantation. Votre médecin vous dise d'arrêter.

Votre médecin peut

si:

- Vous avez plus de 65 ans.
- Si vous êtes immunocompétent.
- Vous présentez des troubles rénaux.
- Si vous êtes dans l'un de ces cas, de prendre ALYVIR® RANBAXY.

Mode d'administration

Ce médicament se prend par voie orale.

Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez ALYVIR® RANBAXY chaque jour à la même heure.

Durée de traitement

Prenez ALYVIR® RANBAXY en respectant les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien.

Patients de plus de 65 ans ou présentant des troubles rénaux :

- La posologie de ALYVIR® RANBAXY sera diminuée par votre médecin.
- Pendant toute la durée de votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY , il est très important de vous hydrater régulièrement tout au long de la journée. Cela permettra de réduire les effets indésirables du médicament qui peuvent affecter la fonction rénale ou le système nerveux. Votre médecin vous suivra attentivement afin de détecter d'éventuels signes de ces effets. Les effets indésirables affectant le système nerveux peuvent inclure une sensation de confusion, ou d'agitation, de somnolence inhabituelle.

Si vous avez l'impression que l'effet de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé que vous n'auriez dû : Habituellement, ALYVIR® RANBAXY n'est pas nocif, sauf en cas de surdosages répétés sur plusieurs jours. Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, une confusion, une agitation ou encore une somnolence inhabituelle. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez pris trop de ALYVIR® RANBAXY et amenez-lui la boîte de médicaments.

Si vous oubliez de prendre ALYVIR® RANBAXY , comprimé

PPV : 119D140

Alyvir® RANBAXY 500 mg

(Chlorhydrate de Valaciclovir), Comprimé pelliculé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALYVIR® RANBAXY appartient à la famille des médicaments appelés antiviraux. Son mécanisme d'action consiste à détruire ou arrêter la croissance des virus appelés *Herpes simplex* (HSV), *Varicelle-Zona* (VZV) et *Cytomégalovirus* (CMV).

ALYVIR® RANBAXY est indiqué dans les :

Infections à virus varicelle-zona (VZV) :

- Traitement du zona et du zona ophthalmique chez l'adulte immunocompétent.
- Traitement du zona chez le patient adulte présentant une immunodépression légère ou modérée.

Infections à virus *Herpes simplex* (HSV) :

- Traitement et prévention des infections cutanées et muqueuses à HSV, incluant :
 - Traitement du premier épisode d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Traitement des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Prévention des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.

Arrêter l'infection à CMV (Cytomégalovirus)

- La dose habituelle est de 2000 mg (4 comprimés de 500 mg) 4 fois par jour.
- Vous devrez respecter un intervalle d'environ 6 heures entre chaque prise.
- En général, vous commencerez votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY juste après la transplantation.
- Vous devrez prendre ALYVIR® RANBAXY environ après la transplantation. Votre médecin vous dise d'arrêter.

Votre médecin peut

si:

- Vous avez plus de 65 ans.
- Si vous êtes immunocompétent.
- Vous présentez des troubles rénaux.
- Si vous êtes dans l'un de ces cas, de prendre ALYVIR® RANBAXY.

Mode d'administration

Ce médicament se prend par voie orale.

Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez ALYVIR® RANBAXY chaque jour à la même heure.

Durée de traitement

Prenez ALYVIR® RANBAXY en respectant les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien.

Patients de plus de 65 ans ou présentant des troubles rénaux :

- La posologie de ALYVIR® RANBAXY sera diminuée par votre médecin.
- Pendant toute la durée de votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY , il est très important de vous hydrater régulièrement tout au long de la journée. Cela permettra de réduire les effets indésirables du médicament qui peuvent affecter la fonction rénale ou le système nerveux. Votre médecin vous suivra attentivement afin de détecter d'éventuels signes de ces effets. Les effets indésirables affectant le système nerveux peuvent inclure une sensation de confusion, ou d'agitation, de somnolence inhabituelle.

Si vous avez l'impression que l'effet de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé que vous n'auriez dû : Habituellement, ALYVIR® RANBAXY n'est pas nocif, sauf en cas de surdosages répétés sur plusieurs jours. Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, une confusion, une agitation ou encore une somnolence inhabituelle. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez pris trop de ALYVIR® RANBAXY et amenez-lui la boîte de médicaments.

Si vous oubliez de prendre ALYVIR® RANBAXY , comprimé

PPV : 119D140

Alyvir® RANBAXY 500 mg

(Chlorhydrate de Valaciclovir), Comprimé pelliculé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALYVIR® RANBAXY appartient à la famille des médicaments appelés antiviraux. Son mécanisme d'action consiste à détruire ou arrêter la croissance des virus appelés *Herpes simplex* (HSV), *Varicelle-Zona* (VZV) et *Cytomégalovirus* (CMV).

ALYVIR® RANBAXY est indiqué dans les :

Infections à virus varicelle-zona (VZV) :

- Traitement du zona et du zona ophthalmique chez l'adulte immunocompétent.
- Traitement du zona chez le patient adulte présentant une immunodépression légère ou modérée.

Infections à virus *Herpes simplex* (HSV) :

- Traitement et prévention des infections cutanées et muqueuses à HSV, incluant :
 - Traitement du premier épisode d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Traitement des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.
 - Prévention des récurrences d'herpès génital chez l'adulte et l'adolescent immunocompétents et l'adulte immunodéprimé.

Arrêter l'infection à CMV (Cytomégalovirus)

- La dose habituelle est de 2000 mg (4 comprimés de 500 mg) 4 fois par jour.
- Vous devrez respecter un intervalle d'environ 6 heures entre chaque prise.
- En général, vous commencerez votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY juste après la transplantation.
- Vous devrez prendre ALYVIR® RANBAXY environ après la transplantation. Votre médecin vous dise d'arrêter.

Votre médecin peut

si:

- Vous avez plus de 65 ans.
- Si vous êtes immunocompétent.
- Vous présentez des troubles rénaux.
- Si vous êtes dans l'un de ces cas, de prendre ALYVIR® RANBAXY.

Mode d'administration

Ce médicament se prend par voie orale.

Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Prenez ALYVIR® RANBAXY chaque jour à la même heure.

Durée de traitement

Prenez ALYVIR® RANBAXY en respectant les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien.

Patients de plus de 65 ans ou présentant des troubles rénaux :

- La posologie de ALYVIR® RANBAXY sera diminuée par votre médecin.
- Pendant toute la durée de votre traitement avec ALYVIR® RANBAXY , il est très important de vous hydrater régulièrement tout au long de la journée. Cela permettra de réduire les effets indésirables du médicament qui peuvent affecter la fonction rénale ou le système nerveux. Votre médecin vous suivra attentivement afin de détecter d'éventuels signes de ces effets. Les effets indésirables affectant le système nerveux peuvent inclure une sensation de confusion, ou d'agitation, de somnolence inhabituelle.

Si vous avez l'impression que l'effet de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de ALYVIR® RANBAXY , comprimé pelliculé que vous n'auriez dû : Habituellement, ALYVIR® RANBAXY n'est pas nocif, sauf en cas de surdosages répétés sur plusieurs jours. Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, vous pouvez avoir des nausées, des vomissements, une confusion, une agitation ou encore une somnolence inhabituelle. Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez pris trop de ALYVIR® RANBAXY et amenez-lui la boîte de médicaments.

Si vous oubliez de prendre ALYVIR® RANBAXY , comprimé

PPV : 119D140