

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W19-590937

77279

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricole : 1381		Société : ROYAL AIR MAROC	
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : RAJIZ MOHAMED			
Date de naissance : 1950			
Adresse : 96, Hay Addarmane Apt F- Au chek			
Tél. : 06 11 96 07 05	Total des frais engagés : 1337,00 Dhs		

Cadre réservé au Médecin			
Dr. EL ADNANI Abdessamad			
Service des Urgences			
CHU Mohammed V Casablanca			
INP : 861125212			
Date de consultation : 13/06/2021			
Nom et prénom du malade : RAJIZ MOHAMED			
Age : 70			
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : DPT + gout + coxa			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : PAR Le : 07/07/2021

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Palier des Actes
27/06/18	Dr EL ADNANI Abdessamed	Service des Urgences	INP : 061725217	INP : 061725217 Dr EL ADNANI Abdessamed Service des Urgences CHP Mohamed Sakkal - Casablanca INP : 061725217

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Al Issamad sarl au Dyar Dakhama Gr 5 Impr 24 N°18 - Bouskoura GSM : 0664646750	23/06/18	1040 Dhs

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>[Signature]</i>	27/06/18	1040 Dhs	1040 Dhs

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :

O.D.F

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

MONTANTS DES SOINS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX


MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

ORDONNANCE

Le: 23/06/2021



144,50

Noham A Rafil

① Raciper 2

1.5

37.0 mg U

② Acetilho

1.5

69,90 7x34

③ Nitrodots

1.5

18U

Pharmacie Assanak s.a.s
Dyar Djibouti
N° 18 - Bous
GSM: 004



**VITALOTS**

N° Lot : 20.288

PPC : 69,90 DH

A consommer de préférence avant fin
DUO : TU/2023**VITALOTS****VITALOTS** Comprimés effervescents Multivitamines + Minéraux + Oligo-éléments. Complément alimentaire avec des édulcorants.**VITALOTS** est un véritable cocktail de 12 vitamines et 8 minéraux soigneusement sélectionnés pour apporter forme et vitalité chez l'adulte. Ce complément alimentaire satisfait l'essentiel des besoins quotidiens en vitamines (100% des AJR) ainsi qu'une partie des besoins les plus importants en minéraux.Indispensables, ces nutriments assurent l'équilibre biologique et rechargent l'organisme à la fois physiquement et intellectuellement. La puissance synergie de ces actifs exerce une action revitalisante sur l'organisme, améliorant ainsi l'état de bien-être général. Grâce à un procédé innovant de micro encapsulation du fer, **VITALOTS** dévoile un goût orange, fruité et intense, sans arrière-goût minéral limité ainsi qu'un faible temps d'effervescence.Selon le Règlement Européen n° 432/2012, les allégations suivantes ont reçu un avis positif de la part de l'EFSA (**EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY**) et sont donc autorisées pour l'étiquetage des denrées alimentaires :**Vitamines:****Vitamine A**

- La vitamine A joue un rôle dans le processus de spécialisation cellulaire.
- Elle contribue au maintien de muqueuses normales, au maintien d'une peau normale, au métabolisme normal du fer

Vitamine E

- La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif

Vitamine C

- La vitamine C contribue à réduire la fatigue
- La vitamine C contribue à des fonctions psychologiques normales
- La vitamine C contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E
- La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif
- La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
- La vitamine C contribue à maintenir le fonctionnement normal du système immunitaire pendant et après un exercice physique intense
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des gencives
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale de la peau
- La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des dents
- La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système nerveux
- La vitamine C accroît l'absorption de fer

Vitamine B1

- La vitamine B1 contribue à des fonctions psychologiques normales
- La vitamine B1 contribue à un métabolisme énergétique normal
- La vitamine B1 contribue à une fonction cardiaque normale
- La vitamine B1 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

Vitamine B2

- La vitamine B2 contribue à un métabolisme énergétique normal
- La vitamine B2 contribue au métabolisme normal du fer
- La vitamine B2 contribue au maintien de muqueuses normales
- La vitamine B2 contribue au maintien d'une peau normale
- La vitamine B2 contribue au maintien d'une vision normale
- La vitamine B2 contribue au maintien de globules rouges normaux
- La vitamine B2 contribue à réduire la fatigue
- La vitamine B2 contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. La vitamine B2 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

Vitamine B3

- La vitamine B3 contribue à réduire la fatigue
- La vitamine B3 contribue à un métabolisme énergétique normal
- La vitamine B3 contribue à des fonctions psychologiques normales
- La vitamine B3 contribue au maintien de muqueuses normales
- La vitamine B3 contribue au maintien d'une peau normale
- La vitamine B3 contribue au fonctionnement normal du système nerveux

Vitamine B5

- La vitamine B5 contribue à des performances
- La vitamine B5 contribue à réduire la fatigue
- La vitamine B5 contribue à un métabolisme énergétique normal
- La vitamine B5 contribue à la synthèse normale et au métabolisme normal des hormones stéroïdes, de la vitamine D et de certains neurotransmetteurs

Vitamine B6

- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal de l'homocystéine
- La vitamine B6 contribue à un métabolisme énergétique normal
- La vitamine B6 contribue à des fonctions psychologiques normales
- La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue
- La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine
- La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines et du glycogène. La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux
- La vitamine B6 contribue à la formation normale de globules rouges
- La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
- La vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale

ACETHIO® 500 mg / 2 mg, comprimés, Boîte de 20
DCI : Paracétamol/Thioclochicoside

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :
<Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ACETHIO® COMPRIMÉS, et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ACETHIO® COMPRIMÉS ?
3. Comment utiliser ACETHIO® COMPRIMÉS ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ACETHIO® COMPRIMÉS ?
6. Informations Supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ACETHIO® COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Paracétamol : analgésique, antipyrétique. (Code ATC : N02BE01). Thioclochicoside : myorelaxant. (Code ATC : M03BX05).

Indications thérapeutiques :

- Traitemment d'appoint des contractures musculaires douloureuses en pathologie rachidienne aigüe chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ACETHIO® COMPRIMÉS ?

Liste des informations à connaître avant la prise du médicament
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications :

Ne prenez jamais ACETHIO®, dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au thioclochicoside et/ou paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.
- Si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte.
- Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception.
- Si vous allaitez.
- Insuffisance hépatocellulaire ou maladie grave du foie.
- Enfants de moins de 16 ans.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
FAITES ATTENTION AVEC ACETHIO® 500 mg / 2 mg.**

Mises en garde spéciales :

Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (voir rubrique : Posologie).

Précautions particulières d'emploi :

En cas de diarrhée, de douleurs d'estomac, de nausées ou de

P.P.V. :

LOT :

EXP. :

37,00

Prévenez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol.

En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou déshydratation, ACETHIO comprimés doit être utilisé avec précaution.

Ce médicament contient l'amidon de blé qui peut contenir traces de gluten.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants et adolescents : N'administrez pas ce médicament enfants ou aux adolescents âgés de moins de 16 ans pour raisons de sécurité.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments :

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique dans le sang ou dosage de la glycémie.

ACETHIO peut augmenter la toxicité du chloramphénicol.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives :

Sans objet.

Grossesse et allaitement :

Ne prenez pas ce médicament : "si vous êtes enceinte, pourriez tomber enceinte ou pensez que vous pourriez être enceinte, vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants n'utilisant pas de contraception."

Ce médicament peut mettre en danger votre enfant. Ne prenez pas ce médicament si vous allaitez car il passe dans le lait maternel.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs : Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser machines :

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence liées à l'usage de ce médicament même si elles restent très rares.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.



Esméprazole magnésium

20mg et 40mg

Comprimés gastro-résistants en boîtes de 7, 14 et 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous est personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. COMPOSITION DU MEDICAMENT

Chaque comprimé gastro-résistant contient 20 mg ou 40 mg de substance active : Esméprazole (sous forme d'Esméprazole magnésium).

Les autres composants sont : Sphères de sucre, Hydroxypropylcellulose (HPC-L), Crospovidone (PXL-10), Povidone (PVP K -30), Macrogol 400, Talc purifié, Hypermellose phthalate (HP-5S), Hypermellose phthalate (HP-50), Diethylphthalate, Macrogol 6000 , Cellulose microcristalline PH101, Cellulose microcristalline PH112, Crospovidone (PWXL), Fumarate de sodium stéaryle, Opadry 03B86651 marron , Macrogol 4000, Alcool isopropylique, Acétone, Chlorure de méthylène, Eau purifiée.

Liste des excipients à effet notable : saccharose (sphères de sucre).

2. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

RACIPER® contient une substance active appelée esoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

3. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

RACIPER® 20 mg, comprimés gastro-résistants sont utilisés dans le traitement des maladies suivantes:

Adultes et jeunes gens âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou duodénal en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,

Adultes

- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

RACIPER® 40 mg, comprimé gastro-résistant sont utilisés dans le traitement des maladies suivantes:

- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.
- Poursuite du traitement après prévention avec Esméprazole par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal.

4. POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT

Instructions pour un bon usage

Prenez toujours RACIPER® exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si besoin.

- RACIPER® comprimé gastro-résistant n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Mode d'administration

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.

Troubles rénaux sévères.

Gonflement des seins chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée P
données disponibles).

- Si vous prenez RACIPER® 20 mg et 40% compre

taux de magnésium peuvent se traduire par des

involontaires, une désorientation, des convulsions

et des sensations vertigineuses.

Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en

informer immédiatement votre médecin. D'ailleurs de magnésium peuvent également

entrainer une diminution des taux de potassium ou calcium dans le sang. Votre médecin

pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de

magnésium.

- Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées)

RACIPER® peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit

immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une

infection avec des symptômes tels que la fièvre avec une fatigue générale très

importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs

dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un

important que vous donnez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

Ne soyez pas inquiet par cette liste d'effets indésirables possibles, vous pouvez n'en avoir

aucun.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains

effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre

pharmacien.

7. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants

Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

Si vous avez des problèmes rénaux sévères.

Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant toute administration de RACIPER®

20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants.

RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants peuvent masquer des symptômes

d'autres maladies. Si vous prenez RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants, vous devez informer immédiatement votre médecin si :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang,

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

En cas de prescription d'un traitement « à la demande » en fonction des besoins, vous devez contacter votre médecin si les symptômes persistent ou se modifient.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que RACIPER® 20 mg et 40mg,

comprimés gastro-résistants, en particulier sur une période supérieure à un an, peut

légitimement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres.

Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes

(qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Excipients à effet notable: Saccharose. En raison de la présence de saccharose, l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

8. INTERACTIONS

UTILISATION D'AUTRES MEDICAMENTS :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants peuvent interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et réciproquement.

Vous ne devez pas prendre RACIPER® si vous prenez le médicament suivant :

- nelfinavir (utilisé dans le traitement du VIH);

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH);

- étoconazole, itraconazole ou voriconazole, (utilisés dans le traitement des infections fongiques);

- erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer).

- clataopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression);

- diazépam, (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);

- phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie); si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par

votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de RACIPER® 20 mg et 40mg, comprimés gastro-résistants ;

PPV: 144DH50

CODE No.: HP/DRUGS/MNB/95/2

Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH
Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

M U P R A S

Nº Admission : 21007456 Nº Facture : 21007331 Date facturati: 23/06/2021

Nom et prénom du patient : Mr RAJIL MOHAMED

PRESTATIONS	Nombre	Prix unitaire	Montant
TDM CEREBRALE	1.00	1 040.00	1 040.00
Sous-Total		1 040.00 DH	

arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille quarante dirhams **Total** : **1 040.00DH**

Adhérent : Part organisme : 0,00 DH
Mle : Part patient : 1040,00 DH
PC N° :



Dr Chakib BENNANI-SMIRES | Dr Hassan ZEGHARI | Dr Mohamed HAMDOUCH
Dr Abdelaziz ZOUAOUI | Dr Fatiha DADI-BENMOUSSA | Dr Nazha LAHLOU

Casablanca, le 23 Juin 2021

MR. RAJIL MOHAMED

COMPTE RENDU

TDM CEREBRALE :

Technique :

Acquisition hélicoïdale sans injection de produit de contraste en fenêtres parenchymateuses.

Résultat :

- Image lacunaire de 7mm de diamètre au niveau du lobe pariétal gauche, correspondant à une lésion séquellaire.
- Absence d'autre anomalie de signal osseux au sein du parenchyme cérébral sus et sous tentoriel.
- Calcifications des noyaux lenticulaires sans valeur pathologique.
- Aspect normal du système cisterno-ventriculaire.
- Pneumatisation normale des sinus de la face.

Conclusion :

- Petite lacune séquellaire au niveau du lobe pariétal gauche.
- Absence d'autre anomalie notable par ailleurs.

DR LAHLOU NEZHA



ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE

E1 831
—

HOPITAL

Alia

VILLE

Reçu de M

Ryad

Quittance

N°00655427/J

La somme de

NATURE DE LA RECETTE	Ex	Somme
<i>C</i>	<i>h</i>	
TOTAL		<i>40,20</i>

Cachet du
Service

Le *28.6.20*

Signature du
Régisseur