

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MD:  
76860

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9751

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : QUADRY

AZZ

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 22 35 30 64

Total des frais engagés

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. ZYC JLT Médecin  
Ophtalmologue  
52, Bd. el khallil Hay M  
Abdellah - Casablanca  
Tél: 05 22 52 38 42

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Age :

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Dr. ZYC JLT Médecin  
Ophtalmologue  
52, Bd. el khallil Hay M  
Abdellah - Casablanca  
Tél: 05 22 52 38 42

En cas d'accident préciser les causes et circonstances

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RAS AL

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/06/14	SS		200.00	Dr. ZRYOUNI M. Ophtalmologue 52, Bd. el Khalil Hay M Abdellah Casablanca Tél: 05 22 52 38 42

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL KINDI Dr. Taoufik BARAZZOUI 48, Rue 1, Lot Hassan Les Crêtes, Ain Chicha, Casablanca	14/04/2021	103.20

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de !

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Spécialiste des Maladies  
et Chirurgie des Yeux

Chirurgie de Cataracte (Phacoémulsification)

Diabète oculaire-glaucome

ANGIOGRAPHIE - OCT - LASER

Chirurgie des Voies Lacrymales

Permis de Conduire



اختصاصية أمراض  
و جراحة العيون

جراحة المياه البيضاء (جلالة) بالليزر

سكري العيون - ضغط العين

تصوير أوعية الشبكة و الليزر

جراحة مسالك الدموع

رخصة السياقة

Mr. QUADRY Aziz



et Nuit Soir / 8 J

FUCITHALMIC 1% GEL OPHTAL

1 application le soir, pendant 1 semaines, les deux yeux

+++



SICCAFUID : collyre

1 goutte 3 à 6 fois / jour, œil gauche



ICOMB: COLLYRE

une goutte x 4 / jour, les deux yeux, 8 jours



SERUM PHYSIOLOGIQUE: 5ml ou PHYSIODOSE

lavage oculaire en cas de démangeaisons



ISTACYNE

100 mg une prise x 2, 15 jours

PHARMACIE AL KINDI  
Dr. Taoufik BARAZZOUK  
48, Rue 1, Lot Fisilia  
Les Crêtes, Ain Chock - Casablanca  
Tel: 05 22 50 72 57

Dr. ZRYOUIL Merieme  
Ophtalmologue  
52 Bd El Khalil Hay Moulay  
Abdellah - Casablanca  
Tél: 05 22 52 38 42

# Physiodose

FR

## QU'EST CE QUE PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

**Physiodose sérum physiologique** est un sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable. Présenté en unidose, **Physiodose sérum physiologique** est hygiénique et permet facilité et sécurité d'emploi.

### Composition

Chlorure de Sodium ..... 0,9 g.  
Eau purifiée ..... q.s.p. 100 mL

## QUELLES SONT LES INDICATIONS DE PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

**Physiodose sérum physiologique** est conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte :

- Pour l'hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés,
- Pour l'hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain,
- Pour le rinçage auriculaire,
- Pour le lavage des plaies,
- Pour l'inhaltion en aérosolthérapie.

## COMMENT UTILISER PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations. A usage unique et individuel. Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure.

### • POUR L'HYGIÈNE NASALE ET OCULAIRE

**Physiodose sérum physiologique** peut être utilisé quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison d'1 à 6 lavage(s) par jour, en fonction des besoins.

### - POUR L'HYGIÈNE DU NEZ

En instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés.

#### Mode d'emploi

Incliner la tête en arrière.

Introduire délicatement l'embout dans la narine et appuyer légèrement sur l'unidose.

Répéter l'opération pour l'autre narine. Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités, puis essuyer l'excédent. Ne pas se moucher violemment au cours des 10 minutes suivant l'administration.

#### Précaution d'emploi

Chez le nourrisson, instiller le produit avec le minimum de pression afin d'éviter tout risque de contamination de l'oreille moyenne.

### - POUR L'HYGIÈNE DES YEUX

En instillation, en lavage ou en bain.

#### Mode d'emploi

Déposer quelques gouttes de solution dans chaque œil, en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la surface de l'œil. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse stérile.

#### Précaution d'emploi

En cas de traitement par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

### • POUR L'HYGIÈNE DES OREILLES

En rinçage. Pour une parfaite hygiène auriculaire, utiliser le produit pour entraîner les dépôts solubilisés de cérumen et rincer le conduit auditif externe après utilisation d'une solution tensio-active auriculaire.

#### Mode d'emploi

Rincer le conduit auditif externe avec **Physiodose sérum physiologique**. Utiliser 1 dose de **Physiodose sérum physiologique** pour les 2 oreilles. Essuyer l'excédent de liquide avec une compresse.

### • POUR LE LAVAGE DES PLAIES

#### Mode d'emploi

Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie.

#### Précaution d'emploi

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

## • POUR INHALATION EN AÉROSOLTHÉRAPIE

### Mode d'emploi

Si le produit est utilisé comme solvant pour inhalation en aérosolthérapie, reportez vous aux instructions indiquées sur le produit à inhale. Si le produit est utilisé seul, reportez-vous aux instructions indiquées sur l'appareil d'aérosolthérapie.

#### Précaution d'emploi

Demandez conseil à votre médecin en cas de première utilisation ou en cas d'hypersensibilité respiratoire, de pathologies graves respiratoires ou cardiovasculaires.

## COMMENT CONSERVER PHYSIODOSE SERUM PHYSIOLOGIQUE ?

Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'unidose. ~~température inférieure à 30°C~~

TE

3 518646 266553

ZENITH PHARMA  
PPC : 37,20 DH

### Physiodose

recommended for babies, children, and adults:

- For nasal hygiene: to irrigate or cleanse dry or stuffed up noses,
- For ocular hygiene: as an eyewash or bath to cleanse the eyes,
- For auricular rinsing,
- For cleansing wounds,
- For inhalation in aerosoltherapy.

## HOW IS PHYSIODOSE PHYSIOLOGICAL SALINE SOLUTION USED?

Do not use the same single dose for the different uses. The single-dose container is disposable and for individual use. Detach a vial and open it by twisting off the top.

### • FOR NASAL AND OCULAR HYGIENE

**Physiodose physiological saline solution** may be used daily as a nasal and eye wash 1 to 6 time(s) a day, as needed.

### - FOR NASAL HYGIENE

To irrigate or cleanse dry or stuffed up noses.

#### Directions for Use

Tilt the head back. Delicately insert the tip into one nostril and gently squeeze the vial. Repeat the operation in the other nostril. Lift the head up to allow the mucus to run out and then wipe away the excess. Do not blow your nose violently for 10 minutes after administering.

#### Precaution for Use

For babies, squeeze drops with a minimum amount of pressure to avoid any risk of contamination of the middle ear.

### - FOR OCULAR HYGIENE

As an eyewash or bath to cleanse the eyes.

#### Directions for Use

Pour a few drops of solution into each eye, taking care not to touch the surface of the eye with the vial. Wipe away excess liquid with sterile gauze.

#### Precaution for Use

Wait 15 minutes before using any other eye treatment product.

# ISTACYNE

## Doxycycline

Comprimés  
Boîte de 10

### IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

doxycycline ..... 100 mg  
excipients ..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

doxycycline ..... 200 mg  
excipients ..... q.s. pour un comprimé

#### Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c)Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponèmies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bétalactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf. relatives.

Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de n

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail en cas d'administration
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossites)
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiques couchées et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réticardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réal d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

PPV : 

LOT : 

PER :

ISTACYNE 100 mg

10 comprimés



6 118000 180777

# ISTACYNE

## Doxycycline

Comprimés  
Boîte de 10

### IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

doxycycline ..... 100 mg  
excipients ..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

doxycycline ..... 200 mg  
excipients ..... q.s. pour un comprimé

#### Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c)Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponèmies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bétalactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf. relatives.

Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de n

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail en cas d'administration
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossites)
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiques couchées et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réticardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réal d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

PPV : 

LOT : 

PER :

ISTACYNE 100 mg

10 comprimés



6 118000 180777

# ISTACYNE

## Doxycycline

Comprimés  
Boîte de 10

### IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### composition qualitative et quantitative

ISTACYNE 100 mg comprimés :

doxycycline ..... 100 mg  
excipients ..... q.s. pour un comprimé

ISTACYNE 200 mg comprimés :

doxycycline ..... 200 mg  
excipients ..... q.s. pour un comprimé

#### Formes et présentations pharmaceutiques

ISTACYNE Comprimés dosés à 100 mg, Boîte de 10.

ISTACYNE Comprimés dosés à 200 mg, Boîte de 10.

#### c)Classe pharmaco-thérapeutique

Antibactériens à usage systémique.

### 2. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections suivantes :

Brucellose, Pasteurellose, Infections pulmonaires, génito-urinaires et ophtalmiques à chlamydiae, Infections pulmonaires, génito-urinaires à mycoplasmes, Rickettsioses, Coxiella burnetti (fièvre Q), Gonococcie, Infections ORL et bronchopulmonaires à Haemophilus influenzae, en particulier exacerbations aiguës de bronchites chroniques, Tréponèmies (dans la syphilis, les tétracyclines ne sont indiquées qu'en cas d'allergie aux bétalactamines), Spirochètes (maladie de Lyme, leptospirose), Choléra, Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes, Rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

Situations particulières :

Traitement prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

### 3. ATTENTION !

#### a) Contre-indications

Absolues :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines,
- Enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente dentaire.
- Rétinoïdes par voie générale : cf. interactions.
- Chez la femme enceinte à partir du 2ème trimestre de la grossesse : cf. relatives.

Relatives : Pendant l'allaitement.

#### b) Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

En raison des risques de photosensibilisation, il est conseillé d'éviter pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de n

En raison des risques d'atteintes oesophagiennes, il est important de faire

#### c) Effets Indésirables

- Dyschromie dentaire ou hypoplasie de l'émail en cas d'administration
- Troubles digestifs (nausées, épigastralgies, diarrhées, anorexie, glossites)
- Survenue possible de dysphagie, d'œsophagite, d'ulcérations œsophagiques couchées et/ou avec une faible quantité d'eau.
- Réactions allergiques : urticaire, rash, prurit, œdème de Quincke, réticardite, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant, Réal d'erythrodermie,
- Des cas de troubles hématologiques ont été décrits lors de traitements par des tétracyclines : anémie hémolytique,

PPV : 

LOT : 

PER :

ISTACYNE 100 mg

10 comprimés



6 118000 180777