

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## ologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## taire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## ladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



# Déclaration de Maladie

N° M21- 0037703

MD:  
f6899

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 1687 Société :

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : SALHI Ahmed

Date de naissance : 1 1 1939

Adresse : Hay Montayy Abdellah, Ain Chock Rue 283

no 6 Joroh

Tél. : 0665958739 Total des frais engagés : 1641 Dhs Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 15/05/2019

Nom et prénom du malade : Salhi Ahmed Age : 85 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Affection cardiaque

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : maladie cardiaque

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/06/21	CS	350	350	Docteur STAMM Neurologue Assas 222 522 516 - GSM: 0603 343 310 Assas 222 522 516 - GSM: 0603 343 310 Assas 222 522 516 - GSM: 0603 343 310 Assas 222 522 516 - GSM: 0603 343 310

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
02/06/21	1341,00	

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d'état de la dent.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of upper and lower dental arches with numbered teeth from 1 to 8. Arrows indicate the direction of treatment: H (top left), G (top right), D (bottom left), and B				

Docteur ATTAR Zineb

Neurologue-Epileptologue  
Adulte-Enfant



الدكتورة عطار زينب

اختصاصية في أمراض الدماغ والأعصاب  
والعمود الفقري والعضلات واحتياطات أمراض  
الصرع (الكبار والأطفال)

- Vidéo Electroencéphalogramme «EEG»
- Electro NeuroMyogramme «ENMG»

• تخطيط الكهربائي للدماغ ( الشبكة )

• تخطيط الكهربائي للأعصاب والعضلات

Casablanca le :

02/06/2022

M.Y

Ahmed

Sallhi

1) Exelon patch 8 J  
9000ug 3 patch / 24 h  
Pinsdal 0,5 J le soin

126.0 DR

Docteur ATTAR ZINEB  
Neurologue - Epileptologue  
EEG - ENMG  
N° 18, Bd Al Qods, Résidence Essakane El Anik  
Ain Chok - Casablanca  
Tél : 052 522 516 - GSM : 0665 343 310

صفا 404 شارع القدس، إقامة السكن الأنثيق، الطابق 3 رقم 18 عن الشق، البار البيضاء

Essaka 404, Bd Al Qods, Résidence Essakane El Anik, 3<sup>eme</sup> Etage N° 18, Ain Chok - CASABLANCA.  
Tél : 05 22 52 25 16 Email : attar.neurologie@gmail.com الهاتف : 05 22 52 25 16  
GSM : 06 65 04 33 10 المحمول : 06 65 04 33 10

D de 3 min

231.00X3

4) Elouxa 10mg  
Docteur ATTAR ZINEB  
Neurologue - Epileptologue  
EEG - ENNG  
Assala 20, Bd Al Qods, Rés. Essakane, Anfa  
N° 10 Ain Chock - Casablanca  
Tel.: 0522 522 515 - GSM: 0665 043 310

P D C 3 mois

P D V C 3 mois

Maphar  
Km 10, Route Côtière 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
EBIXA 10MG B28 CP PELL  
P.P.V : 231,00 DH

6 118001 184859

Maphar  
Km 10, Route Côtière 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
EBIXA 10MG B28 CP PELL  
P.P.V : 231,00 DH

6 118001 184859

Maphar  
Km 10, Route Côtière 111,  
Ql Zenata Ain sebaa Casablanca  
EBIXA 10MG B28 CP PELL  
P.P.V : 231,00 DH

6 118001 184859

# PAROXETINE GT 20 mg,

comprimé pelliculé en boîte de 20 et 30

DCI : Paroxétine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE GT 20 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antidépresseur – Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine – code ATC : N06 AB 05

PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

Les troubles anxieux avec lesquels PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé peut être prescrit sont les suivants :

• Episode dépressif majeur ;

• Troubles obsessionnels compulsifs ;

• Trouble panique, avec ou sans agoraphobie ;

• Trouble anxiété sociale/phobie sociale ;

• Trouble anxiété généralisée ;

• Etat de stress post-traumatique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE GT 20 mg, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé si :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé IMAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le mémantine et le chlorure de méthylénaminonium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment arrêter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par IMAO.

• Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé et informez-en votre médecin.

Adressessez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé :

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous « Interactions avec d'autres médicaments »).

• Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé pouvant diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidépresseur.

• Si vous souffrez d'epilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. vous avez une sismothérapie et maniaque) (excitation incontrôlable et hyperactivité).

• Si vous avez des antécédents de troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements, comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphenazine ou la inflammation appelle Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, ibuprofène, le diclofénac, l'etodolac, le diclofenac, le méloxicam.

• Si vous êtes diabétique.

• Si vous suivez un régime pauvre en sel.

• Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil), alittement ou fente).

• Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse, de moins de 18 ans »).

Si vous présentez l'une des conditions ci-dessus et si vous n'en avez pas déjà parlé à votre médecin, retournez voir votre médecin et demandez-lui son avis sur la prise de PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé.

PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé ne doit habituellement pas être utilisé chez les patients de moins de 18 ans présentant un risque accru d'effets indésirables tels que l'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé.

Néanmoins, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé à des patients de moins de 18 ans si elle décide que c'est dans l'intérêt

de votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette franchise de la sécurité à long terme de PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé concernant la croissance, la maturation et le développement cognitif et

dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : augmentation des

pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressif ou inamical, manque d'appétit, trouble de sommeil, agitation, des fluctuations de l'humeur et des saignements et/ou hémorragies (par exemple des saignements récu du placebo, mais à une fréquence moindre). Dans ces études, certains patients avaient moins de 18 ans lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé (voir rubrique 3 « Comment prendre PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé ? »).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté 10 des douleurs abdominales, une nervosité, et des pleurs, agressivité envers soi-même, pensées suicidaires et aggravation de leur dépression.

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous êtes plus susceptible de présenter ce type de symptômes :

- si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression
- si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le comportement suicidaire était accru, chez les adultes de moins de 18 ans.

Si vous avez des idées suicidaires, ou d'auto-agression, parlez-en à votre médecin ou allez directement à l'hôpital.

Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, ou par un professionnel de la santé. Vous pouvez lui demander de vous signaler si l'envie de se suicider s'aggrave, ou s'il s'inquiète d'un changement dans votre état de santé.

Enfin, les effets indésirables importants observés avec PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé Des patients traités par PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé ont rapporté le fait de se sentir rester assis ou debout tranquillement. D'autres patients ont rapporté la totalité des symptômes suivants : sensation de grande agitation, confusion, d'agitation, sensation de chaleur, transpiration excessive (vision ou sens étranges), rigidité des muscles ou une accélération inappropriée et/ou accélérée. La sévérité de ces symptômes peut varier. Si vous ressentez ces symptômes, contactez votre médecin. Pour plus d'information

sur les effets indésirables éventuels ?, interactions avec d'autres médicaments :

Certaines médicaments peuvent modifier l'action de PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé, et augmenter le risque d'effets secondaires. PAROXETINE GT 20 mg, comprimé pelliculé peut également modifier l'action d'autres médicaments.

Ces médicaments incluent :

- des médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO), comme la moclobémide et le chlorure de méthylénaminonium (bleu de méthylène).
- la thioridazine ou le pimozide, qui sont des médicaments psychotropes.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le ibuprofène et d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres antidépresseurs incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres antidépresseurs incluant des ISRS et des antidépresseurs tricycliques.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• d'autres médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• clomipramine, la nortriptiline et la desipramine.

• un médicament contre la douleur, l'irtriphénane.

• de nombreux médicaments contre la douleur et l'inflammation.

• le tramadol et la pétidépine, des médicaments contre la douleur et l'inflammation.



