

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

entaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1070

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ELHARRA M. FATIMA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06.43.02.55.06 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 05/07/2021

Nom et prénom du malade : ELHARRA M. FATIMA Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Nature des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/07/2021			1500*	Controle
16/07/2021				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/07/2021	7678,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d'état de la dent.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX											
O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES	DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE				MONTANTS DES SOINS										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">H</td> <td style="padding: 2px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">G</td> <td style="padding: 2px;">35533411</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">H</td> <td style="padding: 2px;">11433553</td> </tr> </table>					H	21433552	D	00000000	B	00000000	G	35533411	H	11433553
H	21433552														
D	00000000														
B	00000000														
G	35533411														
H	11433553														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;">H</td> <td style="padding: 2px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">G</td> <td style="padding: 2px;">35533411</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">H</td> <td style="padding: 2px;">11433553</td> </tr> </table>					H	21433552	D	00000000	B	00000000	G	35533411	H	11433553
H	21433552														
D	00000000														
B	00000000														
G	35533411														
H	11433553														
	<p style="font-size: small;">[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>														
CŒFFICIENT DES TRAVAUX	DATE DU DEVIS				DATE DE L'EXECUTION										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. GHAFIRI AICHA

الدكتورة غفيري عائشة

Ancien médecin à l'hôpital Mohamed Boaifi

طبيبة داخلية سابقة بمستشفى محمد بوافي

Diplôme en échographie de l'université

دبلوم الفحص بالصدى من جامعة باريس ديكارت

Paris Descartes

دبلوم مرض السكري من جامعة الطب والصيدلة

Diplôme en diabétologie

- الرياض -

Berrechid le 16/07/2021 برشيد في

EL HARRAM ATIMA

1 PILLER A

3 gel x 1 fl. (10j)

3x215cc

Agremon

5.

1 MECROKU

(14g)

1x1228cc 1 gel x 1 fl. (10j)

276780

PHARMACIE BERRECHID
Halima M'RABBI
93 Bd Hassan Boulaïd
Berrechid
Tunisie 1000
Téléphone : 05 22 32 30 33

Document GHAFIRI AICHA
Medecine Generale
185 Appt. N°2 Bd Hassan Boulaïd
Berrechid
Tunisie 1000
Téléphone : 05 22 51 62 62

064302 5506 pylco

LOT 201341
EXP 07/2022
PPV 215.00DH

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

MEZOR « à la demande » en fonction des besoins, vous décidez si les symptômes persistent ou se modifient.

si la pompe à protons tel que MEZOR, en particulier sur une tête augmenter légèrement le risque de fracture de la hanche, crête vertébrale. Informez votre médecin si vous avez de la peine dans des corticoides (qui peuvent augmenter le risque

- Si votre gélule passe

symptômes médicamenteux n'aggravez pas

- Si vous souhaitez prendre un Traitem

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

Traitement de l'acidité

Toiles non standardisées

La dose recommandée par jour pendant

Prévention des infections par le VIH

La dose recommandée par jour pendant

Traitement des infections

Pancréas (syndrome de

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

Adolescents après

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament peut

si la cicatrisation

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

MEZOR 40 mg

Adultes à partir de

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament et pendant 4 semaines supplémentaire

complète

- Si vous souffrez

prescrire une dose

Tratment de l'acné (syndrome de

Pancréas (syndrome de

La dose recommandée par jour pendant

Adolescents après

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament et pendant 4 semaines supplémentaire

complète

- Si vous souffrez

prescrire une dose

Mode d'administration

- Vous pouvez prendre

- Vous pouvez prendre

- Effectuez une pompe à

empêcher le médicament

pas détériorer les

Que faire si vous

Si vous avez des douleurs

Ouvrez la gélule

Aucun autre liquide

- Puis buvez le mélange avant de

- Afin de prendre

d'un demi-verre de

solides qui ne doi

MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES.
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classé pharmacothérapeutique

Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons

- Code ATC : A02BC05.

MEZOR contient une substance appelée esoméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité acide produite par votre estomac.

indications thérapeutiques :

MEZOR est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

MEZOR 20 mg:

Adultes :

* Reflux gastro-œsophagien :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

* En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodenal en cas d'infection par Helicobacter pylori.

* Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi :

- Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS ;

- Prévention des ulcères gastroduodenaux associés à la prise de la AINS, chez les patients à risque ;

* Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents à partir de l'âge de 12 ans :

* Reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

* En association à des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori.

MEZOR 40 mg :

* Reflux gastro-œsophagien : Traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

* Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastroduodenal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES?

Liste des informations importantes avant la prise du médicament :

Si vous avez des questions ou si vous informez d'une intolerance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-réistantes dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, omeprazole).

- Si vous prenez ce médicament contenant du néfénavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Ne prenez jamais MEZOR si vous êtes dans l'une des situations décrites ci-dessus. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre MEZOR.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères,

- Si vous avez des problèmes rénaux sévères,

- Si vous avez une maladie diabétique ou vous savez que vous risquez de développer une carence en vitamine B12.

- Si vous devez faire un test sanguin spécifique (Chromogranine A),

- Si vous avez déjà présenté une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à MEZOR qui réduit l'acidité gastrique.

- Si vous présentez une éruption sur votre peau, en particulier sur des zones exposées au soleil, informez au plus vite votre médecin car il est possible que vous deviez arrêter votre traitement avec MEZOR. N'oubliez pas d'en informer également de tout autre effet indésirable tel qu'une douleur articulaire.

MEZOR n'est pas recommandé pour les autres maladies. Par conséquent, si vous êtes dans une des situations suivantes, avalez de prendre MEZOR, ou pendant que vous le prenez, parlez-en immédiatement à votre médecin :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

MEZOR n'est pas recommandé chez l'enfant de moins de 12

ans. Les médicaments : si vous prenez avec récemment pris ou pourriez également. Ceci s'applique également aux médicaments non recommandés.

Le fonctionnement d'autres médicaments et réciprocement. R, si vous prenez un médicament contenant du néfénavir ces infections par le VIH).

J'acharnement si vous prenez des médicaments suivants :

- Atazanavir (utilisé dans le traitement des infections par le VIH),

- Clodiprogel (utilisé dans la prévention des callicots sanguins),

- Digoxine (utilisé pour des problèmes cardiaques),

- Rifampicine (utilisé pour le traitement de la tuberculose),

- Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé pour traiter la dépression),

- Kétoprofénac, ibuprofène ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques),

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer),

- Citalopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression),

- Diazepam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, du relâchement musculaire ou de l'épilepsie),

- Phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang comme la warfarine ; une surveillance par votre médecin pourra être nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Clostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque vous marchez qui est causée par un apport sanguin insuffisant),

- Cisapride (utilisé en cas d'indigestion ou de brûlures d'estomac),

- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) ; si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par ce médicament.

- Tacrolimus (utilisé en cas de greffe d'organe).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clavulane (utilisés dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori), vous devez l'informer de tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Soin objectif.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, pendant cette période.

On ignore si MEZOR passe dans le lait maternel. En conséquence, vous ne devez pas utiliser MEZOR lorsque vous allaitez.

Sporfs :

Soin objectif.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

MEZOR n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, des effets indésirables tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement. Si vous présentez ces effets indésirables, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose / iso-maltase (maladie héréditaire rares).

Ce médicament contient du « propyl-p-hydroxybenzoate » (E216) et « méthyl-p-hydroxybenzoate»(E218) et peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMBIEN DE TEMPS PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES ?

Tenez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

- Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Posologie :

- Votre médecin vous indiquera le nombre de gélules à prendre et la durée du traitement. Ceci dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre corps.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

- MEZOR 20 mg

Adultes à partir de 18 ans

Traitement des brûlures d'estomac associées au reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Si votre médecin diagnostique une inflammation du tube digestif (œsophage), la dose recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule

gastro-réstante de MEZOR 20 mg une fois par jour.

LOT 201341
EXP 07/2022
PPV 215.00DH

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

MEZOR « à la demande » en fonction des besoins, vous décidez si les symptômes persistent ou se modifient.

si la pompe à protons tel que MEZOR, en particulier sur une tête augmenter légèrement le risque de fracture de la hanche, crête vertébrale. Informez votre médecin si vous avez de la peine dans des corticoides (qui peuvent augmenter le risque

- Si votre gélule passe

symptômes médicamenteux n'aggravez pas

- Si vous souhaitez prendre un Traitem

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

Traitement de l'acidité

Toiles non standardisées

La dose recommandée par jour pendant

Prévention des infections par le VIH

La dose recommandée par jour pendant

Traitement des infections

Pancréas (syndrome de

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

Adolescents après

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament peut

si la cicatrisation

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

MEZOR 40 mg

Adultes à partir de

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament et pendant 4 semaines supplémentaire

complète

- Si vous souffrez

prescrire une dose

Tratment de l'acné (syndrome de

Pancréas (syndrome de

La dose recommandée par jour pendant

Adolescents après

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament et pendant 4 semaines supplémentaire

complète

- Si vous souffrez

prescrire une dose

Mode d'administration

- Vous pouvez prendre

- Vous pouvez prendre

- Effectuez une pompe à

empêcher le médicament

pas détériorer les

Que faire si vous

Si vous avez des douleurs

Ouvrez la gélule

Aucun autre liquide

- Puis buvez le mélange avant de

- Afin de prendre

d'un demi-verre de

solides qui ne doi

MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES.
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classé pharmacothérapeutique

Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons

- Code ATC : A02BC05.

MEZOR contient une substance appelée esoméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité acide produite par votre estomac.

indications thérapeutiques :

MEZOR est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

MEZOR 20 mg:

Adultes :

* Reflux gastro-œsophagien :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

* En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodenal en cas d'infection par Helicobacter pylori.

* Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi :

- Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS ;

- Prévention des ulcères gastroduodenaux associés à la prise de la AINS, chez les patients à risque.

* Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

* Adolescents à partir de l'âge de 12 ans :

* Reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

* En association à des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori.

* MEZOR 40 mg :

* Reflux gastro-œsophagien : Traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

- Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastroduodenal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES?

Liste des informations importantes avant la prise du médicament :

Si vous avez des questions ou si vous informez d'une intolerance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-réistantes dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, omeprazole).

- Si vous prenez ce médicament contenant du néfénavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Ne prenez jamais MEZOR si vous êtes dans l'une des situations décrites ci-dessus. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre MEZOR.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères,

- Si vous avez des problèmes rénaux sévères,

- Si vous avez une maladie diabétique ou vous savez que vous risquez de développer une carence en vitamine B12.

- Si vous devez faire un test sanguin spécifique (Chromogranine A),

- Si vous avez déjà présenté une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à MEZOR qui réduit l'acidité gastrique.

- Si vous présentez une éruption sur votre peau, en particulier sur des zones exposées au soleil, informez au plus vite votre médecin car il est possible que vous deviez arrêter votre traitement avec MEZOR. N'oubliez pas d'en informer également de tout autre effet indésirable tel qu'une douleur articulaire.

MEZOR n'est pas recommandé pour les autres maladies. Par conséquent, si vous êtes dans une des situations suivantes, avalez de prendre MEZOR, ou pendant que vous le prenez, parlez-en immédiatement à votre médecin :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

MEZOR n'est pas recommandé chez l'enfant de moins de 12

ans. Les médicaments :
Le pharmacien si vous prenez avec récemment pris ou pourriez également. Ceci s'applique également aux médicaments non

le fonctionnement d'autres médicaments et réciprocement. R, si vous prenez un médicament contenant du néfénavir ces infections par le VIH).

Le pharmacien si vous prenez des médicaments suivants :

- Atazanavir (utilisé dans le traitement des infections par le VIH),
- Clodiprogel (utilisé dans la prévention des callicots sanguins),

- Digoxine (utilisé pour des problèmes cardiaques),

- Rifampicine (utilisé pour le traitement de la tuberculose),

- Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé pour traiter la dépression),

- Kétamine, tracozélique ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques),

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer),

- Citalopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression),

- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, du relâchement musculaire ou de l'épilepsie),

- Phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang comme la warfarine ; une surveillance par votre médecin pourra être nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Clostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque vous marchez qui est causée par un apport sanguin insuffisant),

- Cisapride (utilisé en cas d'indigestion ou de brûlures d'estomac),

- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) ; si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par ce médicament.

- Tacrolimus (utilisé en cas de greffe d'organe).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clavulane (utilisé dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori), vous devez l'informer de tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Soin objectif.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si votre médecin décidera si vous pouvez prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, pendant cette période.

Si vous prenez MEZOR passe dans le lait maternel. En conséquence, vous ne devez pas utiliser MEZOR lorsque vous allaitez.

Sporfs :

Soin objectif.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

MEZOR n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, des effets indésirables tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement. Si vous présentez ces effets indésirables, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose / iso-maltase (maladie héréditaire rares).

Ce médicament contient du « propyl-p-hydroxybenzoate (E216) et méthyl-p-hydroxybenzoate (E218) » et peut provoquer des réactions allergiques.

3. COMBIEN DE TEMPS PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES ?

Tenez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

- Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Posologie :

- Votre médecin vous indiquera le nombre de gélules à prendre et la durée du traitement. Ceci dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre corps.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

- MEZOR 20 mg

Adultes à partir de 18 ans

Traitement des brûlures d'estomac associées au reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Si votre médecin diagnostique une inflammation du tube digestif (œsophage), la dose recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-réstante de MEZOR 20 mg une fois par jour.

LOT 201341
EXP 07/2022
PPV 215.00DH

- Vous avez des selles noires teintées de sang.

MEZOR « à la demande » en fonction des besoins, vous décidez si les symptômes persistent ou se modifient.

si la pompe à protons tel que MEZOR, en particulier sur une tête augmenter légèrement le risque de fracture de la hanche, crête vertébrale. Informez votre médecin si vous avez de la peine dans des corticoides (qui peuvent augmenter le risque

- Si votre gélule passe

symptômes médicamenteux n'aggravez pas

- Si vous souhaitez prendre un Traitem

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

Traitement de l'acidité

Toiles non standardisées

La dose recommandée par jour pendant

Prévention des infections par le VIH

La dose recommandée par jour pendant

Traitement des infections

Pancréas (syndrome de

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

Adolescents après

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament peut

si la cicatrisation

La dose recommandée par jour pendant

Votre médecin ou pharmacien

MEZOR 40 mg

Adultes à partir de

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament et pendant 4 semaines supplémentaire

complète

- Si vous souffrez

prescrire une dose

Tratment de l'acné (syndrome de

Pancréas (syndrome de

La dose recommandée par jour pendant

Adolescents après

Tratment de l'acné (RGO)

- Si votre médecin ou pharmacien

recommande ce médicament et pendant 4 semaines supplémentaire

complète

- Si vous souffrez

prescrire une dose

Mode d'administration

- Vous pouvez prendre

- Vous pouvez prendre

- Effectuez une pompe à

empêcher le médicament

pas détériorer les

Que faire si vous

Si vous avez des douleurs

Ouvrez la gélule

Aucun autre liquide

- Puis buvez le mélange avant de

- Afin de prendre

d'un demi-verre de

solides qui ne doi

MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES.
ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classé pharmacothérapeutique

Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pompe à protons

- Code ATC : A02BC05.

MEZOR contient une substance appelée esoméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la quantité acide produite par votre estomac.

indications thérapeutiques :

MEZOR est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

MEZOR 20 mg:

Adultes :

* Reflux gastro-œsophagien :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

* En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodenal en cas d'infection par Helicobacter pylori.

* Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) doit être poursuivi :

- Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS ;

- Prévention des ulcères gastroduodenaux associés à la prise de la AINS, chez les patients à risque ;

* Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents à partir de l'âge de 12 ans :

* Reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

* En association à des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori.

MEZOR 40 mg :

* Reflux gastro-œsophagien : Traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

- Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

* Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastroduodenal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES?

Liste des informations importantes avant la prise du médicament :

Si vous avez des questions ou si vous informez d'une intolerance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-réistantes dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, omeprazole).

- Si vous prenez ce médicament contenant du néfénavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Ne prenez jamais MEZOR si vous êtes dans l'une des situations décrites ci-dessus. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre MEZOR.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères,

- Si vous avez des problèmes rénaux sévères,

- Si vous avez une maladie diabétique ou vous savez que vous risquez de développer une carence en vitamine B12.

- Si vous devez faire un test sanguin spécifique (Chromogranine A),

- Si vous avez déjà présenté une réaction cutanée après un traitement par un médicament similaire à MEZOR qui réduit l'acidité gastrique.

- Si vous présentez une éruption sur votre peau, en particulier sur des zones exposées au soleil, informez au plus vite votre médecin car il est possible que vous deviez arrêter votre traitement avec MEZOR. N'oubliez pas d'en informer également de tout autre effet indésirable tel qu'une douleur articulaire.

MEZOR n'est pas recommandé pour les autres maladies. Par conséquent, si vous êtes dans une des situations suivantes, avalez de prendre MEZOR, ou pendant que vous le prenez, parlez-en immédiatement à votre médecin :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler,

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion,

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

MEZOR n'est pas recommandé chez l'enfant de moins de 12

ans. Les médicaments : si vous prenez avec récemment pris ou pourriez également. Ceci s'applique également aux médicaments non recommandés.

Le fonctionnement d'autres médicaments et réciprocement. R, si vous prenez un médicament contenant du néfénavir ces infections par le VIH).

J'acharnement si vous prenez des médicaments suivants :

- Atazanavir (utilisé dans le traitement des infections par le VIH),

- Clodiprogel (utilisé dans la prévention des callicots sanguins),

- Digoxine (utilisé pour des problèmes cardiaques),

- Rifampicine (utilisé pour le traitement de la tuberculose),

- Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé pour traiter la dépression),

- Kétamine, tracoramide ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques),

- Erlotinib (utilisé dans le traitement du cancer),

- Citalopram, imipramine ou clomipramine (utilisés dans le traitement de la dépression),

- Diazepam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, du relâchement musculaire ou de l'épilepsie),

- Phénytoïne (utilisée dans le traitement de l'épilepsie) ; si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang comme la warfarine ; une surveillance par votre médecin pourra être nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Clostazol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque vous marchez qui est causée par un apport sanguin insuffisant),

- Cisapride (utilisé en cas d'indigestion ou de brûlures d'estomac),

- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) ; si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par ce médicament.

- Tacrolimus (utilisé en cas de greffe d'organe).

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clavulane (utilisés dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori), vous devez l'informer de tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Soin objectif.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, pendant cette période.

On ignore si MEZOR passe dans le lait maternel. En conséquence, vous ne devez pas utiliser MEZOR lorsque vous allaitez.

Sporfs :

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

MEZOR n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, des effets indésirables tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement. Si vous présentez ces effets indésirables, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et méthyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose / iso-maltase (maladie héréditaire rares).

Ce médicament contient du « propyl-p-hydroxybenzoate (E216) et méthyl-p-hydroxybenzoate (E218) » et peut provoquer des réactions allergiques.

7. COMBIEN DE TEMPS PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES ?

Tenez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

- Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Posologie :

- Votre médecin vous indiquera le nombre de gélules à prendre et la durée du traitement. Ceci dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre corps.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

- MEZOR 20 mg

Adultes à partir de 18 ans

Traitement des brûlures d'estomac associées au reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Si votre médecin diagnostique une inflammation du tube digestif (œsophage), la dose recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-réstante de MEZOR 20 mg une fois par jour.

MEZOR® 20 mg et 40 mg

Boîtes de 7, 14 et 28 Gélules gastro-ré

Esméprazole (DCI) magnésium dihy

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant médicamente car elle contient des informations importantes po

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à personne. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous tombez indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

1. QU'EST-CE QUE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Médicaments pour les troubles liés à l'acidité, inhibiteurs de la pom

- Code ATC : A02BC05.

MEZOR contient une substance appelée esoméprazole. Il appartient à médicamenteuses appelées « Inhibiteurs de la pompe à protons ». Il diminue la production de votre estomac.

indications thérapeutiques :

MEZOR est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

• MEZOR 20 mg:

Adultes :

- Reflux gastro-oesophagien :

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien :

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

• En association à une antibiothérapie appropriée, éradication de Helicobacter pylori pour cicatrisation de l'ulcère duodénal en cas d'infection par Helicobacter pylori et prévention de la récidive de l'ulcère gastroduodenal en cas d'infection par Helicobacter pylori.

• Patients chez lesquels un traitement anti-inflammatoire non stéroïden (AINS) doit être poursuivi :

- Cicatrisation des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS ;

- Prévention des ulcères gastroduodenals associés à la prise de la l'AINS, chez les patients à risque.

• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents à partir de l'âge de 12 ans :

• Reflux gastro-œsophagien (RGO)

- Traitement de l'œsophagite érosive par reflux ;

- Traitement d'entretien et prévention des récidives après cicatrisation d'une œsophagite par reflux gastro-œsophagien ;

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

• En association à des antibiotiques dans le traitement de l'ulcère duodénal dû à Helicobacter pylori.

• MEZOR 40 mg :

• Reflux gastro-œsophagien : Traitement de l'œsophagite érosive par reflux.

• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

• Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique d'un ulcère gastroduodenal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais MEZOR 20 mg et 40 mg, gélules gastro-réistantes dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'esomeprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple - pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, oméprazole).

- Si vous prenez un médicament contenant du neflénavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Ne prenez jamais MEZOR si vous êtes dans l'une des situations décrites ci-dessus. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre MEZOR.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères,

- Si vous avez des problèmes rénaux sévères,

- Si vous avez été diagnostiquée ou vous savez que vous risquez de développer une carence en vitamine B12.

- Si vous devez faire un test sanguin spécifique (Chromogranine A),

- Si vous avez déjà eu une réaction cutanée après un traitement par un médicamenteusement à MEZOR qui résulté l'acidité gastrique.

- Si vous présentez une éruption sur votre peau, en particulier sur des zones exposées au soleil, informez au plus vite votre médecin car il est possible que vous deviez arrêter votre traitement avec MEZOR. N'oubliez pas de l'informer également de tout autre effet indésirable tel qu'une douleur articulaire.

MEZOR peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, si vous êtes dans une des situations suivantes, avant de prendre MEZOR, ou pendant que vous le prenez, parlez-en immédiatement à votre médecin :

- Vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler.

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

- Vous vomissez la nourriture ou du sang.

LOT 20134U
EXP 07/2022
PPV 122.80DH

MEZOR® 40mg
Esméprazole (DCI)

14 gélules



6 118000 340324

mes pensent ou se modifient.
ans tel que MEZOR, en particulier sur une
ément le risque de fracture de la hanche,
nformez votre médecin si vous avez de
coldes (qui peuvent augmenter le risque
recommandé chez l'enfant de moins de 12
us prenez avec récemment pris ou pourrez
plique également aux médicaments non
autres médicaments et recommandent
par le VIH).
si vous prenez l'un des médicaments suivants
des infections par le VIH),
(des catilots sanguins),
cardiaques),
(de la tuberculose),
utilisé pour traiter la dépression),
azole (utilisé dans le traitement des infection
cancer),
me (utilisés dans le traitement de la dépression
de l'anxiété, du relâchement musculaire ou d
ratument de l'épilepsie) ; si vous prenez de
otre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de
l'administration de ce médicament.

- Médicaments anticoagulants pour fluidifier le sang comme la warfarine ; une surveillance par votre médecin pourra être nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de ce médicament.

- Ciclospride (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente - douleur dans les jambes lorsque vous marchez qui est causée par un apport sanguin insuffisant),
- Cisapride (utilisé en cas d'indigestion ou de brûlures d'estomac),

- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) - si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par ce médicament,

- Tacrolimus (utilisé en cas de greffe d'organe).
Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et chloramphicine avec MEZOR pour le traitement d'une infection à Helicobacter pylori, vous devez l'informer de tous les autres médicaments que vous prenez.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité :

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre MEZOR 20 mg et 40 mg, pendant cette période.

On ignore si MEZOR passe dans le lait maternel. En conséquence, vous ne devez pas utiliser MEZOR lorsque vous allaitez.

Sports :

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

MEZOR n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Toutefois, des effets indésirables tels que des étourdissements et une vision trouble peuvent survenir peu fréquemment ou rarement. Si vous présentez ces effets indésirables, vous ne devez pas conduire ou utiliser des machines.

MEZOR 20 mg et 40 mg, gélule gastro-réstante contient du saccharose, propyl-p-hydroxybenzoate et methyl-p-hydroxybenzoate :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase / iso-maltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du « propyl-p-hydroxybenzoate (E216) et methyl-p-hydroxybenzoate (E218) » et peut provoquer des réactions allergiques.

COMMENT PRENDRE MEZOR 20 mg ET 40 mg. GÉLULES GASTRO-RÉSISTANTES ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à vous surveiller.

- Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Posologie :

- Votre médecin vous indiquera le nombre de gélules à prendre et la durée du traitement. Ceci dépendra de votre état de santé, de votre âge et du fonctionnement de votre foie.

- Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

- MEZOR 20 mg

Adultes à partir de 18 ans

Traitement des brûlures d'estomac associées au reflux gastro-œsophagien (RGO) :

- Si votre médecin diagnostique une inflammation du tube digestif (œsophage), la dose recommandée est de 40mg de MEZOR une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin peut être amené à vous prescrire un traitement supplémentaire de 4 semaines si la cicatrisation de votre œsophage n'est pas complète.

- La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule gastro-réstante de MEZOR 20 mg une fois par jour.