

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº M21- 0055527
MD:79385

Optique Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0759502 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL AIDI KELTAOUM YOUSSEF NASRY

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 06 19 53 81 55 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. MOUTAMID Omer
Médecin Généraliste
Echographie
Al Firdauss Groupe B1 Imm 11
Appt 1 El Oulfa - Casablanca
05 22 93 41 31

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cachet du médecin :

Date de consultation : 16 JUIL 2021

Nom et prénom du malade : EL AIDI KELTAOUEH Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : MUPRAS

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

16 JUIL 2021



ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16 JUIL 2021	Dr. MOUTAMID Omaï Médecin Généraliste Echographie	Généraliste Echographie B1 Groupe Casablanca	120 Dhs	Dr. MOUTAMID Omaï Médecin Généraliste Echographie Firdauss Groupe B1 Imm 11 El Oufra - Casablanca Tél: 05 22 03 41 31
26 07 2021	Dr. MOUTAMID Omaï Médecin Généraliste Echographie	Généraliste Echographie B1 Groupe Casablanca	120 Dhs	Dr. MOUTAMID Omaï Médecin Généraliste Echographie Firdauss Groupe B1 Imm 11 El Oufra - Casablanca Tél: 05 22 03 41 31

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>PHARMACIE CHAMERRAND</i> <i>CHAMBERY</i>	<i>26/07/21</i>	<i>146,30</i> <i>376,90</i>

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>CASABLANCA</i>	<i>20 Avril 2011</i>	<i>CASABLANCA - 141-03</i>	

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	D 00000000 35533411	B 11433553 00000000
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

Dr. MOUTAMID Omar



الدكتور عمر معتمد

- Medecine générale
- Echographie
- Medecin agréé par le ministère de la Santé
- Visite Médicale
- Permis de conduire

- الطبع العام
- الفحص بالصدى
- طبيب معتمد من طرف وزارة الصحة
- فحص طبى
- رخصة السياقة

Ordonnance

Casablanca, le

18 juill 2021

البيضاء

EL AINI HADDOU.

40,40

1) Detospasugl. S.V.

53,10

x 3

2) Relax. 500

58,80

x 3

3) Sedes 20 mg

146 30

LOT 201585
EXP 05/2023
PPV 52.80DH

Résidences Al Firdaousse
Groupe B1 Imm.11 Appt 1
El Oulfa - Casablanca
Tél : 05 22 93 41 31

Dr. MOUTAMID Omar
Médecin Généraliste
Echographie
Al Firdaouss Groupe B1 Imm.
Appt 1 El Oulfa - Casablanca
Tel: 05 22 93 41 31

إقامة الفردوس مجموعة B1
العنوان الشقة رقم 1 الألفة
الدار البيضاء
الهاتف 05 22 93 41 31

Dr. MOUTAMID Omar



الدكتور معتمد عمر

- Medecine générale
- Echographie
- Medecin agréé par le ministère de la Santé
- Visite Médicale
- Permis de conduire

- الطب العام
- الفحص بالصدى
- طبيب معتمد من طرف وزارة الصحة
- فحص طبي
- رخصة السياقة

Ordonnance

Casablanca, le

26 Juillet 2021

البيضاء

Dr. EL MOUTAMID RELTOM

AN 6.80 X 3
1) Capenthyl 660 mg
2) Skelatex 660 mg x 2
26.50
2) Skelatex 660 mg x 2
03 enz.
Prix 6.90
Dr. MOUTAMID Omar
Médecin Généraliste
Echographie
Al Firdauss Groupe B1 Iimm 11
Appt 1 El Oulfa - Casablanca
Tél: 05 22 93 41 31

Résidences Al Firdausse
Groupe B1 Iimm.11 Appt 1
El Oulfa - Casablanca
Tél : 05 22 93 41 31

إقامة الفردوس مجموعة B1
العمراء 11 الشقة رقم 1 الألفة
الدار البيضاء
الهاتف 05 22 93 41 31



LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé
Fenofibrate.

Veuillez lire cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez toute question, demandez plus à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

908016020

maphar
ZI Zenata Ain Sébaâ, Casablanca, Maroc
LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30
P.P.V. : 116,80 DH

6 118001 18 T636

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé lorsque d'autres médicaments [statines] sont inappropriés, afin de réduire la survenue de problèmes cardiaques chez les hommes à haut risque et dont le taux de « mauvais cholestérol » est élevé.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- insuffisance hépatique (trouble du fonctionnement du foie),
- insuffisance rénale (trouble du fonctionnement du rein),
- allergie connue au fenofibrate, à la lécithine de soja, à la cacahuète, à l'huile d'arachide ou à l'un des excipients de ce médicament,
- réactions connues de phototoxicité ou de photo-allergie (réactions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV) pendant un traitement par le fenofibrate ou un médicament de structure apparentée, en particulier kétoprofène (médicament anti-inflammatoire),
- calculs biliaires,
- pancréatites (inflammation du pancréas qui peut conduire des douleurs abdominales) sauf si la pancréatite aigüe est due à un niveau élevé de certaines graisses dans le sang,
- chez l'enfant (moins de 18 ans).

Faites attention avec LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé :

- En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin traitant (cf. rubrique "Quels sont les effets indésirables éventuels").
- Un bilan hépatique sera pratiqué avant traitement régulièrement pendant la première année de traitement (tous les 3 mois en moyenne) puis périodiquement.
- Le taux de la créatinine devra être surveillé pendant les premiers mois de traitement puis périodiquement.
- Prévenez votre médecin si vous présentez l'une des pathologies suivantes: diabète non équilibré, hypothyroïdie, syndrome néphrotique, lithiasis biliaire, si vous avez des antécédents d'atteintes musculaires, ou si vous consommez de grandes quantités d'alcool.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).



LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé
Fenofibrate.

Veuillez lire cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez toute question, demandez plus à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

908016020

maphar
ZI Zenata Ain Sébaâ, Casablanca, Maroc
LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30
P.P.V. : 116,80 DH

6 118001 18 T636

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé lorsque d'autres médicaments [statines] sont inappropriés, afin de réduire la survenue de problèmes cardiaques chez les hommes à haut risque et dont le taux de « mauvais cholestérol » est élevé.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- insuffisance hépatique (trouble du fonctionnement du foie),
- insuffisance rénale (trouble du fonctionnement du rein),
- allergie connue au fenofibrate, à la lécithine de soja, à la cacahuète, à l'huile d'arachide ou à l'un des excipients de ce médicament,
- réactions connues de phototoxicité ou de photo-allergie (réactions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV) pendant un traitement par le fenofibrate ou un médicament de structure apparentée, en particulier kétoprofène (médicament anti-inflammatoire),
- calculs biliaires,
- pancréatites (inflammation du pancréas qui peut conduire des douleurs abdominales) sauf si la pancréatite aigüe est due à un niveau élevé de certaines graisses dans le sang,
- chez l'enfant (moins de 18 ans).

Faites attention avec LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé :

- En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin traitant (cf. rubrique "Quels sont les effets indésirables éventuels").
- Un bilan hépatique sera pratiqué avant traitement régulièrement pendant la première année de traitement (tous les 3 mois en moyenne) puis périodiquement.
- Le taux de la créatinine devra être surveillé pendant les premiers mois de traitement puis périodiquement.
- Prévenez votre médecin si vous présentez l'une des pathologies suivantes: diabète non équilibré, hypothyroïdie, syndrome néphrotique, lithiasis biliaire, si vous avez des antécédents d'atteintes musculaires, ou si vous consommez de grandes quantités d'alcool.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).



LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé
Fenofibrate.

Veuillez lire cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez toute question, demandez plus à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

908016020

maphar
ZI Zenata Ain Sébaâ, Casablanca, Maroc
LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30
P.P.V. : 116,80 DH

6 118001 18 T636

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé lorsque d'autres médicaments [statines] sont inappropriés, afin de réduire la survenue de problèmes cardiaques chez les hommes à haut risque et dont le taux de « mauvais cholestérol » est élevé.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé dans les cas suivants :

- insuffisance hépatique (trouble du fonctionnement du foie),
- insuffisance rénale (trouble du fonctionnement du rein),
- allergie connue au fenofibrate, à la lécithine de soja, à la cacahuète, à l'huile d'arachide ou à l'un des excipients de ce médicament,
- réactions connues de phototoxicité ou de photo-allergie (réactions cutanées lors d'une exposition au soleil ou à la lumière artificielle UV) pendant un traitement par le fenofibrate ou un médicament de structure apparentée, en particulier kétoprofène (médicament anti-inflammatoire),
- calculs biliaires,
- pancréatites (inflammation du pancréas qui peut conduire des douleurs abdominales) sauf si la pancréatite aigüe est due à un niveau élevé de certaines graisses dans le sang,
- chez l'enfant (moins de 18 ans).

Faites attention avec LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé :

- En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin traitant (cf. rubrique "Quels sont les effets indésirables éventuels").
- Un bilan hépatique sera pratiqué avant traitement régulièrement pendant la première année de traitement (tous les 3 mois en moyenne) puis périodiquement.
- Le taux de la créatinine devra être surveillé pendant les premiers mois de traitement puis périodiquement.
- Prévenez votre médecin si vous présentez l'une des pathologies suivantes: diabète non équilibré, hypothyroïdie, syndrome néphrotique, lithiasis biliaire, si vous avez des antécédents d'atteintes musculaires, ou si vous consommez de grandes quantités d'alcool.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Meteospasmyle[®]

Capsule molle - Boîte de 20
Citrate d'alvérine et Siméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que METEOSPASMYL, capsule molle et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
- Comment prendre METEOSPASMYL, capsule molle ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver METEOSPASMYL, capsule molle ?
- Informations supplémentaires.

METEOSPASMYL
aliments, boissons
Sans objet.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de l'pendant la grossesse. Si vous découvrez c le traitement, consultez votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Vous devrez éviter de prendre ce médicament si vous allaitez. Demandez conseil à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Il est peu probable que METEOSPASMYL ait un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Toutefois, METEOSPASMYL peut provoquer des vertiges et cela peut avoir un effet sur votre aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE METEOSPASMYL, capsule molle ?

Posologie

RESERVÉE À L'ADULTE
1 capsule 2 à 3 fois par jour.

QUEST-CE QUE METEOSPASMYL,
capsule molle ET DANS QUELS CAS

6 118001 100293

c des

METEOSPASMYL® B 20 caps molles

Alvérine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg

P.P.V. : 40,40 DH

Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca



LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé
Fénofibrate.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice et conservez-la pour le pharmacien.
- Si vous avez des questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit être pris que sur ordre prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

908070A

maphar O
ZI Zenata Aïn Sebâa, Casablanca, Maroc
LIPANTHYL® 160 mg CP PEL B30

P.P.V.: 116,80 DH



6 118001 181636

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé appartient à un groupe de médicaments, appelés fibrates. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer les taux de graisses (lipides) dans le sang, comme par exemple les graisses appelées les triglycérides.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé est utilisé en complément d'un régime alimentaire pauvre en graisses et d'autres traitements non médicamenteux tels que l'exercice physique et la perte de poids afin de faire baisser les taux de graisses dans le sang.

LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé peut être utilisé lorsque d'autres médicaments [statines] sont inappropriés, afin de réduire la survenue de problèmes cardiaques chez les hommes à haut risque et dont le taux de « mauvais cholestérol » est élevé.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

Ne prenez pas ce médicament dans les cas suivants :

- insuffisance rénale sévère.
- insuffisance hépatique sévère.
- allergie connue au fentanyl, cacaïne, méthadone, méthamphétamine, médicaments contenant de la phénacetine.
- réaction allergique connue (réaction d'hypersensibilité à la lumière solaire ou aux ultraviolets), ketoacidose.
- calculs biliaires.
- pancréatite.
- des réactions d'hypersensibilité due à la sulfaméthoxazole.
- chez les personnes de moins de 18 ans.

Faites une liste des médicaments que vous prenez et conservez-la pour le pharmacien.

- En cas de grossesse, de l'allaitement ou de l'infertilité, indépendamment de l'origine.
- Un tableau régulier de vos fonctions physiques les 3 derniers mois.
- Le tableau des maladies préexistantes.
- Prévalence de maladies pathologiques, syndromes, antécédents et de grossesses.

L'utilisation de ce médicament par un patient souffrant d'intolérance lactase ou d'insuffisance hépatique est déconseillée.

Skinosalic®

Formes et présentations :

Pommade : Tube de 30g

Lotion : Flacon de 30g

Composition :

	SKINOSALIC
	Pommade
Bétaméthasone (DCI)	
dipropionate exprimé en	
bétaméthasone.....	0,05%
Acide salicylique.....	3,00%
Excipients q.s.p.....	100,0%

26,50

Propriétés :

- Skinosalic associe dans sa formule, un dermo-corticoïde Bétaméthasone et un kératolytique : l'acide salicylique.

Indications :

Dermatoses corticosensibles à composante kératosique.

- lichenification

- psoriasis

- lichen

- dermite séborrhéique à l'exception du visage.

- la forme lotion adaptée plus particulièrement au traitement des affections du cuir chevelu, des régions pileuses et des plis.

Contre indications :

- Infections bactériennes, virales, fongiques, primitives et parasitaires, même si elles comportent une composante inflammatoire.

- Lésions ulcérées

- Acné et rosacée

- Hypersensibilité à l'un des composants.

- La forme pommade n'est pas adaptée aux lésions suintantes

Effets indésirables :

- Sont à craindre en cas d'usage prolongé :

atrophie cutanée, télangiectasies, vergetures, purpura ecchymotique secondaire à l'atrophie, fragilité cutanée.

- Au visage, les corticoïdes peuvent créer une dermatite péri-orale ou bien créer ou aggraver une rosacée.

- Peut être observé un retard de cicatrisation des plaies atones, des escarres et des ulcères de jambes.

- Possibilité d'effets systémiques liés au corticoïde et/ou à l'acide salicylique.

- Ont été rapportées : éruptions acnéiformes ou pustuleuses, hypertrichose, dépigmentation.

Mises en garde et précautions d'emploi :

- Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit être recherchée.

- Chez le nourrisson et le jeune enfant, il est préférable d'éviter Skinosalic. Il faut se méfier particulièrement des phénomènes d'occlusion spontanée pouvant survenir dans les plis ou sous les culottes imperméables.

- Skinosalic n'est pas destinée à l'usage ophtalmique ni à l'application sur les paupières ou les muqueuses.

- L'utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes à activité forte expose à la survenue d'une dermite cortico-induite et paradoxalement corticosensible.

Posologie et mode d'emploi :

- Etaler doucement la pommade ou la lotion sur les lésions et faire pénétrer par un léger massage.

- Dans les affections du cuir chevelu, la lotion sera appliquée raié par raié, en dépassant largement la surface à traiter.

- Les applications seront limitées à 2 fois par jour pendant une à deux semaines, une augmentation du nombre d'applications risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.

Conservation :

A conserver à l'abri de la chaleur

Liste I

