

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educations :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0048856

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 500 Société : 80077
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : ZOHEIR ALI
Date de naissance : 23/11/45
Adresse : Résid. "Terrasses Marines" Rte Agdal
(DAR BOUZZA) Im. 2. Apt. 6
Tél. : 0661215763 Total des frais engagés : 117€ 87 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :/...../.....
Nom et prénom du malade : ZOHEIR ALI Age :
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Lithiases biliaires Interhépatiques
En cas d'accident préciser les causes et circonstances (Traitement long cours)

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le 5 / 08 / 2021
Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19-048856

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 500
Nom de l'adhérent(e) : ZOHEIR ALI
Total des frais engagés : 117€ 87
Date de dépôt : 5/08/21

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient
----------------	------------------	-------------



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	B

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX



N° 11389*05

joindre la prescription
sauf si renouvellementfeuille de soins
pharmacien ou fournisseurArt. R. 161-40 et suivants du Code de la sécurité sociale
Art. L. 212-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

numéro de facture (facultatif)

9 1 6 2 2 1 3 4

date 2 7 0 7 2 0 2 1

PERSONNE RECEVANT les SOINS et ASSURE(E)

PERSONNE RECEVANT les SOINS (la ligne "nom et prénom" est obligatoirement remplie par le pharmacien ou le fournisseur)

nom et prénom ZOHEIR Ali

(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu))

numéro d'immatriculation

date de naissance

J J M M A A A A 1

code de l'organisme de rattachement
en cas de dispense d'avance des frais
(à remplir par le pharmacien ou
le fournisseur)

ASSURE(E) (à remplir si la personne recevant les soins n'est pas l'assuré(e))

nom et prénom ZOHEIR Ali

(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (facultatif et s'il y a lieu))

numéro d'immatriculation

ADRESSE de L'ASSURE(E)

19, RUE DE TURENNES - 75004 PARIS

IDENTIFICATION du PHARMACIEN ou du FOURNISSEUR

FUNARO ERIC

IDENTIFICATION de la STRUCTURE

PHARMACIE DU MARAIS
119 RUE SAINT ANTOINE
75004 PARIS
Tel : 01.42.72.20.44
Fax : 01.42.78.34.11

=> 752035410

PHARMACIEN REMPLACANT

nom et prénom

identifiant

dispositif de coordination
de soins - réseau de santé

IDENTIFICATION du PRESCRIPTEUR et de la STRUCTURE dans laquelle il exerce

nom et prénom POUPON RAOUL

identifiant

raison sociale

n° de la structure
(AM, FINESS ou SIRET)

9 2 1 2 2 3 4 1 8

CONDITIONS de PRISE en CHARGE de la PERSONNE RECEVANT les SOINS

date de la prescription médicale

1 5 0 3 2 0 2 1

date de l'accord préalable (le cas échéant)

J J M M A A A A

MALADIE (si exonération du ticket modérateur, cochez une case de la ligne suivante)

acte conforme au protocole ALD

action de prévention

autre

SOINS dispensés au titre de l'art. L. 212-1
(cf. la notice au verso : § précédé de "s"
et les recommandations importantes)

accident causé par un tiers : non

oui

date

J J M M A A A A

AT/MP

numéro

ou

date

J J M M A A A A

PRODUITS et PRESTATIONS DELIVRES

tarification détaillée

Deliv. N°4

AMO :

0.00

AMC :

0.00

Client :

117.87

Acte	CIP	Qté	PU	Facturé	Libellé
PH7	3400932340750	12	8,76	105,12	URSOLVAN 200MG GEL B/30
HD7		12	1,02	12,24	HONORAIRE PH.
HDR		1	0,51	0,51	HONORAIRE HDR

Nbu M I Deb Loc Fin Loc

imprimer les codes à barres
ou coller les étiquettes de la liste
des produits et prestations
dans l'ordre de la prescription

PAIEMENT

MONTANT TOTAL
en euros

119 rue Saint Antoine - 75004 PARIS

Tel. 01 42 72 20 44 - Fax 01 42 78 34 11

lapharmacie@marais@gmail.com

Eric FUNARO N°752035410

1 1 7 8 7

l'assuré(e) n'a pas payé la part obligatoire

l'assuré(e) n'a pas payé la part complémentaire

X

signature du pharmacien
ou du fournisseursignature de
l'assuré(e)impossibilité
de signer

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est passible de peines financières, d'amende et/ou d'emprisonnement (articles 313-1 à 313-3, 433-19, 441-1 et suivants du Code pénal, article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale).

Les informations figurant sur cette feuille, y compris le détail des actes et des prestations servies, sont destinées à votre organisme d'assurance maladie aux fins de remboursement et de contrôle. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez obtenir la communication des informations vous concernant et, le cas échéant, leur rectification en vous adressant auprès de votre organisme d'assurance maladie.

Identification du prescripteur

Professeur Raoul Poupon

Clinique Hartmann

921223418 00 3 31 0 08

courriel : professeurpoupon@clinique-s-
pare.fr

patient

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTIION EXONERANTE)

Ma Zohair Ali
16/7/3/2020

URBOLVAN

600 mg 2 fois et soir

UV dose D3 100 000 U

1 amp / 2 mois - 3 mois

Esp 1 an



Prof R. POUPON

Facture Papier 91622132 / délivrance N°3 du 27/07/21 (15)

PH: 75 2 03541 0 : PHARMACIE DU MARAIS

MD: 92 1 22341 8 : 119 RUE SAINT ANTOINE

POUPON RAOUL : 75004 PARIS

Malade: ZOHEIR ALI (// -1)

19, RUE DE TURENNES - 75004 PARIS

RD: ..

Gt Référence	Designation	N°Ordo
--------------	-------------	--------

FV TTC Base Remb Honoraire TRD

12 3400932340750	URSOLVAN 200MG GEL B/30	119642
------------------	-------------------------	--------

8.76	8.76	1.02	0
------	------	------	---

1	HONORAIRE HDR	0.51	100
---	---------------	------	-----

Total	117.87 / RD	0.00 / RC	0.00 / Client	117.87
-------	-------------	-----------	---------------	--------

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).

Ursolvan® 200 mg, gélule

Acide ursodésoxycholique

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est ce que URSOLVAN 200 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre URSOLVAN 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver URSOLVAN 200 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE URSOLVAN 200 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05AA02

Ce médicament contient une substance qui se trouve naturellement, en petite quantité dans la bile.

Ce médicament est indiqué pour :

- dissoudre les calculs biliaires (d'un diamètre inférieur à 15 mm) formés de cholestérol,
- et pour traiter certaines maladies de longue durée affectant le foie.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans : il est utilisé pour traiter une maladie affectant les voies biliaires du foie associée à la mucoviscidose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URSOLVAN 200 mg, gélule ?

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la substance active (l'acide ursodésoxycholique) aux acides biliaires ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous souffrez d'une inflammation aiguë de la vésicule biliaire ou des voies biliaires ;
- si vous avez une obstruction des voies biliaires (blocage du cholédoque ou du canal cystique) ;
- si vous souffrez de douleurs fréquentes ressemblant à des crampes au niveau de la partie supérieure de l'abdomen (colique hépatique) ;
- si vous avez des calculs biliaires calcifiés qui sont visibles sur une radiographie ;
- si votre vésicule biliaire ne fonctionne pas correctement.

Enfants âgés de 6 ans à moins de 18 ans :

Ne prenez jamais URSOLVAN 200 mg, gélule en cas d'échec du traitement chirurgical appelé porto-entérostomie ou en l'absence de rétablissement d'un flux biliaire de bonne qualité chez les enfants ayant une maladie des voies biliaires (atrésie biliaire).