

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : [contact@mupras.com](mailto:contact@mupras.com)  
Prise en charge : [pec@mupras.com](mailto:pec@mupras.com)  
Adhésion et changement de statut : [adhesion@mupras.com](mailto:adhesion@mupras.com)

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)



## Déclaration de Maladie

N° M21- 0010014

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00479 Société : RAM  
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :  
Nom & Prénom : FANGAR AHMED  
Date de naissance : 01/01/1946  
Adresse : Résidence El Mansour Ag. 128 - Ghardi et Y. El Mansour 10137 APPG CASA  
Tél. : 0663295037 Total des frais engagés : 2900 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :   
Date de consultation : 05/08/2021  
Nom et prénom du malade : Fangar AHMED Age : 75 ans  
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
Nature de la maladie : Endocr  
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.


Fait à : Casablanca Signature de l'adhérent(e) : Le : 05/08/2021

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Signature et Cachet de l'Attestant
13/7/2021	—			
05/8/2021	G2		gratuit 300,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <p>PHARMACIE DU CROISSANT Bd. Sour Odid, Casablanca Tél: 05 22 12 02 61 06 158 79 48 00 00 34</p>	09/08/21	2110,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire de Radiologie	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	29	B350+	490 DH
	27	PC	
	21		

[illegible]

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

**Important :**

**Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan**

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
					MONTANTS DES SOINS													
					DEBUT D'EXECUTION													
					FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td><td>21433552</td></tr> <tr> <td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr> <th>D</th><th>G</th></tr> <tr> <td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr> <td>35533411</td><td>11433553</td></tr> <tr> <th colspan="2">B</th></tr> </tbody> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	<b>(Création, remont, adjonction)</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			DATE DU DEVIS														
				DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE

ET MALADIES METABOLIQUES

Diabète - Obésité - Nutrition

Cholestérol - Glandes - Stérilité

Ménopause - Andrologie

Sur rendez-vous

إلدركتور بنهيمّة ثرية

خريجة كلية الطب بتولوز

اختصاصية في أمراض الغدد

الهرمونية

السكر - التغذية - السمّة

الإضطرابات الهرمونية الجنسية

الكولسترول - العقم

بالموعد

Casablanca, le 05/8/2021

fangan AHMED

$$559,00 \times 2 = 1118,00$$

Novumia 30 flenpen

$$1415 \times 4 = 5660,00$$

$$12,90 \times 9 = 116,10$$

$$26,20 \times 3 = 78,60$$

$$4220 \times 4 = 16880$$

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

Regime 3, - 1 - 1

63,30 - 1 - 1 - 1

1 - 1 - 1



مستورد وموزع من طرف لابروفان  
21 زنقة الأوداية  
20300 الدار البيضاء

© 2017  
نوفونورديسك ش / م  
نوفوالي  
DK-2880 باوسفيرد  
الدنمارك

-- LAPROPHAN --  
PPV : 559DH00

NovoMix® 30 FlexPen®  
100U/ml

Suspension injectable  
5 stylos pré-remplis de 3ml



6 118001 121298

8-9674-73-270-1

مستورد وموزع من طرف لابروفان  
21 زنقة الأوداية  
20300 الدار البيضاء

© 2017  
نوفونورديسك ش / م  
نوفوالي  
DK-2880 باوسفيرد  
الدنمارك

-- LAPROPHAN --  
PPV : 559DH00

NovoMix® 30 FlexPen®  
100U/ml

Suspension injectable  
5 stylos pré-remplis de 3ml



6 118001 121298

8-9674-73-270-1

# Ballonyl®

Charbon activé

## Ingrédients

Charbon végétal activé (162 mg),  
gélatine, dioxyde de titane.

Confort intestinal



Favorise l'élimination des gaz

60 gélules  
Voie orale

## Conseils d'utilisation

Prendre 2 gélules avec un grand verre d'eau,  
3 fois par jour à distance des repas,  
en complément d'une alimentation variée et  
équilibrée. Renouveler les prises en fonction  
des sensibilités individuelles.

Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

Complément alimentaire n'est pas médicament.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

LOT: 210123

DLUO: 02/2024

63,30DH

# LYSOPURIC®

## ALLOPURINOL 100 mg

### PRESENTATIONS :

Comprimés dosés à 100 mg d'allopurinol : boîte de 50 ou de 100.

### COMPOSITION :

Allopurinol : ..... 100 mg.

Excipients Q.S.P. : ..... 1 comprimé

Excipient à effet notoire : lactose.

### PROPRIETES :

L'allopurinol est un inhibiteur de la formation d'acide urique par blocage compétitif de la xanthine oxydase. Il diminue l'uricémie et

l'uraturie. C'est un médicament à prendre à jeun, avant le petit déjeuner, avec un verre d'eau. Il faut continuer à suivre le

### INDICATION :

- Traitement

- Traitement

- Traitement

- Prévention

### CONTRE-INDI :

- Hypersensibilité

- Enfant de moins de 16 ans

- Allaitement

### POSOLOGIE :

La posologie usuelle est de 100 mg à 300 mg par jour soit 1 à 3 comprimés/j en fonction de l'uricémie et de l'uraturie.

Dans les hyperuricémies secondaires aux insuffisances rénales, la posologie doit être adaptée en fonction de la créatinine.

Chez les insuffisants rénaux, la posologie doit être adaptée en fonction de la créatinine.

100 à 80 ml/min : 300 mg/j - 80 à 40 ml/min : 200 mg/j - 40 à 20 ml/min : 100 mg/j

Dialyse : en cas de nécessité absolue, administrer par séance.

### MISES EN GARDE/PRECAUTIONS D'EMPLOI :

#### Mises en garde :

- L'hyperuricémie asymptomatique modérée

- En cas de réactions cutanées graves évolutives contre-indiquées.

- Le syndrome d'hypersensibilité généralisée

traitement et concerne généralement les patients dans ce cas, l'arrêt du traitement est nécessaire.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

#### Précautions d'emploi :

- Ne jamais commencer un traitement par l'allopurinol lors d'une crise aiguë de goutte.

- Chez les goutteux, la colchicine (1mg/24h) doit être systématiquement associée à l'allopurinol dans les 2 ou 3 premiers mois de traitement, afin d'éviter le déclenchement d'une crise aiguë.

- L'uricémie et l'uraturie des 24 heures seront vérifiées à intervalles réguliers.

- Chez les patients atteints de syndrome de Leish-nyhan ou de lymphome, une diurèse (boire abondamment) abondante sera assurée afin d'éviter la survenue de lithiase xanthique.

- Chez les patients atteints d'hémopathies malignes, il est recommandé de corriger l'hyperuricémie ou l'hyperuraturie existante avant d'initier le traitement par les cytotoxiques.

- Une attention particulière est recommandée chez les insuffisants rénaux en raison de la fréquence accrue des effets indésirables.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

- Grossesse : L'utilisation de l'allopurinol est déconseillée pendant la grossesse.

- Allaitement : Ce médicament passe en quantité non négligeable dans le lait maternel. Il est donc contre-indiqué en cas d'allaitement.

- Conduite et utilisation de machines : Prévenir les patients de la survenue possible de vertiges.

**EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS.**

#### EFFETS INDESIRABLES :

- Système sanguin et lymphatique : rarement modification de la formule sanguine et très rarement aplasie médullaire chez les patients à risque souffrant d'insuffisance rénale.

- Système immunitaire : risque peu fréquent de réaction d'hypersensibilité généralisée avec fièvre, éruption cutanée, polyadénopathie, atteinte hépatique et/ou rénale, hyperéosinophilie. Le syndrome d'hypersensibilité généralisée est rare et peut être fatal. Des chocs anaphylactiques ont rarement été rapportés.

- Système nerveux : très rarement, neuropathies périphériques, céphalées.

- Système auditif et labyrinthe : très rarement vertiges.

- Système gastro-intestinal : peu fréquent : douleurs gastriques, nausées, diarrhée, vomissements - généralement évités en absorbant le médicament après le repas - très rare : stomatites.

- Système hépatique : peu fréquent : hépatite, élévation des enzymes hépatiques.

- Système cutané et sous-cutané : fréquent : éruptions et prurit, rougeurs, vésicules, syndrome Stevens-Johnson ou de Lyell (rarement). Arrêter immédiatement le traitement dans ce cas. Très rare : alopecie.

- Système musculo-squelettique : accès de goutte en début de traitement.

- Système génital : très rare : gynécomastie.

**TOUT EFFET INDESIRABLE SURVENU LORS DU TRAITEMENT DOIT ETRE SIGNALÉ AU MEDECIN TRAITANT OU AU PHARMACIEN.**

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Déconseillées : Vidarabine, Azathioprine, Didanosine.

Nécessitant des précautions d'emploi : Anticoagulants oraux, Chlorpropamide, Théophylline (et par extrapolation, aminophylline).

A prendre en compte : Pénicillines A : risque accru de réactions cutanées.

**CONSERVATION :** Conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

**DELIVRANCE :** Liste I - uniquement sur ordonnance.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/ 50 : AMM N° : 175 DMP/21/EXP.

LYSOPURIC® comprimés 100 mg Bte/100 : AMM N° : PH 569.

Révision : janvier 2012



**LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA**  
Z.I. Ouled Saleh - Casablanca - Maroc

Imp. Ajdr  
NLYC09VFA01

12,90

12,90

12,90

12,90

Veu  
méd

12,90

12,90

12,90

12,90

12,90

مدير لعلاج  
التي قد تؤثر على تركيز إيراديا في  
فضاف في أداء وظائف الكلى  
بين دولتينجرافير رانولازين. ترميز  
ينيب و أولابارب.  
إيراديا LP قرص بتحرير تمتد مع  
نوب الاستهلاك المفرط للكحول  
من خطر الإصابة بالحماض  
بات الاستعمال.

نمال خلال فترتي الحمل والإرضاع  
تناول إيراديا من قبل النساء الحوامل والرضعات.  
يري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.  
التركيبات واستعمال الآلات :

عمال إيراديا في العلاج بمره لا يسبب نقص سكر الدم (أعراض  
السكر في الدم مثل الشعور بالضعف، ارتباك، زيادة التعرق)  
في فهو لا يؤثر على قدرتك على القيادة أو استعمال الآلات.  
إذا ما تم استعمال إيراديا بالتزامن مع أدوية أخرى لعلاج مرض  
ي قد يسبب نقص سكر الدم. وفي هذه الحالة يجب عليكم  
تخثر الشدبد عند القيادة أو استعمال الآلات.

تناول إيراديا LP قرص بتحرير تمتد ؟

ف طبيبيكم استعمال إيراديا بمره أو بالإشتراك مع أدوية أخرى  
مرض السكري عن طريق الفم أو مع الأنسولين.  
دائماً إيراديا تماماً حسب إرشادات طبيبيكم للعلاج  
الاستينضاح من طبيبيكم أو الصيدلاني في حالة الشك.  
لع الأقراص كاملة مع كوب من الماء. لا تقوموا بمضغ الأقراص.  
الموصى بها

علاج عادة بجرعة مقدارها 500 ملغ من إيراديا مرة واحدة في  
بعد أسبوعين تقريباً من تناول إيراديا قد يقوم الطبيب بقياس  
ي السكر في الدم لضبط الجرعة.  
اليومية القصوى هي 2000 ملغ من إيراديا  
تم تعانون من ضعف في وظائف الكلى. قد يصف لكم طبيبيكم  
أول.

حرير تمتد وماهي دواعي استعماله؟  
ب معرفتها قبل تناول إيراديا LP قرص بتحرير

قرص بتحرير تمتد ؟  
ة المحتملة؟

إيراديا LP قرص بتحرير تمتد ؟

رص بتحرير تمتد وماهي دواعي استعماله ؟

بتحرير تمتد على الميتفورمين. وهو دواء يستعمل  
ري من النمط الثاني (السكري غير المعتمد على  
لي مجموعة من الأدوية تسمى البيغوانيد.  
لاشتراك مع النظام الغذائي وممارسة التمارين  
لحد من خطر الإصابة بمرض السكري من النمط  
الذين يعانون من زيادة في الوزن. وذلك عندما يكون  
ع وممارسة التمارين الرياضية لمدة 3 إلى 6 أشهر غير  
ستويات السكر في الدم. يزيد خطر الإصابة بمرض  
الثاني إذا كانت لديكم عوامل أخرى مثل ارتفاع  
نم فوق سن الأربعين. إذا كنتم تعانون من وجود  
من الدهون في الدم. أو لديكم تاريخ مرضي من  
ي خلال فترة الحمل.  
ناصة لدى المرضى تحت سن الخامسة والأربعين.  
من زيادة في الوزن. المرضى الذين يعانون من ارتفاع  
حم بعد تناول وجبات الطعام. أو لدى المرضى الذين  
سكري أثناء الحمل.  
ج مرض السكري من النمط 2 عندما لا يسمح  
سة الرياضة وحدهما للسيطرة على مستويات  
سكر. الأنسولين هو هرمون يسمح لخلايا الجسم  
واجد بالدم لإنتاج الطاقة أو تخزينه لإستخدامه لاحقاً.

نما هو  
5. Cor  
prolong  
قد يسبب  
6. Cont  
بين كل 90

1. QU  
الانظروا اف  
توقفوا ع  
prolon

IPRAD  
مستشفى  
metfor  
إيراديا  
type II  
نها 10  
médica  
كل 10000  
IPRADI  
et de l'  
بطيبي  
تزد الآثار  
les adja  
l'exerci  
la glyc  
le diab  
l'hypert  
انضطراب  
anorma  
البطن  
تونقوا ع  
de diab  
Le méd  
أسبوعين  
de 45 a

مع وجبات  
الأعراض  
IPRAD  
l'arsque  
بين كل 10  
شخص  
glycém  
tiisus c  
اضطراب  
l'énergie

الأعراض  
IPRAD  
l'arsque  
بين كل 10  
شخص  
glycém  
tiisus c  
اضطراب  
l'énergie



# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيما  
◆ Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيما  
◆ Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيما  
◆ Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20



# CALCIFIX®

CALCIUM + VITAMINE



سوطيما  
◆ Sothema

Fabriqué par les Laboratoires SOTHEMA  
B.P. N°1, 27182 Bouskoura - Maroc  
L. TAZI, Pharmacien Responsable

42,20

0,5 ملغ

90 قرصا

عن طريق الفم



تليينورم<sup>®</sup>  
ريباكليينيد

LOT 202915 2

EXP 12 2022

PPV 141.50 DH



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
بعد	قبل	مساء	منتصف النهار	صباح	المدة









**DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE ☒**

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Dr. Benitina Touric

Certifie que Mlle, Mme, M. :

M. Farhan AHMED

Présente

DIO + HTA + Néphropathie

Nécessitant un traitement d'une durée de :

3 mois

Dont ci-joint ordonnance :

(à défaut noter le traitement prescrit)



# Docteur Benhima Touria

Diplômée de la Faculté de Médecine de Toulouse

**SPECIALISTE EN ENDOCRINOLOGIE  
ET MALADIES METABOLIQUES**

Diabète - Nutrition - Obésité  
Cholestérol - Glandes - Stérilité

**Sur Rendez-vous**

## SANG

- ☒ Glycémie
- |               |    |
|---------------|----|
| • à jeûn = 8h | J1 |
| • pp 2h = 10h | J2 |
| • pp 4h = 12h | J3 |
| • pp 2h = 15h | J3 |
| • pp 4h = 16h | J4 |
| • pp 2h = 22h | J1 |
- ☐ **HGPO (75G) toutes les demi - heures** sur deux heures  
à 8h à jeûn J1

- ☒ Hb A1 C
- ☒ Fructosamine
- ☒ Urée
- ☒ Créatinine
- ☒ Débit de filtration glomérulaire (MDRD) - eGFR
- ☒ Acide urique

- ☐ Cholestérol Total
- ☐ C.HDL - LDL
- ☐ Triglycérides
- ☐ Ionogramme sanguin - Kaliémie
- ☐ Calcémie - Phosphorémie - 25 OH D (2+3)
- ☐ Phosphatases alcalines
- ☐ Magnésium sérique et globulaire
- ☐ NFS - Plaquettes
- ☐ VS - C.R.P
- ☐ Groupage

- ☐ Fer sérique - Ferritine
- ☐ Electrophorèse des protides
- ☐ Temps de Céphaline Kaolin
- ☐ Fibrinémie
- ☐ Transaminases - C.P.K
- ☐ GGT

- ☐ Taux de Prothrombine
- ☐ AG - HBs
- ☐ AC - Anti HBs
- ☐ AC - Anti HBc
- ☐ AC - Anti HCV
- ☐ Bilirubine
- ☐ Amylasémie - Lipasémie
- ☐ AC antiendomysium
- ☐ AC antigliadine
- ☐ AC Anti Transglutaminases
- ☐ Latex Xaler Rose
- ☐ ACAN

Dr. Benhima Touria  
Endocrinologue, Métabolisme  
FANCIAD ALGER  
70, Rue Félix et Max Guedj, Casablanca  
Tél: 05 22 29 83 54 / 05 22 29 84 50

- ☐ PTH intacte
- ☐ TSH.US - T4L - T3L
- ☐ ACAT : anti Tg et anti TPO.
- ☐ AC antirécepteurs de la TSH
- ☐ Thyroglobuline - Thyrocalcitonine
- ☐ Cortisol de 8 h - de 16 h
- ☐ ACTH - ARP
- ☐ Aldostéronémie
- ☐ FSH - LH
- ☐ Oestradiol - Progestérone - 17 OHP
- ☐  $\Delta 4$  - androstène dione
- ☐ SDHA
- ☐ Testostéronémie
- ☐ PRL à 8h à jeûn (après 20 mn allongé(e))
- ☐ GH - I.G.F1
- ☐ Stimulation GH / Insuline
- ☐ Stimulation GH / Glucagon
- ☐ Stimulation GH / L dopa
- ☐ AC. anti HIV
- ☐ PSA totale
- ☐ ACE
- ☐  $\alpha$ FP
- ☐

## URINES

- ☐ ECU ± antibiogramme - Compte d'Addis
- ☐ Micro - albuminurie (échantillon)
- ☐ RAC=  $\frac{\text{micro albuminurie}}{\text{créatinurie}}$  (sur échantillon)
- ☐ Glycosurie / 24 H
- ☐ Protéinurie / 24 H
- ☐ Clearance de la créatinine / 24 heure corrigée
- ☐ Cortisol libre / 24 H
- ☐ 17 Céto - 17 OH / 24H
- ☐ Calciurie / 24H
- ☐ Phosphatiurie / 24 H
- ☐ Métanéphrine- Normétanéphrine / 24H
- ☐ V.M.A. / 24H
- ☐ Aldostéronurie / 24H

## SELLES

- ☐ Hélicobacter pylori
- ☐ Coprologie et parasitologie
- ☐ Recherche de sang

## AUTRES

- ☐ Frottis cervico-vaginal
- ☐ Spermogramme ± Culture
- ☐ ECB vaginal ± Culture
- ☐ IDR à 10 u. tuberculine
- ☐ Recherche de BK : ED ± Culture

INP : 093001980  
IF : 706552  
ICE : 001654761000041

## FACTURE

Casablanca le 19-07-2021

**MUPRAS**  
**Mr Ahmed FANGAR**  
**Prescripteur : Dr Touria BENHIMA**

Demande N° 2107190025

Analyses :

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E22	E
0100	Acide urique	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0117	Fructosamine	B80	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0135	Urée	B30	B
0448	Debit de Filtration Glomérulaire DFG	B50	B

Total des B : 350

TOTAL DOSSIER : 490.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de quatre cent quatre-vingt-dix dirhams

**Dr Nouredine LOUANJLI**

مختبر التحاليل الطبية لبوماك  
Laboratoire d'Analyses Médicales  
LABOMAC  
Dr. LOUANJLI Nouredine - Biologiste  
40, Rue Prince Moulay Abdellah - Casa  
Tél.: 0522.20.74.22 / 22.14.05 - Fax: 0522.26.83.03

Prélèvement à Domicile Tél. : 06 77 06 70 95

40, Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P. 20.080 رب - محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء  
Tél : 05.22.47.33.83/05.22.20.74.22/05.22.29.77.06/05.22.22.14.95/06.61.06.15.99/06.61.06.35.99/Fax : 05.22.26.83.03  
e-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. رب - محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000



Date du prélèvement : 19-07-2021 à 07:40  
Code patient : 1906110020  
Né(e) le : 01-01-1946 (75 ans)

**Mr Ahmed FANGAR**  
Dossier N° : 2107190025  
Prescripteur : Dr Touria BENHIMA



## BIOCHIMIE SANGUINE


### Glycémie à jeûn

(Hexokinase G6PD-H - Roche Diagnostics Cobas)

1.05 g/L (0.70-1.10)  
5.83 mmol/L (3.89-6.11)

27-04-2021

1.47




### Hémoglobine glyquée par HPLC

(Tosoh G8-HPLC)

7.4 % (4.0-6.0)

27-04-2021

8.3



### Les pièges de l'HbA1c:

#### 1- Les situations qui surestiment le dosage de l'HbA1c :

Hypertriglycéridémie, insuffisance rénale/hyperurémie (Hb carbamylée), déficit en fer (anémies), vitamine b12, folates, splénectomie, abus d'opiacés, d'alcool ou d'acide acétylsalicylique, hyperbilirubinémie, présence d'hémoglobine foetale HbF (thalassémie).

#### 2- Les situations qui sous-estiment le dosage de l'HbA1c :

Vitamines C et E, maladie hépatique chronique, hémodialyse, hémolyse, transfusion sanguine, présence d'HbS et C (facilement dépistées grâce au dosage par HPLC), splénomégalie, médicaments : dapson, antiviraux, interféron, fer, EPO et grossesse.


### Fructosamine

(Technique colorimétrique Cobas Roche Diagnostic)

257 µmol/L (205-285)

27-04-2021

276



Validé par : Dr Nouredine LOUANJLI

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب. 40

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000

**Date du prélèvement** : 19-07-2021 à 07:40  
**Code patient** : 1906110020  
**Né(e) le** : 01-01-1946 (75 ans)

**Mr Ahmed FANGAR**  
**Dossier N°** : 2107190025  
**Prescripteur** : Dr Touria BENHIMA

**Urée**

(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)

**0.55** g/L (0.10-0.50) 0.67  
**9.10** mmol/L (1.67-8.33)

**Créatinine**

(Dosage cinétique - Roche Diagnostics Cobas)

**14.8** mg/L (5.0-13.0) 13.7  
**131.0** µmol/L (44.3-115.1)

"Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge, du sexe, état physiologique du patient(e)"  
Au cours de l'IR( aiguë ou chronique), la créatininémie (Cr) peut rester longtemps dans les fourchettes des valeurs usuelles alors que le D.F.G est très diminué. Pour cette raison, l'ANAES recommande que l'estimation du D.F.G soit associée à chaque dosage du Cr.

**ESTIMATION DU DEBIT DE FILTRATION GLOMERULAIRE - DFG**

**Créatinine**

**14.8** mg/L 13.7  
**131** µmol/L

**Clairance calculée selon Cockcroft :**

Cockcroft-Gault

**46** mL/min/1.73m<sup>2</sup> (>90) 49

**Clairance calculée selon MDRD :**

Modification of Diet in Renal Disease

**49** mL/min/1.73m<sup>2</sup> (>90) 54

**Clairance calculée selon CKD-EPI :**

Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration

**46** mL/min/1.73m<sup>2</sup> (>90) 50

Les valeurs de D.F.G exprimées en mL/min/1.73 m<sup>2</sup> et estimées selon CKD-EPI apportent une amélioration par rapport à la formule MDRD-4 (notamment pour les valeurs de DFG>60 où l'équation MDRD sous-estime les valeurs)

Limite des formules de calcul: enfants, femmes enceintes, âge supérieur à 75 ans, patients obèses ou très maigres, cirrhose décompensée, dénutrition, augmentation ou diminution de la masse musculaire, médicaments nephrotoxiques. Dans ces cas-ci, une clairance sur urines de 24 heures est préférable.

**Acide Urique**

(Dosage enzymatique - Roche Diagnostics Cobas)

**55** mg/L (35-70) 47  
**0.33** mmol/L (0.21-0.42)

Validé par : **Dr Nouredine LOUANJLI**

Prélèvements à Domicile Tél.: 06 54 35 63 47 / 06 77 06 70 95

40.Rue Prince Moulay Abdellah - Casablanca C.P.20.080. رب. محج الأمير مولاي عبد الله - الدار البيضاء - ر.ب.

Tél.: 05 22 47 33 83 / 05 22 20 74 22 / 05 22 29 77 06 / 05 22 22 14 95 / 05 22 47 40 58 - Fax : 05 22 26 83 03

E-mail : labomac1@gmail.com / n.louanjli@gmail.com - site internet : www.labomac.ma

CNSS : 2102391 / ICE : 001654761000041 / Patente : 33202488 / IF : 41502000