

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

Le radio-après soins est obligatoire, en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Information	: contact@mupras.com
en charge	: pec@mupras.com
ession et changement de statut	: adhesion@mupras.com

La mutuelle garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 07724 Société : RAAH 80180

Actif  Pensionné(e)  Autre :

Nom & Prénom : BOUJAMAA Jilali

Date de naissance : 01/01/1957

Adresse : ESSAâDA I N°6 Sidi HADDOUI Sidi Maârouf

20190 Casablanca

Tél. : 0666824145 Total des frais engagés : 363,4 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. KHADRAOUI Mohammed Rachid Cachet du médecin

Spécialiste en médecine de sport 1<sup>er</sup> Etg 137, Lotissement Haddoui Sidi Maârouf

Casablanca GSM : 0678216720 Date de consultation : 04/08/2021

Nom et prénom du malade : BOUJAMAA Jilali Age : 64 ans

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : HTA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

Autorisation CNPD N° : AIA-215 / 2019

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 04/08/2021

Signature de l'adhérent(e) :



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
04/08/2021	C	1	110 DH	Dr. KHADRAOUI مختار احمد راشد Spécialiste en médecine de sport Elg 137 Loyerement Haddouli Sidi Casablanca GSM : 0679

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien, ou du Fourmeleur	Date	Montant de la Facture
 Pharmacie Bazwia Maarrow N° 262 Casablanca 032297.27.10/052297.23.63	11/8/92	320110

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

## Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'OD.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS		VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT		

## Docteur KHADRAOUI Mohammed Rachid

- Spécialiste en Médecine du sport de l'université de NICE-SOPHIA ANTIPOLE (France)
- Diplôme de l'université d'Échographie Clinique de l'université de Montpellier (France)
- Expert Médical : D.I.U. de Médecine légale et Réparation Juridique RENNES (France)
- Auprès des Tribunaux Marocains
- Autorisé par le Ministère de la Santé pour délivrer les certificats de conduite automobile toutes catégories

## الدكتور الخضراوي محمد رشيد

- متخصص في الطب الرياضي من جامعة نيس صوفيا أنطليون (فرنسا)
- الفحص بالصدى من جامعة مونبولي (فرنسا)
- خبير في الطب الشرعي من جامعة زين (فرنسا) ومحلل لدى المحاكم المغربية.
- طبيب معتمد من طرف وزارة الصحة لتسليم الشهادات الطبية الخاصة بربخمن السباق جميع الفئات

106,70x3

2/ CØ Nidgaa 50/12,r

320,15 29/1/3 mar

Cash le 04/08/2022

Bous JANAAN Tilleli

Casablanca

678

678

678

678

<div data-bbox

# CO-MEDZAR® 50/12.5mg et 100/25mg;

Comprimé pelliculé

Boîte de 30

Losartan potassium et hydrochlorothiazide

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice médicinale ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que CO-MEDZAR® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CO-MEDZAR® ?
3. Comment utiliser CO-MEDZAR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CO-MEDZAR® ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE CO-MEDZAR® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

**CO-MEDZAR®** est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (Losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la parole des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le Losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

### Indications thérapeutiques

**CO-MEDZAR®** est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CO-MEDZAR® ?

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications

##### Ne prenez jamais CO-MEDZAR® :

- Si vous êtes allergique au Losartan, à l'Hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Informations Supplémentaires).
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamique (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibactériens tels que le cotrimoxazole), si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous avez un taux faible de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre CO-MEDZAR® en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

##### Faites attention avec CO-MEDZAR® :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre CO-MEDZAR®.

Veuillez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

**CO-MEDZAR®** est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse").

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre CO-MEDZAR®.

• Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,

• Si vous prenez des diurétiques,

• Si vous faites un régime sans sel,

• Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,

• Si vous avez une insuffisance cardiaque,

• Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique "Ne prenez jamais CO-MEDZAR®").

• Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,

• Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'ancre de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),

• Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),

• Si vous êtes diabétique,

• Si vous avez de la goutte,

• Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),

• Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium,

• Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou si vous allez faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez CO-MEDZAR® et de l'hydrochlorothiazide,

• Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostéronne suite à une anomalie des glandes surrénales),

• Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren,

#### Enfants et adolescents

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de CO-MEDZAR® chez les enfants. Par conséquent, CO-MEDZAR® ne doit pas être donné aux enfants.

Interactions avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans CO-MEDZAR® peuvent interagir avec d'autres médicaments.

106,70

environ 0.70.

Dès quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent neutraliser CO-MEDZAR® peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Interactions avec les produits de physiothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

##### Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous prenez cette (ou toute autre) forme de CO-MEDZAR® avant d'être enceinte et recommandera de prendre un autre médicament à la place de CO-MEDZAR®. CO-MEDZAR® marche tout aussi bien et est tout aussi bien toléré par les femmes enceintes. La plupart des patients plus âgés ont besoin de la même dose que les adultes.

##### Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter et votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous le souhaitez.

#### Utilisation chez les personnes âgées

CO-MEDZAR® marche tout aussi bien et est tout aussi bien toléré par les personnes âgées. La plupart des patients plus âgés ont besoin de la même dose que les adultes.

#### Spécificité

Le diurétique contenu dans ce médicament peut induire une réaction d'effet secondaire.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, vous ne devez pas conduire une voiture ou l'utilisation de machines dangereuses.

#### Liste des excipients à effet notable

Informations importantes concernant certains composants de CO-MEDZAR® contient du lactose.

#### 3. COMMENT PRENDRE CO-MEDZAR® ?

##### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

#### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration

##### Posologie

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien au cas de dosage. Votre médecin connaît de votre état et si vous prenez d'autres médicaments, il est important de vous en informer. Veuillez à toujours prendre ce médicament que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre état.

##### Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est d'en prendre une dose quotidienne de 12.5 mg ou 25 mg. La dose peut être augmentée jusqu'à 25 mg par jour.

Le dose maximale par jour est de 2 comprimés par jour, soit 50 mg/12.5 mg, comprimé pelliculé ou comprimé à libération prolongée.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé que vous en aviez été prescrit, vous devez immédiatement consulter votre médecin ou un service d'urgence. Vous devrez également provoquer une chute de la pression sanguine, des palpitations, un mal de tête et une déshydratation.

Instructions en cas d'émision d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé:

Essayez de prendre CO-MEDZAR® quotidiennement tel que prescrit, de dosse double et prenez la dose suivante au moment habituel le lendemain.

#### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

##### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'agir de manière indésirable. Veuillez à ressentir tout malaise, arrêtez de prendre CO-MEDZAR® et allez à l'urgence de l'hôpital le plus proche.

• Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, perte d'appétit, diarrhée, etc.)

C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'1 personne sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin

# CO-MEDZAR® 50/12.5mg et 100/25mg;

Comprimé pelliculé

Boîte de 30

Losartan potassium et hydrochlorothiazide

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice médicinale ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que CO-MEDZAR® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CO-MEDZAR® ?
3. Comment utiliser CO-MEDZAR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CO-MEDZAR® ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE CO-MEDZAR® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

**CO-MEDZAR®** est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (Losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la parole des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le Losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

### Indications thérapeutiques

**CO-MEDZAR®** est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CO-MEDZAR® ?

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications

##### Ne prenez jamais CO-MEDZAR® :

- Si vous êtes allergique au Losartan, à l'Hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Informations Supplémentaires).
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamique (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibactériens tels que le cotrimoxazole), si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous avez un taux faible de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre CO-MEDZAR® en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

##### Faites attention avec CO-MEDZAR® :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre CO-MEDZAR®.

Veuillez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

**CO-MEDZAR®** est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse").

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre CO-MEDZAR®.

• Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,

• Si vous prenez des diurétiques,

• Si vous faites un régime sans sel,

• Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,

• Si vous avez une insuffisance cardiaque,

• Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique "Ne prenez jamais CO-MEDZAR®").

• Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,

• Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'ancre de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),

• Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),

• Si vous êtes diabétique,

• Si vous avez de la goutte,

• Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),

• Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium,

• Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou si vous allez faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez CO-MEDZAR® et de l'hydrochlorothiazide,

• Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostéronne suite à une anomalie des glandes surrénales),

• Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren,

#### Enfants et adolescents

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de CO-MEDZAR® chez les enfants. Par conséquent, CO-MEDZAR® ne doit pas être donné aux enfants.

Interactions avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans CO-MEDZAR® peuvent interagir avec d'autres médicaments.

106,70

environ 0.70.

Dès quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent neutraliser CO-MEDZAR® peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Interactions avec les produits de physiothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

##### Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous prenez cette (ou toute autre) forme de CO-MEDZAR® avant d'être enceinte et recommandera de prendre un autre médicament à la place de CO-MEDZAR®. CO-MEDZAR® marche tout aussi bien et est tout aussi bien toléré par les femmes enceintes. La plupart des patients plus âgés ont besoin de la même dose que les adultes.

##### Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter et votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous le souhaitez.

#### Utilisation chez les personnes âgées

CO-MEDZAR® marche tout aussi bien et est tout aussi bien toléré par les personnes âgées. La plupart des patients plus âgés ont besoin de la même dose que les adultes.

#### Spécificité

Le diurétique contenu dans ce médicament peut induire une réaction d'effet secondaire.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, vous ne devez pas conduire une voiture ou l'utilisation de machines dangereuses.

#### Liste des excipients à effet notable

Informations importantes concernant certains composants de CO-MEDZAR® contient du lactose.

#### 3. COMMENT PRENDRE CO-MEDZAR® ?

##### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

#### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration

##### Posologie

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien au cas de dosage. Votre médecin connaît de votre état et si vous prenez d'autres médicaments, il est important de vous en informer. Veuillez à toujours prendre ce médicament que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre état.

##### Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est d'en prendre une dose quotidienne de 12.5 mg ou 25 mg. La dose peut être augmentée jusqu'à 25 mg par jour.

Le dose maximale par jour est de 2 comprimés par jour, soit 50 mg/12.5 mg, comprimé pelliculé ou comprimé à libération prolongée.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé que vous en aviez été prescrit, vous devez immédiatement consulter votre médecin ou un service d'urgence. Vous devrez également provoquer une chute de la pression sanguine, des palpitations, un mal de tête et une déshydratation.

Instructions en cas d'émision d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé:

Essayez de prendre CO-MEDZAR® quotidiennement tel que prescrit, de dosse double et prenez la dose suivante au moment habituel le lendemain.

#### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

##### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'agir de manière indésirable. Veuillez à ressentir tout malaise, arrêtez de prendre CO-MEDZAR® et allez à l'urgence de l'hôpital le plus proche.

• Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, perte d'appétit, diarrhée, etc.)

C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'1 personne sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin

# CO-MEDZAR® 50/12.5mg et 100/25mg;

Comprimé pelliculé

Boîte de 30

Losartan potassium et hydrochlorothiazide

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice médicinale ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que CO-MEDZAR® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CO-MEDZAR® ?
3. Comment utiliser CO-MEDZAR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CO-MEDZAR® ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE CO-MEDZAR® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

### Classe pharmacothérapeutique :

**CO-MEDZAR®** est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (Losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la parole des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le Losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

### Indications thérapeutiques

**CO-MEDZAR®** est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CO-MEDZAR® ?

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications

##### Ne prenez jamais CO-MEDZAR® :

- Si vous êtes allergique au Losartan, à l'Hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (cf. Informations Supplémentaires).
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamique (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibactériens tels que le cotrimoxazole), si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous avez un taux faible de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre CO-MEDZAR® en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

##### Faites attention avec CO-MEDZAR® :

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre CO-MEDZAR®.

Veuillez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

**CO-MEDZAR®** est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique "Grossesse").

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre CO-MEDZAR®.

• Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,

• Si vous prenez des diurétiques,

• Si vous faites un régime sans sel,

• Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,

• Si vous avez une insuffisance cardiaque,

• Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique "Ne prenez jamais CO-MEDZAR®").

• Si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,

• Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'ancre de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),

• Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),

• Si vous êtes diabétique,

• Si vous avez de la goutte,

• Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),

• Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium,

• Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou si vous allez faire des tests pour vérifier votre fonction parathyroïdienne, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez CO-MEDZAR® et de l'hydrochlorothiazide,

• Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostéronne suite à une anomalie des glandes surrénales),

• Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren,

#### Enfants et adolescents

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de CO-MEDZAR® chez les enfants. Par conséquent, CO-MEDZAR® ne doit pas être donné aux enfants.

Interactions avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans CO-MEDZAR® peuvent interagir avec d'autres médicaments.

106,70

environ 0.70.

Dès quantités excessives de sel dans l'alimentation peuvent neutraliser CO-MEDZAR® peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Interactions avec les produits de physiothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

##### Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous prenez cette (ou toute autre) forme de CO-MEDZAR® avant d'être enceinte et recommandera de prendre un autre médicament à la place de CO-MEDZAR®. CO-MEDZAR® marche tout aussi bien et est tout aussi bien toléré par les femmes enceintes. La plupart des patients plus âgés ont besoin de la même dose que les adultes.

##### Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter et votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous le souhaitez.

#### Utilisation chez les personnes âgées

CO-MEDZAR® marche tout aussi bien et est tout aussi bien toléré par les personnes âgées. La plupart des patients plus âgés ont besoin de la même dose que les adultes.

#### Spécificité

Le diurétique contenu dans ce médicament peut induire une réaction d'effet secondaire.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, vous ne devez pas conduire une voiture ou l'utilisation de machines dangereuses.

#### Liste des excipients à effet notable

Informations importantes concernant certains composants de CO-MEDZAR® contient du lactose.

#### 3. COMMENT PRENDRE CO-MEDZAR® ?

##### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

#### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration

##### Posologie

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de votre médecin ou de votre pharmacien au cas de dosage. Votre médecin connaît de votre état et si vous prenez d'autres médicaments, il est important de vous en informer. Veuillez à toujours prendre ce médicament que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre état.

##### Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est d'en prendre une dose quotidienne de 12.5 mg ou 25 mg. La dose peut être augmentée jusqu'à 25 mg par jour.

Le dose maximale par jour est de 2 comprimés par jour, soit 50 mg/12.5 mg, comprimé pelliculé ou comprimé à libération prolongée.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé que vous en aviez été prescrit, vous devez immédiatement consulter votre médecin ou un service d'urgence. Vous devrez également provoquer une chute de la pression sanguine, des palpitations, un mal de tête et une déshydratation.

Instructions en cas d'émision d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre CO-MEDZAR®, comprimé pelliculé:

Essayez de prendre CO-MEDZAR® quotidiennement tel que prescrit, de dosse double et prenez la dose suivante au moment habituel le lendemain.

#### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

##### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'agir de manière indésirable. Veuillez à ressentir tout malaise, arrêtez de prendre CO-MEDZAR® et allez à l'urgence de l'hôpital le plus proche.

• Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, perte d'appétit, diarrhée, etc.)

C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'1 personne sur 10 000 mais moins d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin