

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- La cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- ☐ Réclamation : contact@mupras.com
- ☐ Prise en charge : pec@mupras.com
- ☐ Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



N° M21- 068295 63

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6617 Société : RAM 80420

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : Benasmani RZZM

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés :

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'avis du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. J'ai pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° M21- 68295

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

conditions générales

POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes

- C = Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
 CS = Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
 CNPSY = Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
 V = Visite de jour au domicile du malade par le médecin
 VN = Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
 VD = Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
 VD = Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
 PC = Acte de pratique médicale courante et de petite chirurgie
 K = Actes de chirurgie et de spécialités

- SF = Actes pratiques par la sage femme et relevant de sa compétence
 SFI = Soins infirmiers pratiques par la sage femme
 AMM = Actes pratiques par le masseur ou le kinésithérapeute
 AMI = Actes pratiques par l'infirmier ou l'infirmière
 AP = Actes pratiques par un Orthophoniste
 AMY = Actes pratiques par un aide-orthophoniste
 R - Z = Electro - Radiologie
 B = Analyses

POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que, si après avis du contrôleur médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord ou de présenter ses observations.

Le bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

LES ACTES SOUMIS A ACCORD PREALABLE

- L'HOSPITALISATION EN CLINIQUE
- L'HOSPITALISATION EN HOPITAL
- L'HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU PREVENTORIUM
- SEJOUR EN MAISON DE REPOS
- LES ACTES EFFECTUES EN SERIE, il s'agit d'actes répétés en plusieurs séances ou actes globaux comportant un ou plusieurs actes échelonnés dans le temps.
- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES
- L'ORTHOPEDIE
- LA REEDUCATION
- LES ACCOUCHEMENTS
- LES CURES THERMALES
- LA CIRCONCISION
- LE TRANSPORT EN AMBULANCE.

EN CAS D'URGENCE

Les actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit prévenir dans les 24 heures le service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

DATE DE DEPOT

AEROPORT CASA ANFA
CASABLANCA
TEL : 91.26.46/2648/2649/2857/2
FAX : 91.26.52
TELEX : 3998 MUT
E-mail: mupras@RoyalAirMaroc

FEUILLE DE SOINS N° 0176312

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom & Prénom: Bensmane AZZEDINE
 Matricule: 6617 Fonction: Retraite Poste:
 Adresse: 6, Rue IBN HASSEN APT N° 11 AGDAL / RA
 Tél.: 06 48 34 04 12 Signature Adhérent:

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient: HADDAD SOUMA Age: 1 | 4 | 0 | 4 | 6
 Lien de Parenté avec l'adhérent: Adhérent ☐ Conjoint ☒ Enfant ☐
 Date de la première visite du médecin:
 Nature de la maladie: Hypertension post chirurgie
 S'il s'agit d'un accident: Causes et circonstances
 A: le 20/07/2011 Signature et cachet du médecin
 Durée d'utilisation 3 mois

VOLET ADHERENT

DECLARATION
 Matricule N°:
 Nom du patient:
 Date de dépôt:
 Montant engagé
 Nombre de pièces jointes:

N° 0176312



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

des	Natures des actes	Nombre et coefficient	Montant détaillé des honoraires	Cachet et signature du médecin attestant le paiement des actes
07/24		C	3000	M

EXECUTION DES ORDONNANCES

et du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la facture
Dr. F. HAJAR Spécialiste Diabète et 5, Rue Oued El Agdal - Rabat - Tél: 05 37 68 05 57	20/7/24	74,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

et signature du toire et du Radiologue	Date	Désignation des coefficients	Montant des honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

et signature du praticien	Dates des soins	Nombre				Montant détaillé des honoraires
		AM	PC	IM	IV	


VOLET ADHERENT

entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés Mutuelle.

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Important : Veuillez joindre les Radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES	Dents traitées	Nature des Soins	Coefficient
			

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANT DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																			
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	H		G	25533412	21433552		00000000	00000000		00000000	00000000		35533411	11433553		B			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H		G																	
	25533412	21433552																		
	00000000	00000000																		
	00000000	00000000																		
	35533411	11433553																		
	B																			
	(Création, remont, adjonction)	MONTANT DES SOINS																		
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	DATE DU DEVIS																		

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

7862160336



6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

7862160336



6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

7862160336



6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH

7862160335



6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH

7862160335

HADDON SORAYA

1/ Lebdlux 50
3x13,40 up 8 je

2/ Lebdlux 25
5x6,80 up 14/15 je
74,20

Allo

PHARMACIE IBN HAJAR
4, Rue Ibn Hajar Agdal-Rabat
Tél: 05 37 69 06 87

شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج و علامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج .

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكسين قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكسين

ابلق الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكسين.

من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكسين (أكثر من 2 ساعة

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع

تتفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،

عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

- إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العبوة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العبوة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

- إن (ممكن) الأدوية التالية:
- الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد،
- الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي،
- الأيونوني، سوكر الفات،
- الحموضة.

سيفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك

عن صفائك هذا الدواء من قبل الطبيب. كل من

يقصر الغدة الدرقية الناجم عن أدوية تركيبيّة مضادة، واليود 131 أو عملية جراحية والتي تحتاج لعلاج بدهرمونات الغدة الدرقية (على سبيل المثال في حالة العلاج طويل الأمد لمرض بازو بإشتراك دواء تركيبي مضاد مع ليفوتيروكسين).

• في حالة متلازمة الشريان التاجي الحادة أو التهاب العضلة القلبية الحاد (حدوث التهاب في الجزء العضلي من القلب).

يشكل عام لا يجوز استعمال هذا الدواء، ما لم يرتني الطبيب خلاف ذلك، في بعض الأمراض القلبية غير المثبتة: مرض الشريان التاجي (أمراض الأوعية الدموية المروية للقلب)، واضطرابات نضم القلب.

خلال فترة الحمل، لا يستعمل اشتراك ليفوتيروكسين و دواء مضاد لإفراز الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق.

احتياطات الاستعمال ؛ تحذيرات خاصة

تحذيرات و احتياطات

بشكل عام، يجب أن يكون العلاج تحت مراقبة سريرية و بيولوجية من قبل الطبيب. أخبر طبيبك عن مرض قديم أو مرض حدث أثناء العلاج، بما في ذلك:

قصور الغدة الدرقية في معظم الحالات، هو مرض نهائي، ينبغي مواصلة العلاج إلى أجل غير مسمى. في جميع الحالات، احترّم بدقّة وصفة طبيبك. أعراض و تعليمات الجرعة الزائدة إذا أخذت كمية زائدة من ليفوتيروكس قرص قابل للقطع، و أنت لست بحاجة لأخذها:

في حالة الجرعات الزائدة أو التسمم العرضي بما في ذلك الأطفال، لا بد أن تعلم بسرعة طبيبك قد يعتزم بإيقاف العلاج أو تعليق أو أي إجراء آخر يراه ضروريا. العلامات أو الأعراض المتصلة بالجرعة الزائدة، لاسيما زيادة في معدل ضربات القلب أو غيرها من علامات فرط التدرق (انظر الفقرة 4)، قد تحدث في بضعة ساعات أو تتأخر ببضعة أيام.

تعليمات في حال نسيان جرعة واحدة أو عدة جرعات

إذا نسيات أخذ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع :

إذا غيّبت جرعة، لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي فاتتك.

إذا غيّبت عدة جرعات، اتصل بطبيبك.

إذا كان لديك أي أسئلة حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
• تتفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)
• علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.
الإبلاغ عن الآثار الجانبية:
إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال .
تاريخ انتهاء الصلاحية
لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير . EXP العبوة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العبوة الأصلية، محمية من الضوء .
إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية لاكتوز

الشكل الصيدلاني والمحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل عبوة تحتوي على 30 قرص.

الصانع:

ميرك كيه جي إيه إيه - فرانكفورت شتراس 250 - 64293 دار
مشتات - ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،
المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،
في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلكتوز (امراض وراثية نادرة).
إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج و علامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج .

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكس

ابلق الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكس.

من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكس (أكثر من 2 ساعة

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية مكملات مع الصويا

استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين حاملا أو تخططين للحمل، اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف

LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

traitement par certains médicaments :

- médicaments anticonvulsivants traitant l'épilepsie,
- médicaments traitant la tuberculose,
- médicaments traitant le paludisme (chloroquine/proguanil),
- médicaments contenant des œstrogènes, utilisés dans un but non-contraceptif,
- médicaments traitant une infection par le virus du SIDA,
- D'autres substances telles que imatinib, sunitinib, orlistat,

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être amené à modifier la posologie de votre traitement au début ou à la fin d'une supplémentation en soja.

dant la grossesse et l'allaitement

L'association de Lévothyrox à des antithyroïdiens dans le traitement de l'hyperthyroïdie n'est pas indiquée au cours de la grossesse. En effet, Lévothyrox passe très peu la barrière placentaire, alors que les antithyroïdiens passent facilement celle-ci. Il en résulterait un risque d'hypothyroïdie chez le fœtus.

L'allaitement est possible pendant le traitement.

L'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie sont susceptibles d'altérer la

..... 100 µg
ou 200 µg
..... pour un comprimé sécable.

Les excipients sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, gélatine, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium.

Liste des excipients à effet notoire

Lactose.

Forme pharmaceutique et contenu

Aspect de Levothyrox et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé sécable blanc. Chaque boîte contient 30 comprimés.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc :

Cooper Pharma, 41 rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca, Maroc.

Fabricant

Merck KGaA

ensez à

• الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،
• الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (و انتجات التبادل
الأيوني، سوكر الفات، الموضعي المعدي - المعوي، مضادات
الحموضة والممتصات)،

• سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم
عند مريض غسيل الكلى

المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد
تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:

• الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،

• الأدوية لعلاج السل،

• (الأدوية لعلاج الملاريا / الكلوروكين / البروغوانيل،

• الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون،

منع الحمل

• الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،

• المواد الأخرى مثل إيماتينب، سونيتينيب، أورليستات،

عليكم بإشعار طبيكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد
يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية

مكملات مع الصويا

استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين
حاملا أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول

هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف
الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكرو غرام، 50 ميكرو غرام ،
100 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص قابل للقطع؟

المادة الفعالة هي :

ليفوتيروكسين صودي 25 ميكرو غرام

..... 50 ميكرو غرام

..... 100 ميكرو غرام

..... 200 ميكرو غرام

..... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،
كروسكراميلوز صودي، ستيارات المغنيزيوم

قائمة السواغات ذو تأثير معروف

لاكتوز

الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانع:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورت شتراس 250 - 64293 دار
مشتات - ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،
المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30 أبريل 2015

بيولوجية من قبل الطبيب. احذر طبيبك عن مرض قديم

أومرض حدث أثناء العلاج ، بما في ذلك:

إذا كان لديك أي أسئلة حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد

شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلكتوز (امراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوثيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة للدهن للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوثيروكس قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوثيروكس

ابلق الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوثيروكس.

من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوثيروكس (أكثر من 2 ساعة

4. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع •تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،

•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5. ما هي طريقة حفظ ليفوثيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العبوة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العبوة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكرو غرام ، 50 ميكرو غرام ،
100 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص قابل للقطع؟

المادة الفعالة هي :

ليفوتيروكسين صودي 25 ميكرو غرام

..... 50 ميكرو غرام

..... 100 ميكرو غرام

..... 200 ميكرو غرام

..... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،

كروسكراميلوز صودي، ستيارات المغنيزيوم

قائمة السواغات ذو تأثير معروف

لاكتوز

الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانع:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورت شتراس 250 - 64293 دار

مشتات - ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،

المملكة المغربية

ظروف الوصف و التسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30 أبريل 2015

الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،
الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجيات التبادل
الأيوني، سوكر الفات، الموضعي المعدي - المعوي، مضادات
الحموضة و الممتصات)،

سيفيلا مير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم
عند مريض غسيل الكلى

المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد
تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية :

•الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،

•الأدوية لعلاج السل،

•(الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،

•الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون،
منع الحمل

•الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،

•المواد الأخرى مثل إيماتينب، سونيتينيب،، أورليستات،

عليكم بإشعار طبيكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام و الشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد
يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية
مكملات مع الصويا

استخدام أثناء الحمل و الرضاعة

الحمل و الرضاعة

إذا كنتِ حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنتِ تعتقدين أن تكونين
حاملا أو تخططين للحمل، اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول
هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف
الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

بيولوجية من قبل الطبيب. أخبر طبيبك عن مرض قديم
أو مرض حدث أثناء العلاج ، بما في ذلك:

إذا كان لديك أي أسئلة حول استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد

شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب اللاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية").

فعالية العلاج و علامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكسين قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكسين

ابلق الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكسين.

من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكسين (أكثر من 2 ساعة

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع

•تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،

•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العبوة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العبوة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكسين (أكثر من 2 ساعة

في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب اللاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (امراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكسين قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكسين

ابلع الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكسين.

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع .تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التحرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،

• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس و احمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضوء .

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être amené à modifier la posologie de votre traitement au début ou à la fin d'une supplémentation en soja.

Avant la grossesse et l'allaitement

Consultez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez de le devenir, votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé sécable blanc. Chaque boîte contient 30 comprimés.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc :

Cooper Pharma, 41 rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca, Maroc.

Fabricant

Merck KGaA - Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Allemagne

Conditions de prescription et de délivrance

Liste II

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée.

50 ميكروغرام، 25 ميكروغرام، 12.5 ميكروغرام، 6.25 ميكروغرام، 3.125 ميكروغرام، 1.5625 ميكروغرام، 0.78125 ميكروغرام، 0.390625 ميكروغرام، 0.1953125 ميكروغرام، 0.09765625 ميكروغرام، 0.048828125 ميكروغرام، 0.0244140625 ميكروغرام، 0.01220703125 ميكروغرام، 0.006103515625 ميكروغرام، 0.0030517578125 ميكروغرام، 0.00152587890625 ميكروغرام، 0.000762939453125 ميكروغرام، 0.0003814697265625 ميكروغرام، 0.00019073486328125 ميكروغرام، 0.000095367431640625 ميكروغرام، 0.0000476837158203125 ميكروغرام، 0.00002384185791015625 ميكروغرام، 0.000011920928955078125 ميكروغرام، 0.0000059604644775390625 ميكروغرام، 0.00000298023223876953125 ميكروغرام، 0.000001490116119384765625 ميكروغرام، 0.0000007450580596923828125 ميكروغرام، 0.00000037252902984619140625 ميكروغرام، 0.000000186264514923095703125 ميكروغرام، 0.0000000931322574615478515625 ميكروغرام، 0.00000004656612873077392578125 ميكروغرام، 0.000000023283064365386962890625 ميكروغرام، 0.0000000116415321826934814453125 ميكروغرام، 0.00000000582076609134674072265625 ميكروغرام، 0.000000002910383045673370361328125 ميكروغرام، 0.0000000014551915228366851806640625 ميكروغرام، 0.00000000072759576141834259033203125 ميكروغرام، 0.000000000363797880709171295166015625 ميكروغرام، 0.0000000001818989403545856475830078125 ميكروغرام، 0.00000000009094947017729282379150390625 ميكروغرام، 0.000000000045474735088646411895751953125 ميكروغرام، 0.0000000000227373675443232059478759765625 ميكروغرام، 0.00000000001136868377216160297393798828125 ميكروغرام، 0.000000000005684341886080801486968994140625 ميكروغرام، 0.0000000000028421709430404007434844970703125 ميكروغرام، 0.00000000000142108547152020037174224853515625 ميكروغرام، 0.000000000000710542735760100185871124267578125 ميكروغرام، 0.0000000000003552713678800500929355621337890625 ميكروغرام، 0.00000000000017763568394002504646778106689453125 ميكروغرام، 0.000000000000088817841970012523233890533447265625 ميكروغرام، 0.0000000000000444089209850062616169452667236328125 ميكروغرام، 0.00000000000002220446049250313080847263336181640625 ميكروغرام، 0.000000000000011102230246251565404236316680908203125 ميكروغرام، 0.0000000000000055511151231257827021181583340491015625 ميكروغرام، 0.0000000000000027755575615628913510590791670245078125 ميكروغرام، 0.00000000000000138777878078144567552953958351225390625 ميكروغرام، 0.000000000000000693889390390722837764769791756126953125 ميكروغرام، 0.0000000000000003469446951953614188823848958780634765625 ميكروغرام، 0.00000000000000017347234759768070944119244793903173828125 ميكروغرام، 0.000000000000000086736173798840354720596223969515869140625 ميكروغرام، 0.0000000000000000433680868994201773602981119847579345703125 ميكروغرام، 0.00000000000000002168404344971008868014905599237896728515625 ميكروغرام، 0.000000000000000010842021724855044340074527996189483642578125 ميكروغرام، 0.00000000000000000542101086242752217003726399809474182140625 ميكروغرام، 0.000000000000000002710505431213761085018631999047370910703125 ميكروغرام، 0.0000000000000000013552527156068805425093159995236854553515625 ميكروغرام، 0.00000000000000000067762635780344027125465799976184272767578125 ميكروغرام، 0.000000000000000000338813178901720135627328999880921363837890625 ميكروغرام، 0.0000000000000000001694065894508600678136644999404606819189453125 ميكروغرام، 0.00000000000000000008470329472543003390683224997023034095947265625 ميكروغرام، 0.000000000000000000042351647362715016953416124985115170479736328125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000211758236813575084767080624925575852398681640625 ميكروغرام، 0.00000000000000000001058791184067875423835403124627879261993408203125 ميكروغرام، 0.000000000000000000005293955920339377119177015623114396309967041015625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000026469779601696885595885078115571981549835205078125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000132348898008484427979425390577859907749176025390625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000661744490042422139897126952889299538745880126953125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000003308722450212110699485634764446497693729400634765625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000016543612251060553497428173822232488468647003173828125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000082718061255302767487140869111162442343235015869140625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000413590306276513837435704345555812221216175079345703125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000002067951531382569187178521727779061106080875396728515625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000010339757656912845935892608638895305530404376983642578125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000516987882845642296794630431944476527620218849182140625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000002584939414228211483973152159722378131010944245910703125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000012924697071141057419865760798611890655054721229553515625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000064623485355705287099328803993059453275273606147767578125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000032311742677852643549964401996529726637636803073888940625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000001615587133892632177498220099826486331881840153694453125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000008077935669463160887491100499632431659409200768472265625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000040389678347315804437455502498162158297046003842361328125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000201948391736579022187277512490810791485230019211806640625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000001009741958682895110936387562454053957426150096059033203125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000005048709793414475554681937812270269787130750480295166015625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000025243548967072377773409689061351348935653752401475830078125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000126217744835361888867048445306756744678268767007379150390625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000631088724176809444335242226533778373391343835036895751953125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000003155443620884047221676211132668891866956719175194765625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000015777218104420236108381055663344459334783595875973828125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000078886090522101180541905278316722296673917979379869140625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000394430452610505902709526391583611483369589896899345703125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000197215226305252951354763195791805741684794944844970703125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000986076131526264756773815978959403708423974724224853515625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000004930380657631323783869079894797018542119873621124267578125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000246519032881566189193453994739850927105993681056213126953125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000123259516440783094596726997369925463552996840528106564765625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000616297582203915472983634986849962731764984202640532823828125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000003081487911019577364918174934249813688824921013202664119140625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000015407439555097886824590874671249406944124605066013320595703125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000077037197775489434122954373356247034720623025330066602978515625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000385185988877447170614771866781235173603115126650333014892578125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000001925929944387235853073859333906175868015575633251665074462890625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000009629649721936179265369296669530879340077878166258325372314453125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000048148248609680896326846483347654396700389390831291626861572265625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000240741243048404481634232416738271983501946954156458134307861328125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000001203706215242022408171162083691359677509734770782290671539306640625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000006018531076210112040855810418456798387548673853911453357696533203125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000030092655381050560204279052092283991937743369269557266788482666015625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000150463276905252801021395260461419959688716846347786333942413330078125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000752316384526264005106976302307099798443884231738931669712066650390625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000003761581922631320025534881511535449897219421158694658348560333251953125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000018807909613156600127674407557677249486097105793473291742801666259765625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000094039548065783000638372037788386247430485528967366458714008331298828125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000000470197740328915003191860188941931237152427644836832293570041656494140625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000002350988701644575015959300944709656185762138224184161467850208282470703125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000000117549435082228750797965047235482809288106911209208073392510414123515625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000058774717541114375398982523617741404644053455604604036696255207161173828125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000000293873587705571876994912618088707023222272278023020183481276035805869140625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000001469367938527859383497456300443535116111361390115100917406380179029345703125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000007346839692639296917487281502217675580556806950575504587201900895146728515625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000003673419846319648458723640751108837790278403475028752293600950447573642890625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000000018367099231598242293618203755544188951392017375143761468004752237868214453125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000000091835496157991211468091018777720944756960086875718807340023761189342122265625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000000459177480789956057340455093888604723784800434378594036700118805946710611328125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000000002295887403949780286702275469443023618924002171689270183500594429733553056640625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000000011479437019748901433511377347215118094620010858446350917502972148667765283203125 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000000057397185098744507167556886736075590473100054292231754587514860743338826416015625 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000000000286985925493722535837784433680377952365500027146158772937574303716694132080078125 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000000001434929627468612679188922168401889761827500135730793864687871518583470660400390625 ميكروغرام، 0.0000000000000000000000000000000000000007174648137343063395944610842009448809137500678653969323439357592917353302001953125 ميكروغرام، 0.00000000000000000000000000000000000000035873240686715316979723054210047244045687500339326946617196787964586766510009765625 ميكروغرام، 0.000000000000000000000000000000000000000179366203433576584898615271050236220228437500169663233085983939822933832550048828125 ميكروغرام، 0.00896831017167882924494307635250118110142187500084831616542969699114669162750244140625 ميكروغرام، 0.004484155085839414622471538176250590550710937500042415808271484849573345813751220703125 ميكروغرام، 0.0022420775429197073112357690881252952753554687500021207904135924247866729068756103515625 ميكروغرام، 0.00112103877145985365561788454406264763767773437500010603952069621239333645343780517578125 ميكروغرام، 0.000560519385729926827808942272031323818838867187500005301976034810196668226718902587890625 ميكروغرام، 0.0002802596928649634139044711360156619094194335937500002650988017405098341133594512939453125 ميكروغرام، 0.00014012984643248170695223556800783095470971679687500001325494400870254916717972564697265625 ميكروغرام، 0.00700649232162408534761177840039154773548583984375000006627472004351274585898628234886328125 ميكروغرام، 0.003503246

من الصلابة أو الصلابة .
شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،
في حالة عدم كفاية وظيفية الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب الجلكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلكتوز (امراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام) ، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقليل الشهية ").

فعالية العلاج و علامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكسين قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكسين

ابلق الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكسين.

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع
•تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)
•علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،
•عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
•ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.
الإبلاغ عن الآثار الجانبية:
إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء .

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العبوة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العبوة الأصلية، محمية من الضوء .

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

غير المستعملة. هذه الإجراءات ستسمح بحماية البيئة.

6. محتويات العلبة و معلومات أخرى

قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليفوتيروكس 25 ميكرو غرام، 50 ميكرو غرام ،
100 ميكرو غرام ، 200 ميكرو غرام ، قرص قابل للقطع؟

المادة الفعالة هي:

ليفوتيروكسين صودي 25 ميكرو غرام

..... 50 ميكرو غرام

..... 100 ميكرو غرام

..... 200 ميكرو غرام

..... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،

كروسكراميلوز صودي، ستيارات المغنيزيوم

قائمة السواغات ذو تأثير معروف

لاكتوز

الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانع:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورت شتراس 250 - 64293 دار

مشتات - ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،

المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30 أبريل 2015

إن أمكن) الأدوية التالية:

•الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،

•الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجيات التبادل

الأيوني، سوكر الغات، الموضعي المعدي - المعوي، مضادات

الحموضة و الممتصات)،

•سيفلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم

عند مريض غسيل الكلى

المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد

تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:

•الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،

•الأدوية لعلاج السل،

•(الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،

•الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون،

منع الحمل

•الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،

•المواد الأخرى مثل إيماتيب، سونيتينيب، أورليستات،

عليكم بإشعار طبيبك في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد

يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية

مكملات مع الصويا

استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملا أو كنتِ ترضعين، و إذا كنت تعتقدين أن تكونين

حاملا أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول

هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف

الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

شرابين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه وبشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب اللاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية الإضافية) قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفلا.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطيرة، خصوصا إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية "تقليل الشهية").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوما إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكسين قرص قابل للقطع

اشترك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكسين

ابلع الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منذ قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكسين.

من المستحسن أن تأخذ بعيدا عن ليفوتيروكسين (أكثر من 2 ساعة

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع

• تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التدرق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال): في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك،

• عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

• ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات و الأعراض الأكثر شيوعا هي: طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس واحمرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضا على أي أثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكسين، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبدا في متناول الأطفال .

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 م° في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجزور العام أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عما يجب عمله للتخلص من الأدوية

LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin.

Interactions avec les aliments et les boissons

Aliments et boissons

Le soja peut diminuer l'efficacité de ce médicament. Votre médecin pourra donc être amené à modifier la posologie de votre traitement afin de compenser la fin d'une supplémentation en soja.

La grossesse et l'allaitement

Si vous pensez être enceinte, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Aspect de Levothyrox et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un comprimé sécable blanc. Chaque boîte contient 30 comprimés.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc :

Cooper Pharma, 41 rue Mohamed Diouri, 20110 Casablanca, Maroc.

Fabricant

Merck KGaA - Frankfurter Strasse 250 - 64293 Darmstadt - Allemagne

Conditions de prescription et de délivrance

Liste II

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 15/05/2014.