



Clinique Chifa

Berrechid le : 25/07/2021

FACTURE:N°P298/21



060002557

Nom et prénom : YAQUINE FOUZIA

Date de consultation : 25/07/2021

| INTITULE | JOUR | QTE | PU | MT |
|-----------------------------|--------------|-----|-------|--------|
| Spasfan inj | | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Sous Total Clinique | | | | 50,00 |
| ***HONORAIRES*** | | | | |
| Consultation | 1V2 | | 300 | 300,00 |
| | | | | |
| Sous Total Honoraire | | | | 300,00 |
| | | | | |
| | TOTAL | | | 350,00 |

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:

TROIS CENT CINQUANTE DHs

Clinique Chifa
Berrechid - 308
Tél. 06 61 14 32 05 - Fax 06 07 10 46 49
Patente N°: 40720200 - CNSS N°: 2922682
RIB N° 117621212115848620000510 - IF: 6101098
ICE: 001785613000068

7, Lottissement Jaddah - Berrechid BP 308 - برشيد - جدة 7

Gsm :06 61 14 32 05 / Tél./Fax: 06 07 10 46 49 Patente N°: 40720200 - CNSS N°: 2922682

Compte Bancaire : Agence Berrechid RIB N° 117621212115848620000510 - IF: 6101098

ICE: 001785613000068



LABORATOIRE OTHMANI D'ANALYSES MEDICALES

مختبر عثماني للتحاليل الطبية

(Hématologie - Biochimie - Immunologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie - Virologie - Hormonologie - Spérmiologie)



Dossier N° : P0721-2949 Pvt du: 27/07/2021 11:08

Nom : Mme YAQUINE Fouzia

CIN / Passport : bh200542

Age : 55 ans

Casablanca, 27/07/2021

Compte rendu d'analyses

Page : 1/1

BIOLOGIE MOLECULAIRE

RECHERCHE DU SARS-COV-2 (COVID19) PAR PCR EN TEMPS REEL (RT-PCR)

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| Nature du prélèvement | : | Naso-pharyngé |
| CT | : | 18,80 |
| Résultat | : | POSITIF |

La sensibilité des test RT-PCR utilisés pour le le SARS-COV 2 varie selon le type de prélèvement et la période à laquelle celui-ci est effectué au cours de la maladie. Un résultat négatif doit être interprété avec prudence et en présence de symptômes évocateurs, une infection à Covid - 19 ne peut être totalement exclue.

Demande validée biologiquement par Dr. Houda OTHMANI



Nous vous remercions pour votre confiance

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Adresse : N°2 Res El Qods, Bd El Qods Quartier Omaaria, Ain Chock - Casablanca

Tél: 0522 21 22 11 - Fax : 0522 21 22 39 - Gsm : 0662 27 99 66 / 0767 78 76 75 - E-mail : othmani.laboratoire@gmail.com



Facture

N° facture : P21-1652

Édité le : 27/07/2021

Patient : Mme YAQUINE Fouzia

Date prélèvement : 27/07/2021

N° Dossier : P0721-2949

| Analyses | Valeur en B | Montant |
|----------------------------|-------------|---------------|
| RT-PCR COVID | 600 | 600,00 |
| Total B | 600 | 600,00 |
| APB | 1,0 | 0,00 |
| Majoration de garde | | |
| Total | | 600,00 |



Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Adresse : N°2 Res El Qods, Bd El Qods Quartier Omaria, Ain Chock - Casablanca

RC: 429200/Casablanca TP:34000062 CNSS: 5622362 IF: 24849923 ICE: 001980644000070



Clinique Chifa
CLINIQUE CHIFA



060002557

ORDONNANCE

Berrechid, le : 25/07/2021

Fougerio yoprine.

Tgt PCR



7، تحرية جدة - برشيد الهاتف / الفاكس : 06 07 10 46 49 المحمول : 06 61 14 32 05
7, Lottissement Jaddah - Berrechid Tél./ Fax: 06 07 10 46 49 Gsm: 06 61 14 32 05



060002557

ORDONNANCE

Berrechid, le : 27/07/2021

Fouz, Joaquim

$$\frac{7970 \times 2}{1} = 159,40$$

A_3: x \Gamma_{20} \rightarrow \uparrow

✓ (023 Seite)

apply the principle

pri 1/2 cp 85121

1530 mg vit C 1000 mg D₃

149 x 2/1 i =  Pharmacie des Familles
D. M. A. Yedessamad
29, Bd Chlefchaouni BP: 6 E Hay Hachem
Boumerdes

40,90₃) zindlin 45-у

15,80x21,00 14x21,05
EL KADIMA CHIFA
Chifa 7, Lot 3
Takach - Seine
75.98/9
023 auto

7- تجزية مكتب ببرهشيد الفاكس: 06 07 10 46 49 المحمول: 06 61 14 32 05
ment Jeddah - Berrechid Tél./ Fax: 06 07 10 46 49 GSM: 06 61 14 32 05

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|---|----------|-----------------------|
|  Dr. HALMI Abdessamad | 25/07/21 | 247. 20 |

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|----------|------------------------------|------------------------|
|  Dr. El Ghoul Residence El Ghoul Quartier Omane Sidi Chouik - Casablanca 522.21.22.11 | 29/10/21 | B6cc | 600,000 Dhs |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODT.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXÉCUTION

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

adiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 061618

80548

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 5314

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : OUAD Abderrahim

Date de naissance : 01 - 5 - 1953

Adresse : LOT WAFA H 98 DEROUA

Tél. : 06 62 65 28 33

Total des frais engagés : 1197, 20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 28/03/2021

Nom et prénom du malade : Y.A. QUINÉ - F-62-1-A Age : 55 ans

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Suspicion de Cervical

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca le 21/03/2021

Le :

Signature de l'adhérent(e) :



Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000

VITA C 1000

VITA C 1000

Veuillez lire
elle conti
Vous dev
les infor
pharmac
- Gardez
- Adress
- Si vous
à votre
mention
- Vous
amélior

Vita C 1000®

10 Comprimés effervescents



AMM N° 03 DMP/21

Que contient cette boîte ?

1. Qu'est-ce que VITA SUCRE Comprimés effervescents ?
2. Quelles sont les informations sur les Comprimés effervescents ?
3. Comment prendre VITA SUCRE Comprimés effervescents ?
4. Quels sont les effets secondaires ?
5. Comment conserver VITA SUCRE Comprimés effervescents ?
6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® SANS SUCRE ET VITA C 1000® SANS SUCRE SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmaco-thérapeutique : ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C).

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de l'acide ascorbique. Il est indiqué dans les états suivants : et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents.

- Ne prenez jamais VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Contre-indications)

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes atteint de phénylcétoneurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam (VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents)
- si vous présentez une insuffisance rénale sévère (défaillance grave des fonctions du rein)
- si vous présentez ou avez présenté des calculs rénaux
- si vous avez des calculs d'oxalate de calcium (hyperoxalurie)
- si vous avez moins de 15 ans

- Faites attention avec VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VITA C 1000® comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents.

- VITA C 1000® comprimés effervescents
 - Si votre enfant a moins de 10 ans, il ne doit pas prendre ce médicament.
 - En raison de l'acidité de la vitamine C, il est préférable de prendre ce médicament au moins 1 heure avant ou après les repas.
 - Prendre en cas de rhume ou de grippe, comme les malades (risque de surinfection).
 - La vitamine C peut entraîner l'hémochromatose (maladie héréditaire), adressez-vous à votre médecin pour prendre de précieuses informations.

3 - COMMENT PRENDRE VITA C 1000® ?

• Ce médicament doit être pris en complément de l'alimentation.

• En raison de l'acidité de la vitamine C, il est préférable de prendre ce médicament au moins 1 heure avant ou après les repas.

• Ce médicament doit être pris en complément de l'alimentation.

• Ce médicament peut provoquer des effets secondaires.

• VITA C 1000® comprimés effervescents doivent être pris en complément de l'alimentation.

• Ce médicament doit être pris en complément de l'alimentation.

• Ce médicament doit être pris en complément de l'alimentation.

• Enfants : pas de médicament.

- Prises d'aspartam : Informez votre pharmacien, il pourra vous conseiller.

- Aliments enrichis : Prendre en complément de l'alimentation.

- Utilisation : Si vous êtes enceinte, planifiez une consultation avec votre pharmacien.

Grossesse
Par mesure de sécurité, il est préférable de prendre ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement
La vitamine C est importante pour les effets secondaires. Il est préférable de prendre ce médicament pendant l'allaitement.

Liste des excipients à effet notoire

Ce médicament contient du sel (sodium).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMMENT PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ?

Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par comprimé : ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

→ à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.

1000 mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures.

ou au bout de 4 heures minimum.

POSOLOGIE → également pas nécessaire de dépasser la dose de 3000 mg de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

Cependant en cas de douleurs plus intenses, la posologie peut être augmentée jusqu'à 4000 mg par jour, soit 4 comprimés par jour.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau. Boire immédiatement après.

Si vous avez pris plus de DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux normalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ?

Conservez le tube soigneusement fermé à l'abri de l'humidité.

Ne laisser, ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.



Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent
PARACÉTAMOL

Doliprane® 1000 mg

PARACETAMOL

8 comprimés effervescents sécables



6 118000 040361

PPV 05/24
PER 1458
LOT 52



Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes sur l'utilisation de ce médicament. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous pouvez l'acheter dans une pharmacie. Néanmoins, vous devez utiliser ce médicament avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persisteront, consultez votre médecin.

La substance active est paracétamol 1000 mg pour un comprimé. Les autres ingrédients sont : acide citrique anhydre, monohydraté, saccharose, K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium. Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de tête et de dos.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans). Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de ce médicament. Consultez votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent si :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.



Liste des excipients à effet notoire

Ce médicament contient du sel (sodium).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMMENT PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg,

COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par comprimé : ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

POSOLOGIE

En raison de son dosage ~~ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.~~

La posologie usuelle est de **1/2 à 1 comprimé à 1000 mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures.**

En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser la dose de 3000 mg de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

Cependant en cas de douleurs plus intenses, la posologie peut être augmentée jusqu'à 4000 mg par jour, soit 4 comprimés par jour.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de Doliprane 1000 mg, comprimé effervescent est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Laisser dissoudre complètement le comprimé dans un verre d'eau. Boire immédiatement après. Si vous avez pris plus de **DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent que vous n'auriez dû** : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre **DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent** : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments **DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent** est susceptible d'avoir des effets indésirables.

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ?

Conserver le tube soigneusement fermé à l'abri de l'humidité.

Ne laisser, ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Doliprane®

1000 mg comprimé effervescent sécable

PARACÉTAMOL

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes. Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet de vous soigner sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser ce médicament avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat. Gardez cette notice à portée de main et la lisez à nouveau. Si vous avez besoin de plus d'informations, demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez immédiatement votre médecin.

La substance active est : paracétamol 1000 mg pour un comprimé. Les autres ingrédients sont : acide citrique anhydre, mannitol, saccharine sans sucre, hydroxypropylcellulose, croscarmellose K90, bicarbonate de sodium, carbonate de sodium anhydre, leucogel et huile de ricin. Teneur en sodium : 408 mg par comprimé.

PPV 15 D H 80
PER 03/24
LOT 9822
S 1

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol.

Il est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT.

Contre-indications

Ne pas prendre DOLIPRANE 1000 mg, comprimé effervescent dans les cas suivants :

- allergie connue au paracétamol,
- maladie grave du foie,
- enfants de moins de 15 ans.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE 1000 mg, COMPRIMÉ EFFERVESCENT

Précautions particulières

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.
- En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium : 408 mg par comprimé.
- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.



أزيكس®

أزيترووميسين

تعليمات علاجية:

أزيكس مضاد حيوي من صنف الأزليد منسوب للماكروليد. أزيكس له فعالية على التعفنات الناتجة عن جراثيم يؤثر عليها.

مضادات الإستطباب:

- حساسية للأزيترووميسين أو أي ماكروليد.
- ضعف في وظيفة الكبد.

تنبيه:

- في حالة أي ردود فعل حساسية (طفح جلدي . حكة...) يجب استشارة الطبيب المعالج - يجب إحاطة إلى علم الطبيب المعالج بأي حساسية عند الإستطباب بالمضادات الحيوية من صنف الماكروليد - لا يجب استعمال هذا الدواء عند المصابين بضعف في وظيفة الكبد - أمام عدم وجود معطيات علمية، ينصح عدم استعمال مشتقات مهمات الجودر.

احتياطات الاستعمال:

- يجب إحاطة علم الطبيب المعالج في حالة: ضعف في وظيفة الكبد. ردود فعل حساسية. اضطرابات جلدية ناتجة عن حالة حساسية. حالة حمل. حالة رضاع. أخذ أدوية أخرى في آن واحد.

التأثيرات الجانبية:

- اضطرابات هضمية: غثيان. قيء. إسهال وأوجاع بطنية.
- ردود فعل حساسية: حكة. طفح جلدي أو ديماكوينك.

المقادير:

- التقىد بوصفة الطبيب.

- للبالغين والأطفال الذين يزيد وزنهم عن 45 كيلو: قرص واحد من عيار 500 ملجم في اليوم لمدة 3 أيام.

كيفية الاستعمال:

أزيكس أقراص يمكن أخذه في أي حين من اليوم خلال أو خارج الوجبة الغذائية.

أزيكس أقراص من عيار 500 ملجم من الأزيترووميسين. علبة 3 أقراص.

جدول A (لائحة A).

بوتي ش.م.

82 مقر الكازباريناس - عين الصميم - الدار البيضاء

س. المنشاوي - صيدلي مسؤول

b

AZIX®

Azithromycine

COMPOSITION ET PRÉSENTATION

Comprimé 500 mg sécable, boîte de 3

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitements des infections dues aux germs

- infections respiratoires hautes : rhinopharyngite;
- infections respiratoires basses (y compris l'otite moyenne);
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques.

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine;
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, rash, etc.) pendant ou au cours de traitement doit être signalée au médecin traitant.
- Signaler au médecin traitant toute réaction allergique ou anaphylactique survenue lors de traitements par les azythromycines.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques : prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

TABLEAU A (LISTE I).



PPV 790H70
PER 12/23
LOT J 385



bottu SA

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebaï - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

idemco 101005 - 04.11

VOTRE MEDECIN. A TITRE INDICATIF, L'UN COMPRISEZ EFFERVESCENT PAR JOUR DANS UN VERRE D'EAU. LA CONSOMMATION DE L'UN COMPRISEZ SE FAIT 1 HEURE APRES LES REPAS.

b. Durée du traitement :

Cette posologie doit être observée pendant 1 mois. La poursuite du traitement au-delà se fera sur indication du médecin traitant.

c. Conduite à tenir en cas de surdosage :

La probabilité d'une intoxication aiguë est nulle.

Pour mémoire, on peut signaler l'utilisation éventuelle des sels de l'EDTA calcique ou de l'acide phytique.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

ZINASKIN® est doué d'une remarquable innocuité.

Toutefois, lors des essais cliniques, certains effets secondaires ont été signalés, tels que :

- Nausées
- Gastralgies
- Céphalées - Vertiges
- Diarrhées

Ces effets ont été notés surtout chez les patients qui prenaient leur thérapeutique à jeun.

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, LE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

CONSERVATION :

- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
- A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES D'AFRIQUE DU NORD
LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca - Maroc

050402F56588P280203

SKIN® (de Zinc)

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :

Boîte de 20 comprimés effervescents.

COMPOSITION QUALITATIF

Sulfate de zinc monohydrate (correspondant à 45 mg de zinc)

Excipient : acide citrique, polyoxyéthylène glycol 400, arôme citron-menthe, arôme

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

Oligo-élément.

DANS QUELS CAS UTILISER

- Acné
- Séborrhée - Pelade - Chute de cheveux
- Psoriasis
- Aphtose - Grande aphtose buccale
- Eczéma atopique
- Ulcères des jambes
- Acrodermatite entéropathique.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Ulcère gastrique ou duodénal évolutif

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Risque de chélation dans le tube digestif avec :

- Tétracyclines
- Médicaments à base de calcium ou de fer
- Pansements gastriques alcalins
- Aliments à forte teneur en acide phytique (pain complet, germes de soja, grains de maïs).

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :

Saccharose, sorbitol, sodium cyclamate, saccharine sodique.

Teneur en sodium : environ 185 mg de sodium par comprimé effervescent.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

a - Posologie :

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE

PPV 40DH90

EXP 03/2024

LOT 12042 2

ZINASKIN® 45 mg
20 comprimés effervescents



أزيكس®

أزيترو ميسين

تعليمات علاجية :

أزيكس مضاد حيوي من صنف الأزيليد منسوب لـماكروليد. أزيكس له فعالية على التعفنات الناتجة عن جراثيم يؤثر عليها.

مضادات الاستطباب :

- حساسية للأزيترو ميسين أو أي ماكروليد.
- ضعف في وظيفة الكبد.

تنبيه :

- في حالة أي ردود فعل حساسية (طفح جلدي ، حكة...) يجب استشارة الطبيب المعالج - يجب إحاطة إلى علم الطبيب المعالج بأي حساسية عند الاستطباب بالمضادات الحيوية من صنف الماكروليد - لا يجب استعمال هذا الدواء عند المصابين بضعف في وظيفة الكبد - أمام عدم وجود معطيات علمية، ينصح عدم استعمال مشتقات مهمات الجودر.

احتياطات الاستعمال :

- يجب إحاطة علم الطبيب المعالج في حالة: ضعف في وظيفة الكبد. ردود فعل حساسية. اضطرابات جلدية ناتجة عن حالة حساسية. حالة حمل. حالة رضاع. أخذ أدوية أخرى في آن واحد.

التأثيرات الجانبية :

- اضطرابات هضمية: غثيان، قيء، إسهال وأوجاع بطنية.
- ردود فعل حساسية: حكة، طفح جلدي أو ديماكوبينك.

المقادير :

- التقادير بوصفة الطبيب.
- للبالغين والأطفال الذين يزيد وزنهم عن 45 كيلو: قرص واحد من عيار 500 ملجم في اليوم لمدة 3 أيام.

كيفية الاستعمال :

أزيكس أقراص يمكن أخذه في أي حين من اليوم خلال أو خارج الوجبة الغذائية.

أزيكس أقراص من عيار 500 ملجم من الأزيترو ميسين. علبة 3 أقراص.

جدول A (لائحة).

بوتي ش.م.

82، مقر الكازار بيتاس - عين السبع - الدار البيضاء

س. البيشوش - صيدلاني مسؤول



AZIX®

Azithromycine

COMPOSITION ET PRÉSENCE

Comprimé 500 mg sécable, boîte

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitements des infections dues à

- infections respiratoires hautes pharyngite;
- infections respiratoires basses ()
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques.

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée) pendant le cours de traitement doit être signalée.
- Signaler au médecin traitant toute affection de la peau survenue lors de traitements par les antibiotiques.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients avec maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques : prurit, rash cutané, œdème de Quincke.

POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

TABLEAU A (LISTE I).

PPV 790H70
PER 11/23
LOT J3086



AZIX® 500 mg

Azithromycine

3 Comprimés sécables



6 118000 040941



bottu SA

82, Allée des Casuarinas - Ain Sébaï - Casablanca

S. Bachouchi - Pharmacien Responsable