

LABORATOIRE AIN SBAÂ D'ANALYSES MEDICALES

Biochimie clinique - Bactériologie médicale
Hématologie clinique - Immunologie



مختبر عين السبع للتحاليل الطبية

Hormonologie - Oncologie - Parasitologie - Mycologie
Virologie médicale - Spermiologie

Date du prélèvement : 07/08/2021 à 11:04

Code patient : 210624-0104

Né(e) le : 16/12/1953 (67 ans)



Mme Naima FETTAH

Dossier N° : 210807-0078

Prescripteur : Dr Brahim ERRAIHANI

BACTERIOLOGIE

RECHERCHE DE L'HELICOBACTER PYLORI DANS LES SELLES

(Méthode immuno-chromatographique)

Résultat :

Recherche négative

Validé par : Dr. BAHMANI Fatima Zohra





LABORATOIRE AIN SBAÂ

D'ANALYSES MEDICALES ET BIOLOGIQUES

Plateaux Bureau ALBADR ; « à côté de Marjane Ain Sbaâ »
Imm 106, Porte 10, Ain Sbaâ Casablanca Tel: 05 22 34 27
47 – Fax: 05 22 34 07 65 – email : lasam1977@gmail.com

Patente : 30300005 ICE: 002009800000013
INPE:
097164495 IF : 24969776

Dr. Fatima-zohra BAHMANI

Directrice du laboratoire

Diplômée de l'Université de Médecine et de Pharmacie de Rabat



Casablanca, le : 07/08/2021

Facture N° :2104708

Nom et Prénom : Mme Naima FETTAH

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PC	Prélèvement sang adulte Recherche d'Ag Helicobacter pylori dans les selles	B17 B300	B B

Total des B : 317

Montant total de la facture : 300.00Dhs

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trois cent dirhams .



Dr. BRAHIMERRAIHANI
MEDECINE GÉNÉRALE
Rés. Tarik - Imm 27, Appt. 403
Av. Mohamed El Barki
Sidi Mourrain - Tel: 05 22 7285 51

Le: 06/10/21

ORDONNANCE

FERRAH

Notma

Recherche du hélicobactéryl pylori
des des gels



Dr. BRAHIMERRAIHANI
MEDECINE GÉNÉRALE
Rés. Tarik - Imm 27, Appt. 403
Av. Mohamed El Barki
Sidi Mourrain - Tel: 05 22 7285 51



الدكتور ابراهيم الريhani

Dr. Brahim ERRAIHANI

Médecine Générale

Diplômé de la Faculté de Médecine de Casablanca

Ex Médecin aux forces Armées Royales

Diplômé en Médecine Legale et Réparation Juridique

du Dr. Brahim Erraihani

الطب العام

خريج كلية الطب بالدار البيضاء.

طبيب سابق بالقوات المسلحة الملكية

دبلوم في الطب الشرعي و التعويض


القانوني للضرر الجسدي

Casablanca, le

06/08/21

FETTAT

NAIMA



82,10

Ambroge
✓ C.P. + 21



art my.

46,90

Durexim 20



art

49,50

Adecalme



art my

39,80

Cardilax



art M

288,30

Statirol 20
✓ M e gr.



ci my

Résidence Tarik 458 - Imm 27 - Appt 403 - Bd Med El Bakkali - Ex Lagouta - Sidi Moumen - Casablanca

إقامة طارق 458 - عمارة 27 - شقة 403 - شارع محمد البقالي - لاكوطا سابقا - سيدى مومن - الدار البيضاء

Tél.: 05 22 72 80 31 - الهاتف: 05 22 72 80 31 - Email: drerraihani@gmail.com

Dr. BRAHIMERRAIHANI
MEDECINE GENERALE
Bd. Tarik Imm 27 - Appt. 403
Ex Lagouta - Sidi Moumen - Casablanca
Tél.: 05 22 72 80 31

car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Posologie

La posologie usuelle est de 1 comprimé, 2 à 3 fois par jour. Le comprimé sera pris avant les repas, avec un verre d'eau.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée de traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Rarement: nausées, céphalées.
- Très rares éruptions cutanées avec ou sans prurit. Très rares réactions allergiques, notamment urticaire ou œdème de Quincke.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Pas de conditions particulières de conservation

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

La substance active est :

Mébévérine chlorhydrate 200,00 mg
Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont :

Lactose, hydroxyéthylcellulose, saccharose, amyloglycollate de sodium, aerosil, avicel PH 102, stéarate de magnésium, eau purifiée.

Pelliculage : Dioxyde de titane, talc, hydroxypropylméthylcellulose, eau purifiée.

Excipients à effet notoire : Lactose, saccharose.

Qu'est-ce que ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés pelliculés. Boîte de 30.

Fabricant / Titulaire d'AMM :

Laboratoires SOTHEMA

B.P. N° 1, 27182 Bouskoura

MAROC

Conditions de prescription et de délivrance :

Liste II (Tableau C)

Date de révision de la notice : Juillet 2012.



ANTI-SPA® 200 mg, comprimés pelliculés

Boîte de 30

Mébévériné chlorhydrate

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
3. COMMENT PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est un anti-spasmodique musculotrope.

Il est indiqué dans les douleurs spastiques du tube digestif et des voies biliaires et l'inconfort intestinal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?

Si votre médecin a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais

Allergie à l'uridine

fausse route

En cas de diarrhée

pharmacien.

L'utilisation

au fructose

sucrase/iso-

L'utilisation

au galactose

du galactose

LOT 210082
EXP 01/2023
PPV 40.00

Prise ou utilisation

Si vous prenez

obtenu sans ordon-

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

En cas d'infection par la bactérie du duodénum appelée *Helicobacter pylori*, traitement de l'ulcère du duodénum et prévention de la récidive de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

- Adultes et jeunes gens âgés de 12 ans ou plus : la dose usuelle est d'un comprimé d'INEXIUM 20 mg deux fois par jour pendant 7 jours (cette durée peut atteindre 14j chez l'adolescent).
- Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques par exemple de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

Traitements des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens

- Adultes âgés de plus de 18 ans : la dose usuelle est d'un comprimé d'INEXIUM 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens

Adultes âgés de plus de 18 ans : la dose usuelle est d'un comprimé d'INEXIUM 20 mg une fois par jour.

Traitements de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison.

- Adultes âgés de plus de 18 ans : la dose usuelle est d'un comprimé d'INEXIUM 40 mg deux fois par jour. Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement en fonction de vos besoins. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

Si vous avez pris plus d'INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant :

- Prenez-le dès que possible. Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée, mais poursuivez votre traitement normalement.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, INEXIUM 20 mg, comprimé gastro-résistant est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre INEXIUM et contactez un médecin immédiatement :

- Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance et difficultés à avaler (réactions allergiques graves).
- Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez ou des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une destruction toxique de la peau.
- Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Ces effets sont rares et sont observés chez moins d'une personne sur 1000.

**INEXIUM® 20 mg,
comprimé gastro-résistant
ésoméprazole**

إينكسيوم® 20 ملخ ،
قرص صامد لحموضة
المعدة

العنوان



Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rheum palmatum racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés :

Confort digestif et intestinal.

Conseils d'utilisation :

2 à 4 comprimés par jour.

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse.

Présentations :

- Boîte de 20 comprimés.
- Boîte de 40 comprimés.

Tenir hors de la portée des enfants.

Conserver le produit dans un endroit sec.

Les compléments alimentaires

هيبانات
قرص

20 قرص

A consommer de préférence avant fin
Lot n°

39,80 DH
Lot : W198B
Per : 07-2023



COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Produit
Via delle Industrie

Importé et Distribué par ESNAPHARM - 7, Rue Abderrahmane Benjelloun
Maârif extension - Casablanca

كاربولاكس

كاربولاكس

ينبغي استخدام المكمّلات الغذائيّة في إطار نظام حياة صحي، وعدم استخدامها كبدائل عن النظام الغذائي المتنوع والمتوازن.

ارشادات الاستخدام:

يتناول مع كوب كبير من الماء 1-2 فرسن، مرة إلى 3 مرات يومياً بعد الأكل. يجب الالتزام بالجرعات المحددة. يستخدم لفترات قصيرة (6 أيام)، وبشكل خاص حسب الحاجة. لا يستخدم لأكثر من أسبوعين دون استشارة الطبيب. يوصى بعدم تناوله للأطفال والحوامل والمرضعات. عدم تجاوز الجرعة المحددة يومياً. هو مكمل غذائي يتكون من نباتي المئنا والراوند، التي تعمل على كفاءة وظائف الأمعاء والجهاز الهضمي، وامتصاص الطعام بشكل أفضل. كاربولاكس هو مكمل غذائي وليس دواء.

يجب تناولها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية المسجل على جانب العلبة. تحفظ في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء تحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

المكونات: الفحم النباتي، سكر، أوراق نبات المئنا (كارسيا أنجوستيفوليا ل)، خلاصة جذمور الراوند (رويوم بالماتيم ل) مواد نشوية للتزود بالطاقة: (مالتوسيكسترين)، مضاد للنکتيل: النلت (ستريكات الماڭنسيوم الطبيعية)، سائل: صمغ عربى، تكهات: زيوت عطرية من أوراق النعناع، زيت بذور نبات الشمار.



Carbolax®

FR Complément alimentaire

CARBOLAX est un complément alimentaire associant le séné et la rhubarbe, deux composants qui contribuent au bon fonctionnement intestinal et digestif.

COMPLEMENT ALIMENTAIRE. CECI N'EST PAS UN MEDICAMENT.

CONSEIL D'UTILISATION

Prendre 1 à 2 comprimés 1 à 3 fois par jour après les repas avec un grand verre d'eau.

Respecter les doses conseillées. À utiliser pendant de courtes périodes, et ponctuellement, en fonction des besoins, sans dépasser 6 jours. L'usage prolongé est déconseillé. Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière. Tenir hors de la portée des enfants.

Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré.

INGRÉDIENTS

Charbon végétal, t et digestion مضم و متخصص الطعام
lia), extrait de raci bon végétal فحم نباتي
rant : talc, épaissi نبات السنما
de feuilles de men arabe الراؤوند
(نبات)
PPC : 79DH59

et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire équilibré.

لست alimentaire à base de Charbon végétal, Séné et Rhubarbe offustifo-
et digestion مضم و متصاص الطعام alomé-
bon végétal فحم نباتي entielle
نبات السنما PPC: 79DH50
رubarbe (نبات) الرانوند

net 15g. Contribue au bon fonctionnement intestinal.

laboratoire tradiphar

176 rue de l'arbrisseau - 59000 Lille - France

ACTICARBINE comprimé enrobé

Charbon activé / papavérine (chlorhydrate de)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE ACTICARBINE comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Adsorbant intestinal. Antispasmodique (A : appareil digestif et métabolisme). Il est indiqué chez l'adulte dans le traitement des digestions difficiles notamment avec ballonnement intestinal.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACTICARBINE comprimé enrobé?

Ne prenez jamais ACTICARBINE comprimé enrobé en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

- En cas de ballonnement, flatulences, éviter les légumes secs (lentilles, flageolets, pois...) certains légumes verts (choux, choux de Bruxelles, bettes...)
- En cas de diarrhées associées, il est nécessaire de:
 - se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres)
 - s'alimenter le temps de la diarrhée,
- en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacées.

■ en privilégiant les viandes blanches.

EN CAS DE DOUTE, NE MEDECIN OU PHARMACIEN.

Interaction

Ce médicament peut modifier l'efficacité de certains médicaments (ceux-ci doivent être utilisés avec précaution ou pas du tout si possible).

AFIN D'EVITER TOUTE INTERACTION, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

L'utilisation de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement doit être évitée. Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, consultez rapidement votre médecin.

Allaitement

La prise de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence dus à la présence de papavérine.

3. COMMENT PRENDRE ACTICARBINE comprimé enrobé?

Posologie : réservé à l'adulte.

1 à 2 comprimés avant les 3 repas, à avaler tels quels avec un verre d'eau.

Mode et voie d'administration : voie orale.

Si vous avez utilisé plus de ACTICARBINE comprimé enrobé que vous n'auriez dû

Aucun surdosage n'a été rapporté avec ce médicament. La papavérine, l'une des substances actives de ce médicament, risque d'induire à très fortes doses, des nausées, vomissements, faiblesse, dépression du système nerveux central, vision double, transpiration abondante, rougeur de la face, sécheresse de la bouche, vertiges et tachycardie sinusale.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ACTICARBINE comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tous n'y soient pas sujets notamment, une coloration foncée des selles peut apparaître.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ACTICARBINE comprimé enrobé?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ACTICARBINE comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Substances actives : charbon activé : 70 mg, chlorhydrate de

الحمد لله



3400936312908
LOT : JC133
EXP : 01/2026

ACTICARBINE 70 MG Comp. (84)

PPV 46,90 DH SOTHEMA



6118001 070015

TOI = TOI, TUP = TUP, KAR = KAR, KAR = KAR, KAR = KAR, KAR = KAR

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché et distributeur au Maroc : Laboratoires SOTHEMA B.P. N° 1 - 27182 Bouskoura - Maroc.

Conditions de délivrance du médicament : Médicament non soumis à prescription médicale.

Date d'approbation de la notice : 20 septembre 2013.

160002

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES RÉJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothétique :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La facture des soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Adhésion et Assumption Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.


Adresses Mails utiles

Reclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
06/07/21	C		100,00	<i>Dr. BRAHIM EL KALFI MEDECINE GENERALE Bab. Tarik - 1mm 27, Apot. 403 Av. Mohmed El Bokkali Sidi Moumen - Tel: 0522 723 14</i>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourmisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Dr. LAHLOU BTESSAM Pharmacie AHL AL BOKKALI</i>	06/07/21	288,30

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES N°10 Inmm 106 Plateau de la Médina - Al Bok - Ain Sefra - Constantine Tél: 05 22 34 27 47 - Fax: 05 22 34 27 47</i>	06/07/21	B + 312	300,00 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'état de santé.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				
				
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553	G		
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
COEFFICIENT DES TRAVAUX	MONTANTS DES SOINS			DATE DU DEVIS
DATE DE L'EXECUTION				

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX