

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Honneur
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 057310

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9593

Société :

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : DHARSMA EL MOSTAFA

Date de naissance : 1960/05/04

Adresse :

Tél. : 0663089901 Total des frais engagés : 2576,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr AGOUMI Saloua
Neurologue
249 Résidence El Mansour "4"
Appt 4, 2^e Etage, Bd Yacoub
El Mansour Casablanca
Tél: 0522 3984 38

Cachet du médecin :

Date de consultation : 28/08/2021

Nom et prénom du malade : DHARSMA EL MOSTAFA Age: 61ans

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : céphalées de tension

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.



Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Frais
28/08/21	C ₃		300 DH	Dr AGOUMI Saïd Neurologue 249 Résidence El Mansour Appt 4, 2 ^e Etage, Bd Yacoub El Aggouj, Casablanca 249 Résidence El Mansour Appt 4, 2 ^e Etage, Bd Yacoub
31/08/21	Contrôle		G	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29.8.21	591,00
	31.8.21	858,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	30/8/21	B66	787,40 mg

[illegible]

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'...

es

CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EX

Dr. Saloua AGOUMI
 Spécialiste des maladies du
 Système Nerveux Central et
 Pénpherique
 Neurologue



د. سلوى أگومي
 أخصائية في أمراض الدماغ
 و الجهاز العصبي

Casablanca le : 28/08/2021 في الدار البيضاء

M^r DHARMA EL MOSTAFA

126,00 x 2
 2.)

cilentra 10 mg

le matin

PHARMACIE MOUEDEN
 Mosquée Sekoula Mag N° 1
 Ahl Loghlam Casablanca
 Tél : 05 22 76 57 62

PHARMACIE MOUEDEN
 Mosquée Sekoula Mag N° 1
 Ahl Loghlam Casablanca
 Tél : 05 22 76 57 62

PPV: 39DH80
 PER: 05/24
 LOT: K1305


2
 39.8

05gttes le soir

74,80 x 4
 3.)

vitatine

1cp x 2/5



Dr. AGOUMI Saloua
 Neurologue
 249, Résidence El Mansour "4"
 Appt 4, 2e Etage, Bd Yacoub
 El Mansour - Casablanca
 Tél: 0522 89 84 38

STRT de 2 mois

VITATINE® GÉLULES

11 vitamines + Fenugrec



6 111255 810154

LOT 20288/FC9

10/2023 PPC 74,80

Vitamine C (acide ascorbique), Vitamine B12 (cyanocobalamin), Vitamine B6 (pyridoxine acétate), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B1 (thiamine hydrochloride), Vitamine B12 PO 0.1%WS, Vitamine A rétinyl acétate 325, Vitamine B9 (acide folique), Vitamine B8 (biotine 0,1%), Stéarate de magnésium.

Valeur énergétique	Par gélule	
K-cal	0,5	
K-joules	2	
Glucides	130 mg	
Protides	Trace	
Lipides	Trace	
<u>Analyse moyenne</u>	<u>Par gélule</u>	<u>AJR* % par gélule</u>
Extrait sec de Fenugrec	130,000 mg	
Fer	6,289 mg	45
Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière)	50,000 mg	---
Vitamine C	29,970 mg	50
Vitamine E	5,000 mg	50
Vitamine B12	8,955 mg	50
Vitamine B5	2,645 mg	44
Vitamine B6	0,816 mg	41
Vitamine B2	0,788 mg	49
Vitamine B1	0,504 mg	36
Vitamine B12	0,0005 mg	50
Vitamine A	0,326 mg	41
Vitamine B9	0,092 mg	46
Vitamine B8	0,074 mg	50

* Apport Journalier Recommandé

Propriétés :

VITATINE® gélule associe Vitamines, Fenugrec et Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière) pour une efficacité optimale.

Cette association permet d'améliorer les défenses naturelles de l'organisme tout en stimulant l'appétit et favorise le dynamisme physique et intellectuel au quotidien.

Conseil d'utilisation :

- . Amaigrissement (manque d'appétit).
- . Fatigue physique et intellectuelle.
- . Amélioration des défenses naturelles de l'organisme.
- . Convalescence.
- . Effort physique (sportif).

Posologie :

2 gélules par jour à prendre de préférence avant les repas.

Fabriqué par STRAPHARM S.N.

Pour RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament

VITATINE® GÉLULES

11 vitamines + Fenugrec



6 111255 810154

LOT 20288/FC9

10/2023 PPC 74,80

Vitamine C (acide ascorbique), Vitamine B12 (cyanocobalamin), Vitamine B6 (pyridoxine acétate), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B1 (thiamine hydrochloride), Vitamine B12 PO 0.1%WS, Vitamine A rétinyl acétate 325, Vitamine B9 (acide folique), Vitamine B8 (biotine 0,1%), Stéarate de magnésium.

Valeur énergétique	Par gélule	
K-cal	0,5	
K-joules	2	
Glucides	130 mg	
Protides	Trace	
Lipides	Trace	
<u>Analyse moyenne</u>	<u>Par gélule</u>	<u>AJR* % par gélule</u>
Extrait sec de Fenugrec	130,000 mg	
Fer	6,289 mg	45
Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière)	50,000 mg	---
Vitamine C	29,970 mg	50
Vitamine E	5,000 mg	50
Vitamine B12	8,955 mg	50
Vitamine B5	2,645 mg	44
Vitamine B6	0,816 mg	41
Vitamine B2	0,788 mg	49
Vitamine B1	0,504 mg	36
Vitamine B12	0,0005 mg	50
Vitamine A	0,326 mg	41
Vitamine B9	0,092 mg	46
Vitamine B8	0,074 mg	50

* Apport Journalier Recommandé

Propriétés :

VITATINE® gélule associe Vitamines, Fenugrec et Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière) pour une efficacité optimale.

Cette association permet d'améliorer les défenses naturelles de l'organisme tout en stimulant l'appétit et favorise le dynamisme physique et intellectuel au quotidien.

Conseil d'utilisation :

- . Amaigrissement (manque d'appétit).
- . Fatigue physique et intellectuelle.
- . Amélioration des défenses naturelles de l'organisme.
- . Convalescence.
- . Effort physique (sportif).

Posologie :

2 gélules par jour à prendre de préférence avant les repas.

Fabriqué par STRAPHARM S.N.

Pour RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament

VITATINE® GÉLULES

11 vitamines + Fenugrec



6 111255 810154

LOT 20288/FC9

10/2023 PPC 74,80

Vitamine C (acide ascorbique), Vitamine B12 (cyanocobalamin), Vitamine B6 (pyridoxine acétate), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B1 (thiamine hydrochloride), Vitamine B12 PO 0.1%WS, Vitamine A rétinyl acétate 325, Vitamine B9 (acide folique), Vitamine B8 (biotine 0,1%), Stéarate de magnésium.

Valeur énergétique	Par gélule	
K-cal	0,5	
K-joules	2	
Glucides	130 mg	
Protides	Trace	
Lipides	Trace	
<u>Analyse moyenne</u>	<u>Par gélule</u>	<u>AJR* % par gélule</u>
Extrait sec de Fenugrec	130,000 mg	
Fer	6,289 mg	45
Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière)	50,000 mg	---
Vitamine C	29,970 mg	50
Vitamine E	5,000 mg	50
Vitamine B12	8,955 mg	50
Vitamine B5	2,645 mg	44
Vitamine B6	0,816 mg	41
Vitamine B2	0,788 mg	49
Vitamine B1	0,504 mg	36
Vitamine B12	0,0005 mg	50
Vitamine A	0,326 mg	41
Vitamine B9	0,092 mg	46
Vitamine B8	0,074 mg	50

* Apport Journalier Recommandé

Propriétés :

VITATINE® gélule associe Vitamines, Fenugrec et Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière) pour une efficacité optimale.

Cette association permet d'améliorer les défenses naturelles de l'organisme tout en stimulant l'appétit et favorise le dynamisme physique et intellectuel au quotidien.

Conseil d'utilisation :

- . Amaigrissement (manque d'appétit).
- . Fatigue physique et intellectuelle.
- . Amélioration des défenses naturelles de l'organisme.
- . Convalescence.
- . Effort physique (sportif).

Posologie :

2 gélules par jour à prendre de préférence avant les repas.

Fabriqué par STRAPHARM S.N.

Pour RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament

VITATINE® GÉLULES

11 vitamines + Fenugrec



6 111255 810154

LOT 20288/FC9

10/2023 PPC 74,80

Vitamine C (acide ascorbique), Vitamine B12 (cyanocobalamin), Vitamine B6 (pyridoxine acétate), Vitamine B2 (riboflavine), Vitamine B1 (thiamine hydrochloride), Vitamine B12 PO 0.1%WS, Vitamine A rétinyl acétate 325, Vitamine B9 (acide folique), Vitamine B8 (biotine 0,1%), Stéarate de magnésium.

Valeur énergétique	Par gélule	
K-cal	0,5	
K-joules	2	
Glucides	130 mg	
Protides	Trace	
Lipides	Trace	
<u>Analyse moyenne</u>	<u>Par gélule</u>	<u>AJR* % par gélule</u>
Extrait sec de Fenugrec	130,000 mg	
Fer	6,289 mg	45
Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière)	50,000 mg	---
Vitamine C	29,970 mg	50
Vitamine E	5,000 mg	50
Vitamine B12	8,955 mg	50
Vitamine B5	2,645 mg	44
Vitamine B6	0,816 mg	41
Vitamine B2	0,788 mg	49
Vitamine B1	0,504 mg	36
Vitamine B12	0,0005 mg	50
Vitamine A	0,326 mg	41
Vitamine B9	0,092 mg	46
Vitamine B8	0,074 mg	50

* Apport Journalier Recommandé

Propriétés :

VITATINE® gélule associe Vitamines, Fenugrec et Saccharomyces Cerevisiae (Levure de bière) pour une efficacité optimale.

Cette association permet d'améliorer les défenses naturelles de l'organisme tout en stimulant l'appétit et favorise le dynamisme physique et intellectuel au quotidien.

Conseil d'utilisation :

- . Amaigrissement (manque d'appétit).
- . Fatigue physique et intellectuelle.
- . Amélioration des défenses naturelles de l'organisme.
- . Convalescence.
- . Effort physique (sportif).

Posologie :

2 gélules par jour à prendre de préférence avant les repas.

Fabriqué par STRAPHARM S.N.

Pour RAMO-PHARM

Complément Alimentaire n'est pas un médicament



Casablanca le : 31/08/2021 في الدار البيضاء

M^{re} DHARSMA EL MOSTAFA

96,00
1)

prazol 20 mg

1 cp le matin x 01 mois

60,00
2)

Ferplex 40 mg

1 amp x 2 / 5 pdt 01 mois

puis 1 amp 1 / 5 pdt 02 mois

79,80

3)

Newflex chauffante

1 app x 03 / 5 pdt 05 jrs.

895,80

Dr. AGOUMI Saloua
Neurologue
249, Résidence El Mansour "4"
App^t 4, 2e Etage, Bd Yacoub
El Mansour - Casablanca
Tél : 05 22 39 84 38

PPV: 96DH00
PER: 08/23
LOT: k366-2

FERPLEX[®] 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

ISOPHARM
NEWFLEX GEL
CHAUFFANT
79.80 DH

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يعض الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد (مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.
يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي آثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلب طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني وداء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيتها وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.

FERPLEX® 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables

PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

Lot : 21011
EXP: 02-2023

انخفاض الإمتصاص المعوي للحديد وحسن
محلول لشرب في حالة أخذه مع الأدوية المذكورة أدناه لابد من الفصل
بين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب و الأدوية التالية مدة لا تقل عن
ساعتين قبل تناول :

• مضادات الحموضة تستعمل عادة عند المرضى الذين يعانون من
حموضة المعدة.

• كلورامفينيكول(مضاد حيوي)

• الكولسترامين يستعمل عند المرضى الذين يعانون من فرط
الكوليسترول في الدم.

• أدوية لعلاج القرحة المعدية أو الجزر المعدي المريئي مثل أوميبرازول
لنزوبرازول وبانتوبرازول.

• مخاطر التداخل في الاختبارات التشخيصية :

• هذا الدواء قد يتداخل مع الفحوصات المختبرية للبحث عن الدم الخفي
في البراز.

تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب مع الأغذية والمشروبات
يضع الأغذية النباتية و الحليب و القهوة و الشاي تخفف امتصاص
الحديد، لذلك من الضروري يجب أخذ فيريلكس 40 ملغ عن مدة لا تقل
عن ساعتين عند تناول هذه الأغذية أو عند تناول هذه الأخيرة يجب
الانتظار ساعتين قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ.

زيادة امتصاص مشتقات الحديد بعد تناول عصير الحمضيات
(البرتقال، الليمون وغيرها) الطازج.

الحمل والرضاعة :

إستشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

يؤخذ فيريلكس خلال فترة الحمل والرضاعة لعلاج نقص الحديد، ليس
هناك احتياطات خاصة يجب اتخاذها.

القيادة واستعمال الآلات :

لم يلاحظ أي أثار على قدرة السيادة واستعمال الآلات.

معلومة هامة حول فيريلكس 40ملغ محلول لشرب :

هذا الدواء يحتوي على سبرتول، إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات

نشرة :

فيريلكس 40 ملغ

بروتين سينسيلات الحديد

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل أخذ هذا الدواء.

- حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو أي شك، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء تم وصفه إليك شخصيا. لا تناوله شخصا آخر أبدا ولم
في وجود أعراض مماثلة، قد يضره ذلك.
- في حالة تفاقم بعض الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أثرا جانبيا غير
مدرج في هذه النشرة، اطلع طبيبك أو الصيدلاني عليه.

فهرس النشرة :

1. ما هو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله.
2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
3. كيفية استعمال فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
4. ما هي تأثيرات الجانبية المحتملة.
5. كيف يتم تخزين فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب.
6. معلومات إضافية.

1. ماهو فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب وفي أي الحالات يجب استعماله :

المجموعة الصيدلانية العلاجية مضاد لفقر الدم/الحديد.

فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب هو الدواء الذي يوفر الحديد في كريات
الدم الحمراء، لمعالجة نقص الحديد ولعلاج فقر الدم (انخفاض مستوى
هيموغلوبين وعدد وقياس الكريات الحمراء) بسبب نقص الحديد.

2. ماهي المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب :

لا يجب تناول فيريلكس 40 ملغ محلول لشرب في الحالات التالية :

- إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفردة) لبروتين سينسيلات الحديد أو أحد مكونات هذا الدواء.
- إذا كانت لديك حساسية من بروتينات الحليب.
- إذا كنت تعاني من مرض يؤدي إلى تراكم الحديد في الجسم (داء هيموسيديريني داء ترسب الأصبغة الدموية).
- إذا كنت تعاني من التهاب البنكرياس(التهاب البنكرياس) أو تشمع الكبد(مرض كبد مزمن يتميز بتشكيل آفات ليفية أو "ندوب" في أنسجة الكبد ويغير بنيته وفعاليتها العادية) بسبب تراكم الحديد.

التحذيرات الخاصة لفيريلكس 40 ملغ :

• في حالة نقص الحديد أو فقر الدم، استشر طبيبك قبل أن تأخذ هذا الدواء.



Casablanca le : 28/08/2021 في الدار البيضاء

M^r DHAR SMA EL MOSTAFA

Faire SVP =

- 1) NFS + PL9
- 2) GOT, GPT
- 3) urée, Créat
- 4) Glycémie a jeun
- 5) HbA1C
- 6) PSA

Dr. AGOUMI Saloua
Neurologue
249, Résidence El Mansour "4"
Appt 4, 2^e Etage, Bd Yacoub
El Mansour - Casablanca
Tél: 05 22 39 84 38



Facture/Honoraires

ICE: 001591621000046

Casablanca, le 30/08/2021

Dossier N° 300821-029 du 30/08/2021

Dr : SALOUA AGOUMI

Patient : Mr DHARSMA El Mostafa

Analyses	Valeur en B	Montant
NUMERATION GLOBULAIRE	80	101,60
Glycémie à jeun	30	38,10
Créatinine	30	38,10
Urée	30	38,10
Hémoglobine Glyquée HbA1c (BIORAD-HPLC)	80	101,60
SGOT (Aspartate Aminotransférase)	50	63,50
SGPT (Alanine Aminotransférase)	50	63,50
Antigène spécifique de la prostate Totale	270	342,90
Total B	620	787,40
APB	0,0	0,00
Total		787,40

Arrêtée la présente note d'honoraire à la somme de : Sept cent quatre-vingt-sept dirhams 40 centimes***

Opération bénéficiant de l'exonération à la TVA sans bénéfice du droit de déduction conformément à l'article 91-VI-1° du code Général des Impôts.

LABORATOIRE ALAZHAR D'ANALYSES MEDICALES
Secrétaire: ac
17, rue 2 Mars 9, Bd Ahl Ighlam 1^{re} Tranche
Casablanca - Maroc - Tél: 05 22 72 40 67



Demandé par Dr. : SALOUA AGOUMI

Casablanca

Examen du : 30/08/2021

Heure Pvt : 9:06:00

Edité le : 30/08/2021

Mr DHARSMA El Mostafa

Code Patient : 21-04070

Réf : 300821-029



Compte rendu d'analyses

Page : 1/2

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME : (HORIBA-ABX Pentra XL80)

Erythrocytes	:	3,61 M/mm ³	(4 - 5,7)
Hémoglobine	:	10,9 g/dl	(12 - 16)
Hématocrite	:	32,5 %	(40 - 50)
VGM	:	90 fL	(80 - 95)
TGMH	:	30 pg	(27 - 33)
CCMH	:	34 g/dl	(30 - 35)
Leucocytes	:	6300 /mm ³	(4000 - 10000)

FORMULE LEUCOCYTAIRE :

Polynucléaires Neutrophiles	:	66,4 % 4183,00 /mm ³	(2000 - 7500)
Lymphocytes	:	18,3 % 1153,00 /mm ³	(1500 - 4000)
Monocytes	:	9,1 % Soit 573,00 /mm ³	(40 - 800)
Polynucléaires Eosinophiles	:	6 % Soit 378,00 /mm ³	(Inférieur à 400)
Polynucléaires Basophiles	:	0,2 % Soit 13,00 /mm ³	(Inférieur à 150)
Au total	:	100 % Soit	
Plaquettes	:	171000 /mm ³	(150000 - 500000)

BIOCHIMIE

		Valeurs Usuelles	Antériorité
Glycémie à jeun	:	0,90 g/l	(0,7 - 1,15)
Créatinine	:	12,00 mg/l	(9 - 14)
Urée	:	0,21 g/l	(0,18 - 0,5)
Hémoglobine Glyquée HbA1c (BIORAD-HPLC)	:	5,50 %	

Chez un sujet non Diabétique la valeur usuelle est < 6,4.

Interprétation chez le Diabétique:

4 - 6 : Métabolisme moyen et diabétique stabilisé

6 - 8 : Métabolisme équilibré

> 8 : Métabolisme mal équilibré et diabétique insuffisamment contrôlé

LABORATOIRE AL AZHAR D'ANALYSES MEDICALES
Dr LAHLOU Omar
Medecin Biologiste
Imm. 4 Mag. 9, Bd Ahloughlam 1^{er} Tranche
Casablanca - Tél. : 05 22 75 49 87



Mr DHARSMA El Mostafa

Dossier N° : 300821-029

Page : 2/2

ENZYMOLOGIE

SGOT (Aspartate Aminotransférase) : 49 UI/l

Résultat contrôlé

Valeurs Usuelles

(Inférieur à 45)

Antériorité

SGPT (Alanine Aminotransférase) : 41 UI/l

(Inférieur à 45)

MARQUEURS SERIQUES

PSA Totale : 1,80 ng/ml

Valeurs Usuelles

Antériorité

(EC Pour sujet de moins que 70 ans la valeur deréférence < 5 ng/ml

Pour sujet de plus que 70 ans la valeur de référence < 6.5 ng/ml

Nous vous remercions de votre confiance

Prélèvement à domicile sur rendez-vous
« Votre Bien être est notre Responsabilité »

LABORATOIRE AL AZHAR D'ANALYSES MÉDICALES
Dr LAHLOU Omar
Médecin Biologiste
Imm. 4 Mag. 9, Bd Ahloughlam 1^{er} Tranch
Casablanca - Tel : 05 22 75 49 87

Rapport de patient

Dr LAHLOU OMAR

Bio-Rad
D-10
N° Série: #DJ6A032909
Id. de l'échantillon :
Date d'injection
N° d'injection : 10
N° de portoir : ---

DATE : 30/08/2021
HEURE : 12:58
Version Logiciel : 4.20-2
1300821029
30/08/2021 12:54
Méthode : HbA1c
Position du portoir : 10

Médecin Biologiste
ANCIEN INTERNE AU C.H.U DE
SANTANDER - ESPAGNE




Table des pics - ID : 1300821029

Pic	Tps.Ret	Hauteur	Aire	% Aire
A1a	0.22	5129	23214	0.9
A1b	0.29	8674	36826	1.4
F	0.43	1368	4481	0.2
Unknown	0.51	1435	7388	0.3
LA1c/CHb-1	0.66	5894	48911	1.8
A1c	0.85	13315	113541	5.5
P3	1.38	31535	109385	4.0
Unknown	1.39	24129	55112	2.0
A0	1.50	762228	2326590	85.4
Aire totale :				2725449

Concentration :	%
A1c	5.5