

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation contact@mupras.com
- Prise en charge pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS - Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Vaku et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel. 05 22 20 45 45 (UGI) - Fax. 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-409086

82652

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	2538	Société :	R.A.M
<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : KACHANI MUSTAPHA			
Date de naissance : 01/01/1951			
Adresse : Jami LA 5 Rue 187 N° 29 C/D CASA 04			
Tél. :	0667028896	Total des frais engagés : _____ Dhs	

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Dr. CHRAIBI Faïcel Médecin Général - Médecin du Travail Echographie Générale Jamila 7 Rue 13 11^e 82 Cite Djemaa </div>			
Date de consultation : 09 AOUT 2021			
Nom et prénom du malade : Mme Kachani Kha dy			
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input checked="" type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : HTA			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :



VOLET ADHÉRENT	
Déclaration de maladie	
N° W19-409086	
Remplissez ce volet, découpez le et conservez le. Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.	
Coupon à conserver par l'adhérent(e).	
Matricule :	2538
Nom de l'adhérent(e) :	KACHANI MUS
Total des frais engagés :	
Date de dépôt :	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Medecin attestant le Paiement des Actes
09 AOUT 2021			150 dh	09.1042721 Dr. CHRAIBI Faïel Spécialiste Médecin du Travail Djamila Fonction publique

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE MOATAZ DR BENTAHAR NAJAH JAMAL AV RUE 105 40 CASABLANCA TEL 0522 52221	09/08/21	192,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Designation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est tenu de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

	H		CŒFFICIENT DES TRAVAUX
	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553	
D		G	
B			
[Création, remont, adjonction]			
Fonctionnel Thérapeutique; nécessaire à la profession			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
MONTANTS DES SOINS		<input type="text"/>	
DATE DU DEVIS		<input type="text"/>	
DATE DE L'EXÉCUTION		<input type="text"/>	

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur CHRAÏBI Faïcel

الدكتور الشرابي فيصل

- Médecine Générale
- Médecin du travail
- Echographie (Echodoppler Couleur)
- ECG



- الطب العام

- طب الشغل

- الفحص بالصدى

- التخطيط الكهربائي للقلب

09/08/2021

Casablanca, le الدار البيضاء في

64,20 X3

Madame KACHANI Khadija

1/ ANCINE PLUS 50/12,5 mg

1 cp le matin pdt 03 mois



TT > 192,60



PHARMACE BYB MOKHTAR
DR. BESMA KACHANI
JAMILA 7 RUE 14 N° 82
CASA TEL: 0522 22 53 00

جميلة 7 زنقة 14 رقم 82 قرية الجماعة - الدار البيضاء - الهاتف . 05 22 29 16 31
Jamila 7, Rue 14 N°82 , Cité Djamaâ - Casablanca -Tél.: 05 22 29 16 31

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
Losartan (exprimé en losartan potassique).

100mg
25mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
Losartan (exprimé en losartan potassique).

50mg
12,5mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stéarate, opadry OY jaune

50mg
12,5mg

un comprimé

Excipient q.s.p.

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie. Goutte. Anurie.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/ hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance du médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous êtes (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez des vomissements importants éloignés des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaisissement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de sel ou de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de l'acide ce qui diminue l'efficacité contre indiqué en cas de galactosémié congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminiée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MÉDICALEMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques épargeurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : d'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antialgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la codépine ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématoctoïde et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Nervosité, parésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctivite, baisse de l'acuité visuelle. Acéphalies, vertiges. Hypotension, hypotension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinité, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous ressentez un ou plusieurs effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

SURDOSE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypotonie réfractaire). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent provoquer une hypotension importante.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements lors d'une augmentation de la posologie.

CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Lot 1

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas, n'en prenez pas initialement le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas, ni en doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

LOT : 136
PER : 10/23
PPV (P) : 64,20 DH

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg

30 comprimés pelliculés



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.2 Tit Mellil -Casablanca-

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
Losartan (exprimé en losartan potassique).

100mg
25mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
Losartan (exprimé en losartan potassique).

50mg
12,5mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stéarate, opadry OY jaune

50mg
12,5mg

un comprimé

Excipient q.s.p.

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie. Goutte. Anurie.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/ hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance du médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous êtes (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez des vomissements importants éloignés des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaisissement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de sel ou de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de l'acide ce qui diminue l'efficacité contre indiqué en cas de galactosémié congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminiée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MÉDICALEMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques épargeurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : d'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antialgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la codépine ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématoctoïde et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Nervosité, parésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctive, baisse de l'acuité visuelle. Acéphalies, vertiges. Hypotension, hypotension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinité, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous ressentez un ou plusieurs effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Préservez de la précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypotonie réfractaire). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent entraîner une hémorragie.

CONDITIENS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Lot 1

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas, n'en prenez pas initialement le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas, ni en doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

LOT : 136
PER : 10/23
PPV (P) : 64,20 DH

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg

30 comprimés pelliculés



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.2 Tit Mellil -Casablanca-

ANCINE PLUS®

Losartan - Hydrochlorothiazide

FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITION :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
Losartan (exprimé en losartan potassique).

100mg
25mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.
Losartan (exprimé en losartan potassique).

50mg
12,5mg

un comprimé

Hydrochlorothiazide.

Excipient q.s.p.

Excipients : microcristalline cellulose, lactose monohydraté, amidon prégalatiné, magnésium stéarate, opadry OY jaune

50mg
12,5mg

un comprimé

Excipient q.s.p.

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

INDICATIONS :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle chez les patients dont la pression artérielle n'est pas suffisamment contrôlée par le losartan ou l'hydrochlorothiazide en monothérapie.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament. Au cours du 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. En cas d'allaitement. Insuffisance rénale et hépatique sévère. Hypotonie réfractaire. Hypokaliémie. Hypercalcémie. Goutte. Anurie.

MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée. ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas. La posologie initiale (losartan 50mg/ hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée. Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans). Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance du médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer. Si vous oubliez de prendre ANCINE PLUS, comprimé pelliculé ne prenez pas une dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Vous devez informer votre médecin si vous êtes (ou susceptible de devenir) enceinte. ANCINE PLUS est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre ANCINE PLUS.

- si vous avez déjà un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, si vous prenez des diurétiques, si vous faites un régime sans sel, si vous avez ou avez des vomissements importants éloignés des diarrhées, si vous avez une insuffisance cardiaque, si votre fonction hépatique est altérée, si vous avez un rétrécissement des artères rénales (sténose artérielle rénale) ou avec un rein fonctionnel unique, si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaisissement du muscle cardiaque), si vous êtes diabétique, si vous avez de la goutte, si vous avez un taux élevé de sel ou de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium vous êtes sportif et allez subir un contrôle anti-dopage, prévenez votre médecin car ANCINE PLUS contient des principes actifs qui peuvent entraîner des résultats positifs aux tests.

Il est possible que ANCINE PLUS soit moins efficace chez les personnes de race noire. En raison de la présence de l'acide ce qui diminue l'efficacité contre indiqué en cas de galactosémié congénitale, de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent l'hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte.

Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminiée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

INTERACTIONS MÉDICALEMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales comme avec d'autres médicaments qui inhibent l'angiotensine II ou ses effets, l'administration concomitante de diurétiques épargeurs de potassium, de suppléments potassiques ou de substituts de sel contenant du potassium peut provoquer une hyperkaliémie. Un contrôle de la kaliémie est recommandé. ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques. Les produits ci-dessous peuvent interagir avec les diurétiques thiazidiques en cas de prise concomitante : d'autres médicaments pour abaisser la pression sanguine. Des corticoïdes. Des médicaments pour le traitement de la goutte. Des antialgiques. Des médicaments contenant de la carbamazépine, de la codépine ou un sel de calcium. Certains neuroleptiques. Cholestyramines. Des médicaments myorelaxants. L'adrénaline ou autre médicaments de la même classe. Des médicaments pour le traitement du diabète. Des produits de contraste iodés. Alcool

EFFECTS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ANCINE PLUS peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

Fréquents

- Insomnie, céphalées, étourdissements. Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus. Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion. Crampes musculaires, douleur de la jambe, douleur lombaire. Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques. Hyperkaliémie, diminution de l'hématoctoïde et de l'hémoglobine.

Peu fréquents

- Anémie, purpura rhumatoïde, ecchymoses, hémolyse. Anorexie, goutte. Anxiété, peur panique, confusion, dépression, rêves anormaux, troubles du sommeil, somnolence, troubles de la mémoire. Nervosité, parésie, neuropathie périphérique, tremblement, migraine, syncope. Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, conjonctive, baisse de l'acuité visuelle. Acéphalies, vertiges. Hypotension, hypotension orthostatique, angor, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, palpitations, arythmie. Gêne pharyngée, pharyngite, laryngite, dyspnée, bronchite, rhinité, congestion pulmonaire. Constipation, flatulence, gastrite, vomissements, sécheresse de la bouche, douleur dentaire. Sécheresse de la peau, atopie, dermatite, érythème, bouffées de chaleur, photosensibilité, prurit, rash, urticaire, sudation. Douleur du bras, des épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations, gonflement des articulations, raideur, faiblesse musculaire. Mictions fréquentes, nycturie, infection des voies urinaires. Baisse de la libido, impuissance. Edème du visage, fièvre.

Rare

- Hépatite.

Fréquence indéterminée

- Anomalies de la fonction hépatique.

Risque de cancer de peau non-mélanome :

Si vous ressentez un ou plusieurs effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Préservez de la précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse. L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement :

L'allaitement est contre indiqué au cours du traitement.

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydrolytiques (hypokaliémie, hypotonie réfractaire). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent entraîner une hémorragie.

CONDITIENS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Date d'approbation de la notice :

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/11/14.

Lot 1

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous expose a prescrit.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas, n'en prenez pas initialement le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas, ni en doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

LOT : 136
PER : 10/23
PPV (P) : 64,20 DH

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg

30 comprimés pelliculés



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA
Z.I.2 Tit Mellil -Casablanca-